

〔重刊訂正本〕

中國醫學大成

錢若利題



【三十八】

〔重刊訂正本〕

中國醫學大成

三八

上海科學技術出版社

期

末

中國醫學大成 (全套共五十冊)

上海科學技術出版社出版

(上海瑞金二路四五〇號)

新華書店上海發行所發行

上海市印刷十廠印刷

開本七八七×一〇九二

三十二開

精裝

總字數二一,七九〇,〇〇〇

總印張八六二

一九九〇年六月第一版 一九九〇年六月第一次印刷



C0159019

吳鞠通醫案

〔清〕吳 瑭 著

原 編 曹炳章

總審定 裘沛然

總審閱 蕭敏材 朱邦賢 沈麗君

重刊訂正《中國醫學大成》序

《中國醫學大成》一書，我鄉先輩四明曹炳章先生所輯集，爲發揚中醫學，保存古醫籍，以饗同道並惠後學作也。曹氏纂集是書時，正值西學東漸，國內淺見倖進之徒，競尙浮華，大肆鞭撻我國文化固有之精英，如民族醫學，悉在消滅之列，中醫學不絕如縷。而先生乃在此時從事中醫叢書巨著之編輯，姑不論其學術價值，獨其保存民族文化精粹之苦心孤詣令人可敬，其卓識遠見，又何其可欽也。

楊志一在原書序中有說：『大凡學術之成立，歷久而不敗者，必有其真實之價值在。』善哉言乎！中華民族立國數千年而得以生存繁衍，如無優秀之文化及可貴之醫學，則亦何逃於優勝劣敗之例。尤

其在科學迅猛發展之今日，百技更新，而古老之中醫藥學日益引起國內外有識之士之重視。各類中醫藥研究所之建立，亦爲保護人民健康之需要，順應世界醫學發展之潮流而設。凡此種種，夫豈偶然。

惟中醫學歷史悠久，濫觴於炎黃，昌盛於漢唐，歷代醫家多有創見，其學術經驗載於文獻者浩如煙海，遺佚者可弗論，僅就先生纂集之時，存書尙達萬種，學者既不能盡讀，又無力購置，且諸書精粗雜糅，版本文字舛誤殊多，使學習中醫者常興望洋之嘆。先生乃爲之博採精選，上自先秦，下迄近代，凡理論、方藥、臨床各科咸備，別爲十三類，書計三百六十五種，分醫經、藥物、診斷、方劑、通治、外感病、內科、外科、婦科、兒科、針灸、醫案及外集雜著各類。其中傷科、眼科及五官病歸入外科，推拿、手術歸入針灸，醫論、醫話、醫史歸入雜著。所收各書，皆中醫要籍，大都內

容精粹，切合實用，版本亦從精選，並加句斷。各書之首，皆列著作校刊略歷及內容提要，以便讀者入門粗知梗之助。

中醫學歷來叢書頗少，是書搜羅廣而選擇精，洵爲前所未有之巨著。惜全書印刊未半而抗戰軍興，烽煙迷漫，醫籍出版被迫中輟。而已印行之一百三十六種，今亦散佚不全。上海科學技術出版社爲應學者需求，重爲付梓，並影印以存原貌。書中明顯錯訛者，由我院及中醫文獻研究所等有關單位專業人員校勘改正，使之益臻完善。夫文以載道，中醫學爲我國醫學之重要財富，文獻則是寶庫中之重要內容。故有志斯道者，務求先通中醫之理論法則、方藥效用和臨床處置，使對中醫學有全面之理解，更須驗之臨床，以汲取其理論精華與豐富經驗。學問之事，原恃艱苦以求而非獵取可得。昔張仲景勤求古訓，博採衆方；孫思邈青衿之歲，高尚是典，白首之

年，未嘗釋卷；葉香岩以不讀破萬卷，不敢輕言醫。茲三人者，皆由勤奮好學而成一代高醫，故學習中醫宜下一番札實工夫。在此基礎上運用現代科學技術研究和整理中醫學，才有闡明和提高希望。中西醫結合，亦將另具特色。以務實精神，走中醫現代化循序而進之道路，勇於繼承，敢於創新，使傳統醫學有所發現與創造。苟能如此，不僅爲祖國爭光，並將爲人類造福。

本叢書一百三十六種，分爲五十冊；每冊後並皆附有全部書目。它的出版，爲中醫和愛好中醫者提供珍貴之醫學文獻，讀者勤習而深研之，必能奠定中醫學根柢，大有助於中醫事業之繼承與發展。

裘沛然

一九八八年六月作於
上海中醫學院

〔清〕 吳 塘 著

吳鞠通醫案

中國醫學大成

吳鞠通醫案提要

清吳瑭著。瑭字鞠通。淮陰人。其醫學上追素難。長沙。下遵葉派。以醫名大江南北。所著溫病條辨。醫醫病書。上爲吳又可之諍臣。下導王孟英之先路。其所著實驗醫案。前烏程汪曰楨任紹興會稽教諭時。已欲捐俸受梓。因其案用藥分兩過重。恐後學不量體質強弱誤用。中止付刊。於是所傳祇有鈔本。厥後吾紹裘君吉生刻入醫學叢書。惜乎刻印未精。訛誤居多。杭州金君月笙分類編次。釐爲五卷。金君謹齋以二號鉛字排印行之。校刊較精。爰採是本。重爲校定。印行。雖間有藥分過重。但苟能審證無訛。然後察體之強弱而運用之。固無妨也。昔杭大宗序名醫類案。括以三言。曰審脈。曰辨藥。曰慎思。其論絕精。余於是書則取鞠通氏之言。以告同志。曰認證無差。而後用藥。病重體強則藥分重。病重體弱則避重就輕。庶乎其可矣。

序

醫案之作。昉於明人。四庫全書醫家類著。錄薛己陳梅兩家醫案。世尠傳本。惟明江瓘名醫類案。國朝魏之琇續名醫類案。乾隆間。長塘鮑氏刊行之。同治間有重刻本。江氏徵引古今方論。附以評語。頗多辨證。魏氏采摭尤繁富。而不能免蕪雜之累。若喻嘉言寓意草。自述其所治驗。而不以醫案名。葉天士臨證指南。盛行吳越間。市醫淺學。奉若科律。然中多門弟子僞託。不皆出於天士。故純駁互見。膠柱鼓瑟。貽誤後來。識者病焉。淮陰吳鞠通氏。以醫名大江南北。所著溫病條辨。上爲吳又可之諍臣。下導王孟英之先路。亦旣家有其書矣。金君月笙覃精靈蘭之秘。博觀醫家書。得鞠通氏醫案手稿。分類編次。釐爲五卷。金君謹齋爲排印行之。而督余序其端。余於醫學無所得。顧少而善病。頗事涉獵。因受而卒業焉。竊歎是書也可以爲醫門之階梯矣。其辨微也。分肌擘理。若屠牛坦一朝解十二牛而芒刃不頓。其糾繆也。若老吏讞獄。雖情僞萬變。執吾法以繩之。而無所於撓。至若療章氏顛狂之疾。而先激其羞惡之良心。幾幾於窮理盡性之學。治陳某腫脹之疾。與

陳頌帝論藥。齊輕重以決其效不效。折座客之氣。而卒以服頌帝之心。於戲。可不謂神矣乎。昔杭先生大宗。序名醫案類。括以三言。曰審脈。曰辨藥。曰慎思。其論絕偉。余於是書。則但取鞠通氏之自道。曰認證無差。一言盡之矣。認證無差。非多讀古書。善察時變者不能。今世言醫者十九下工耳。不讀古書。不察時變。苟焉以醫爲市。其戕賊於茫昧中者。不知其凡幾矣。夫守一家之言。詎遂足爲高手醫。然得是書而深究其處方用意之所在。觸類以充其識。隅反以神其悟。繇是上通五運六氣三部九候之旨。不啻於湯齊先後緩急之序。毋以學醫人費蒙世詢病。馴至於稂莠潛消。民無夭札。則金君傳布是書之舉。不誠爲仁人之用心矣乎。歲在柔兆執徐。涂月吳慶坻序。

吳鞠通醫案目錄

卷一

風溫……………一

溫疫……………九

卷二

暑溫……………一

溼溫……………四三

伏暑……………一七

冬溫……………五〇

溫毒……………三七

卷三

中風……………一

肝厥……………九

少陽瘕瘕……………三

脅痛……………一二

肝風……………五

肝癰……………二三

卷四

癲狂	二七
虛勞	三五
吐血	四三
便血	五二
腫脹	五九

單腹脹	六七
滯下	六九
積聚	七五
淋濁	八〇
泄瀉	八六

卷五

痘症	一
噎	四四
嘔吐	四八
反胃	四九
噦	五一
失音	五二

水氣	五五
寒溼	六〇
痺	六一
風溼	八四
痰飲	八四

肺癰	一
喉痺	二
瘰	六
傷寒	一六
中燥	三二
瘧	四三
瘰癧	四八

食積	五二
飧泄	五四
咳嗽	五七
頭痛	六一
胃痛	七三
脾胃	七五

吳鞠通醫案

卷一

風溫

初六日

風溫。脈浮數。邪在上焦。胸痞微痛。穢濁上干清陽。醫者誤認爲痰。飲陰邪之干清陽。而用薤白湯。又有誤認傷寒少陽經之脅痛。而以小柴胡治之者。逆理已甚。無怪乎謔語煩躁。而胸痞仍不解也。議辛涼治溫以退熱。芳香逐穢濁以止痛。

連翹三錢

知母錢半

藿香梗二錢

銀花三錢

苦桔梗二錢

牛蒡子二錢

人中黃一錢

薄荷八分

石膏五錢

廣鬱金錢半

牛黃清心丸一丸日三服。

初七日

風溫誤汗。昨用芳香逐穢。雖見小效。究未能解。今日脈沈數。乃上行極而

下也。渴甚。議氣血兩燔之玉女煎法。合銀翹散加黃連。夜間如有譫語。仍服牛黃丸。

生石膏八錢

連翹四錢

知母四錢

生甘草二錢

丹皮五錢

真川連錢半

銀花六錢

細生地六錢

連心麥冬六錢

煮取三碗。分三次服。

初八日 大勢已解。餘焰尚存。今日脈浮。邪氣還表。

連翹二錢

麥冬五錢

銀花六錢

白芍錢半

丹皮二錢

炒知母一錢

黃芩炭八分

細生地三錢

生甘草一錢

今晚一帖。明早一帖。

初九日 脈沈數有力。邪氣入裏。舌老黃微黑。可下之。然非正陽明實證。大滿大痞。

可比。用增液足矣。

元參兩半

麥冬一兩

細生地一兩

初十日

煮成三碗。分三次服完。如大便不快。再作服。快利停服。昨服增液。黑糞已下。舌中黑邊黃。口渴。面赤。脈浮。下行極而上也。自覺饑甚。陽明熱也。仍用玉女煎加知母。善攻病者。隨其所在而逐之。

生石膏八錢

細生地五錢

生甘草三錢

生知母六錢

麥冬六錢

白粳米一撮

斷不可食粥。食粥則患不可言。

十一日

姚

三十二歲
三月初二日

邪少虛多。用復脈法。二甲復脈湯。風溫誤認傷寒發表。致令神呆譫語。陽有汗。陰無汗。大便稀水不爽。現在

脈浮。下行極而上也。先渴今不渴者。邪歸血分也。

連翹二錢

銀花三錢

元參三錢

竹葉心一錢

丹皮二錢

犀角二錢

桑葉一錢

甘草一錢

麥冬三錢

牛黃清心丸。三次服六丸。

初三日

昨用清膈中法。今日神識稍清。但小便短。脈無陰。大便稀水。議甘苦合化

陰氣法。其牛黃丸仍服。

大生地五錢

真川連一錢

生牡蠣一兩

黃芩二錢

丹皮五錢

犀角三錢

麥冬五錢

人中黃一錢

水八碗。煮取三碗。分三次服。明早再一帖。

初四日

即於前方內去犀角加

生鱉甲一兩

白芍一兩

初五日

大熱已減。餘焰尙存。小便仍不快。用甘苦合化陰氣法。

細生地八錢

炒黃柏二錢

丹皮四錢

炒知母二錢

連心麥冬六錢

生甘草二錢

生白芍四錢

生牡蠣五錢

生鱉甲八錢

黃芩二錢

今晚一帖。明日二帖。

初七日

溫病已解。邪少虛多。用復脈法。

真大生地六錢

炒白芍六錢

連心麥冬六錢

炙甘草二錢

麻仁三錢

生牡蠣六錢

知母二錢

黃柏二錢

生阿膠三錢

三帖三日。

十一日

熱淫所遏。其陰必傷。議於前方內去黃柏知母。加鱉甲沙參。以杜病後起燥之路。即於前方內去知母黃柏。加

生鱉甲六錢

沙參三錢

湯

風溫自汗。

連翹三錢

銀花二錢

甘草一錢

苦桔梗二錢

甲子年
四月十日
三日

杏仁二錢

牛蒡子三錢

薄荷八分

豆豉二錢

蘆根三把

今晚二帖。明早一帖。午前服完。

十四日

即於前方內加

連心麥冬三錢

細生地三錢

風溫發疹。初起肢厥。脈不甚數。勢非淺鮮。

王十歲

連翹五錢

薄荷三錢

甘草二錢

牛蒡子五錢

桑葉三錢

荊芥穗三錢

蘆梗四錢

鬱金三錢

桔梗五錢

元參五錢

蘆根湯煎

共為粗末。六錢一包。一時許服一包。明日再服。

三焦濁氣不宣。自覺格拒。用通利三焦法。仍以上焦為主。

李六十歲

蘆梗三錢

廣皮炭二錢

鬱金二錢

桔梗三錢

黃芩炭錢半

杏仁三錢

連翹錢半

服三帖病痊。

陳氏七十歲

風溫。欬嗽黏痰。脈弦數。曾吐血絲血沫。此風溫而誤以治風寒之辛溫法治之也。當用辛涼甘潤。

桑葉二錢

生甘草一錢

白扁豆皮三錢

沙參三錢

杏仁二錢

桔梗二錢

茶菊二錢

麥冬三錢

梨皮五錢

以上三人。溫病日久不解。六脈全無。目閉不言。四肢不動。宛如死去。有一日一夜者。有二日者。有三日者。有手足不溫。亦不甚涼者。有涼如冰者。有

趙二十六歲乙酉年四月初四日

微溫者。誠如吳又可所云體厥脈厥之證。僉用紫雪丹續續灌醒。繼以復服湯收功。

六脈浮弦而數。弦則為風。浮為在表。數則為熱。證現喉痛。卯酉終氣。本有溫病之明文。雖頭痛身痛惡寒甚。不得誤用辛溫。宜辛涼芳香清上。蓋上焦主表。表即上焦也。

桔梗五錢 豆豉三錢 銀花三錢 人中黃二錢

牛蒡子四錢 連翹三錢 荊芥穗五錢 鬱金二錢

蘆根五錢 薄荷五錢

煮三飯碗。先服一碗。即飲百沸湯一碗。覆被令微汗佳。得汗後第二三

碗不必飲湯。服一帖而表解。又服一帖而身熱盡退。

身熱雖退。喉痛未止。與代賑普濟散。日三四服。三日後全愈。

脈浮風溫。咽痛項強。頸微腫。舌伸不長。宜開提肺氣為主。

桔梗三錢 連翹三錢 僵蠶三錢 人中黃二錢

銀花三錢 牛蒡子二錢 荊芥三錢 薄荷二錢

趙四十二歲丙戌年正月九日

張
六十七
歲甲申
年正月
十六日

本有肝鬱。又受不正之時令濁氣。故舌黑苔。口苦。胸痛。頭痛。脈不甚數。不渴者。年老體虛。不能及時傳化邪氣也。法宜辛涼芳香。

連翹三錢 桔梗三錢 豆豉三錢 荊芥二錢

薄荷錢半 生甘草一錢 鬱金二錢 元參三錢

銀花三錢 蘆根三錢

共為粗末。蘆根湯煎。

十七日

老年肝鬱挾溫。昨用辛涼芳香。今日舌苔少化。身有微汗。右脈始大。邪氣甫出。但六脈沈取極弱。下虛陰不足也。議辛涼藥中加護陰法。

桔梗三錢 麥冬三錢 元參五錢 甘草錢半

豆豉二錢 細生地三錢 連翹二錢 銀花三錢

蘆根三錢

今日一帖。明日一帖。每帖煮二杯。

十八日

老年陰虧。邪退十分之七。即與填陰耳聾脈訕。可知其陰之所存無幾。與復脈法。

炙草三錢 白芍六錢 阿膠三錢 麥冬八錢

麻仁三錢 大生地八錢

十九日 較昨日熱退大半。但脈仍大。即於前方內加鱉甲六錢。以搜餘邪。
二十日 脈靜便溏。再於前方內加牡蠣八錢收陰。甘草三錢守中。

風溫者。震方司令而化溫也。溫邪化熱。先傷乎肺。繼而變證甚繁。總之手三陰見症為多。治法宜辛涼。不宜辛溫。宜甘潤。不宜苦降。蓋辛溫燥肺。苦降傷胃。今觀先生之治。則有辛涼解肌。甘寒退熱。芳香利竅。甘苦化陰。時時輕揚。存陰退熱諸法。種種有條。方全法備。則先生不亦神聖工巧之手乎。
舒配瑯

溫疫

溫熱發斑咽痛。

章七十歲

生石膏一兩 人中黃二錢 苦桔梗六錢 知母四錢

射干三錢 芥穗二錢 元參五錢 銀花六錢

牛蒡子 五錢

黃 芩 二錢

連 翹 六錢

馬 勃 二錢

犀 角 三錢

葦根白茅根煎湯。煮成四碗。日三服。夜一服。

溫斑三日。猶然骨痛。胸痛。咽痛。肢厥。未張之穢熱尙多。清竅皆見火瘡。目不欲開。脈弦數而不洪。口乾燥而不渴。邪毒深居血分。雖有藥可治。恐高年有限之陰精不足。當此燎原之勢。又恐不能擔延十數日之久。刻下趁其尙在上焦。頻頻進藥。速速清陽。再以芳香透絡逐穢。俾邪不入中下焦。可以望愈。

約二時間服紫雪丹二分。宜泄血絡之穢毒。

連 翹 一錢

銀 花 一錢

犀 角 五分

薄 荷 三分

牛蒡子 一錢

炒研

丹 皮 五分

人 中 黃 三分

桔 梗 一錢

白茅根 五分

元 參 一錢

鬱 金 四分

藿香梗 五分

炒黃芩 三分

芥 穗 三分

馬 勃 三分

葦 根 五分

射 干 五分

周十二時入帖。

照前方加金汁五匙。仍周十二時服八帖。

照前方加犀角三分。黃連三分。炒枯。仍周十二時入帖。

邪有漸化之機。但心火熾盛。陰精枯而被燂。當兩濟之。

犀角

先煎一兩

銀花六錢

生白芍六錢

細生地八錢

連翹六錢

麥冬一兩
連心

黃連四錢
先煎

丹皮一兩

生甘草四錢

白茅根五錢

鮮荷葉四錢

煮四碗。分四次服。

仍用前藥一帖。先煮半帖。約八分二杯。除先服昨日餘藥一碗外。晚間服

此二碗。餘藥明早煮成。緩緩服之。

如前日法。邪去八九。收陰中兼清肺胃血分之熱而護津液。

生白芍六錢

大生地一兩

沙參三錢

炙甘草三錢

柏子霜三錢

火麻仁三錢

麥冬八錢

白茅根五錢

八分三杯。三次服。

裏熱甚。胸悶骨痛。必須補陰而不宜呆膩。

生白芍四錢

沙苑子二錢

細生地五錢

沙參三錢

麥冬五錢

柏子霜三錢

冰糖二錢

廣皮炭錢半

王三十八歲五月初十日

溫熱係手太陰病。何得妄用足六經表藥九帖之多。卽以傷寒論自開闢以來。亦未有如是之發表者。且柴胡爲少陽提線。經謂少陽爲樞。最能開轉三陽者。今數數用之。升提太過。不至於上厥下竭不止。汗爲心液。屢發不已。旣傷心用之陽。又傷心體之陰。其勢必神明內亂。不至於譫語顛狂不止也。今且救藥逆。治病亦在其中。溫病大例四損重逆難治。何謂四損。一曰老年真陽已衰。下虛陰竭。一曰嬰兒稚陰稚陽未充。一曰產婦大行血後。血舍空虛。邪易乘虛而入。一曰病久陰陽兩傷。何謂重逆。玉函經謂一逆尙引日。再逆促命期。今犯逆藥至九帖之多。豈止重逆哉。

連翹三錢

銀花三錢

薄荷八分

麥冬八錢

丹皮五錢

桑葉三錢

元參五錢

細生地五錢

羚羊角三錢

辛涼芳香甘寒法。辛涼解肌分發。越太過之陽。甘寒定騷擾復喪失之。

陰。芳香護膻中。定神明之內亂。

十一日 過服辛溫。汗出不止。神明內亂。譫語多笑。心氣受傷。邪氣乘之。法當治以芳香。

紫雪丹五錢。每服一錢。其湯藥仍服前方。日二帖。

十二日 靈樞溫熱論曰。狂言失志者死。况加以肢厥冷過肘膝。脈厥六部全無。皆大用表藥。誤傷心陽。致厥陰包絡受傷之深如是。現在危急之秋。只有香開內竅。使錮蔽之邪。一齊湧出。方妙。且喜舌苔之板者已化。微有渴意。若得大渴。邪氣還表。脈出身熱。方是轉機。即於前方內加犀角三錢。如譫語甚。約二時辰。再服紫雪丹一錢。

十三日 肢厥脈厥。俱有漸回之象。仍服前方二帖。晚間再服紫雪丹一錢。牛黃丸一粒。明早有譫語。仍服紫雪丹一錢。不然不必服。

十四日 厥雖回而噦。目白睛。面色猶赤。

連翹	二錢	元參	五錢	丹皮	三錢	銀花	二錢
麥冬	五錢	犀角	一錢	細生地	五錢	煅石膏	三錢

羚羊角三錢

今晚一帖。明早一帖。

十五日

即於前方內加

柿蒂六錢

黃芩二錢

鬱金三錢

日二帖。

十六日

諸症悉減。但舌起新苔。當防其復。

連翹二錢

元參三錢

丹皮二錢

銀花二錢

麥冬三錢

犀角五分

黃芩二錢

鬱金二錢

牛蒡子二錢

柿蒂二錢

細生地三錢

今晚一帖。明早一帖。

謝
五月初三日

酒客脈象模糊。苔如積粉。胸中霧悶。病勢十分深重。再舌苔刮白。大便晝夜十數下。不惟溫熱。且兼濁溼。豈傷寒六經藥可治。

連翹錢半

滑石三錢

鬱金二錢

銀花二錢

藿香二錢

生苡仁三錢

杏仁三錢

黃連錢半

豆 豉二錢 薄荷一錢

今晚一帖。明早一帖。

初四日 溫病始終以護津液為主。不比傷寒以通陽氣為主。

連 翹三錢 黃 芩二錢 桑 葉三錢 甘 草八分

麥 冬五錢 銀 花三錢 薄 荷一錢 豆 豉二錢

黃 連二錢 滑 石三錢

今晚一帖。明早一帖。

初五日 舊苔已退。新苔又出。邪之所藏者尚多。脈象之模糊者。較前稍覺光明。

連 翹三錢 麥 冬四錢 通 草八分 銀 花三錢

薄 荷八分 天花粉三錢 桑 葉二錢 滑 石三錢

黃 芩二錢 杏 仁三錢 藿香葉八分 黃 連二錢

鮮蘆根三錢

初六日 脈洪。舌滑而中心灰黑。餘皆刮白。濕中穢濁。須重用芳香。

連 翹三錢 荷葉邊二錢 豆 豉三錢 銀 花二錢

通 草錢半 鬱 金三錢 薄 荷一錢 滑 石五錢
藿 香三錢 黃 芩二錢 蘆 根五錢 黃 連三錢
今晚一帖。明早一帖。

初七日 溫病已有涼汗。但脈尚數而協熱下利不止。議白頭翁湯法。

白頭翁五錢 生白芍二錢 秦 皮三錢 黃 芩三錢
黃 連三錢

初八日

熱邪雖退。而脈仍未靜。尚有餘熱未清。大泄十餘日。大汗一晝夜。津液喪亡已多。不可強責小便。再胃之上脘痛。有責之陽衰者。有責之痰飲者。有責之液傷者。茲當熱邪大傷津液之後。脈尚未靜。猶然自覺痰黏。斷不得作陽衰論。且陽衰胸痺之痛。不必咽津而後痛也。與甘苦合化陰氣法。既可以保胃汁。又可以蓄水之上源。得天水循環。水天一氣。自然暢流。

麥 冬六錢 炙 草三錢 大生地五錢 火麻仁三錢
生牡蠣五錢 黃 連一錢 炒黃芩一錢 沙 參三錢
象貝母二錢

煮三碗。三次服。渣煮一碗。明早服。

初九日

即於前方內加

丹皮三錢 赤芍三錢

初十日

肺脈獨大。仍渴思涼。

連翹三錢 知母二錢 銀花三錢 桑葉三錢

黃芩二錢 杏仁三錢 生甘草一錢 煅石膏三錢

今晚一帖。明早一帖。

十一日

左關獨大。仍喜涼物。餘熱未清。小便赤。用苦甘法。

黃連一錢 知母二錢 黃芩二錢 生草一錢

丹皮五錢 細生地二錢 桑葉三錢 赤芍二錢

木通二錢 麥冬二錢

今晚一帖。明早一帖。

長氏
二十二歲

溫熱發疹。係木火有餘之證。焉有可用足三陽經之羌防柴葛。誅伐無過之理。舉世不知。其如人命何。議辛涼達表。非直攻表也。芳香透絡。非香燥

初四日也。

連翹六錢 銀花八錢 薄荷三錢 桔梗五錢
元參六錢 生草二錢 牛蒡子五錢 黃芩三錢

桑葉三錢

為粗末。分六包。一時許服一包。蘆根湯煎。

初五日 溫毒脈象模糊。舌黃喉痺。胸悶渴甚。議時時輕揚。勿令邪聚方妙。

連翹八錢 銀花一兩 薄荷三錢 元參一兩
射干三錢 人中黃三錢 黃連三錢 牛蒡子一兩
黃芩三錢 桔梗一兩 生石膏一兩 鬱金三錢

杏仁五錢 馬勃三錢

共為粗末。分十二包。約一時服一包。蘆根湯煎。

初六日 舌苔老黃。舌肉甚絳。脈沈壯熱。夜間譫語。煩躁面赤。口乾唇燥。喜涼飲。議

急下以存津液法。用大承氣減枳朴辛藥。加增液潤法。

生大黃八錢 元明粉四錢 厚朴三錢 枳實三錢

元參三錢 麥冬五錢 細生地五錢
煮三杯。先服一杯。得快便止。後服。不便或不快。進第二杯。約三時不便。進第三杯。

初七日 其勢已殺。其焰未平。下後護陰為主。用甘苦化陰。

細生地八錢 黃芩二錢 元參三錢 生草一錢
丹皮五錢 麥冬六錢 黃連錢半

煮三杯。分三次服。渣煮一杯。明早服。

初八日 脈浮邪氣還表。下行極而上也。即於前方內加

連翹三錢 銀花三錢 去黃連

初九日 脈仍數。餘焰未息。口仍微渴。少用玉女煎法。兩解氣血伏熱。

細生地 生甘草 麥冬 連翹
元參 銀花 生石膏 知母

各等分。服法如前。

初十日 脈沈微數。自覺心中燥。腹中不爽。舌上老黃苔。二日不大便。議小承氣湯

微和之。

生大黃三錢 厚朴三錢 枳實二錢

水五杯。煮二杯。先服一杯。得利止後服。不快再服。

趙七十歲
五月十日
二日
溫病之例。四損重逆為難治。今年老久病之後。已居四損之二。况初起見厥病入已深。再溫病不畏其大渴。引飲思涼。最畏其不渴。蓋渴乃氣分之病。不渴則歸血分。此皆年老藩籬已撤。邪氣直入下焦之故。勉議清血分之熱。加以領邪外出法。

丹皮二錢 細生地二錢 連翹二錢 鬱金二錢

桔梗一錢 羚羊角錢半 甘草五分 桑葉一錢

銀花一錢 麥冬一錢 茶菊花一錢 薄荷八分

日三帖。渣不再煎。

十三日
今日厥輕。但老年下虛。邪居血分。不肯外出。可畏。用辛涼合芳香法。

連翹三錢 牛蒡子三錢 藿香錢半 元參三錢

豆豉三錢 薄荷八分 銀花三錢 鬱金錢半

桑葉二錢 細生地三錢 丹皮三錢 麥冬三錢 蘆根五寸

十四日

六脈沈數而實。四日不大便。汗不得除。舌苔微黃。老年下虛。不可輕下。然熱病之熱退。每在裏氣既通以後。議增液湯。作增水行舟之計。

元參二兩 細生地一兩 梔子炭六錢 丹皮六錢 麥冬一兩 牛蒡子八錢

十五日

水八碗。煮三碗。三次服。均於今晚服盡。明早再將渣煮一碗服。仍未大便。酌加去積聚之潤藥。即於前方內加

元參一兩 細生地一兩

十六日

脈已滑。渴稍加。汗甚多。邪有欲出之勢。但仍未大便。猶不能外增液法。少入玉女煎可也。既可潤腸。又可保護老年有限津液。不比壯年可放心攻劫也。

元參三兩 知母三錢 細生地二兩 麥冬一兩 生甘草二錢 生石膏一兩 銀花六錢 連翹五錢

十七日 渴更甚。加以保肺為急。即於前方內加

黃芩三錢 生石膏一兩 知母二錢

十八日 大便已見。舌苔未淨。脈尚帶數。不甚渴。仍清血分為主。複領邪法。

麥冬三錢 生甘草二錢 細生地一兩 元參五錢

丹皮六錢 銀花三錢 連翹三錢 黃芩二錢

煮三碗。三次服。

苗七十歲 初一日 溫熱本木火有餘之病。無奈世人不識四時。乃以治冬日之羌防柴葛治之。是之謂抱薪厝火。誤傷心陽。其勢不至於神昏譫語。痙厥顛狂不休也。議以清宮湯。急清宮城為要。

麥冬一兩 連心 生石膏六錢 元參心六錢 犀角五分

蓮子心一兩 竹葉心三錢 細生地五錢 黃連二錢

連翹五錢 連心 丹皮五錢 勾藤勾三錢

再按痙厥神昏。故以清宮為主。血分太熱。脈極數。故以地黃湯犀角為佐。邪氣在血分雖多。尚能渴思涼飲。故加石膏合冬地為玉女煎法。以

初二日

清氣血兩燔之伏熱。大抵治逆之症。不能一轍。其勢不得不用複方也。煮成三碗。分三次服。明日渣再煮半碗服。諸證俱減而未盡除。脈之至數亦減。但老年下虛。效聲不滿喉嚨。可畏之至。議搜邪之中。寓補陰和陽之用。

麥冬二兩

丹皮八錢

黃芩三錢

黃連二錢

連翹三錢

生石膏一兩

細生地一兩

大生地一兩

犀角五錢

初三日

脈證雖減。猶在險途。

大生地一兩

黃連二錢

犀角五錢

黃芩三錢

細生地一兩

麥冬二兩

丹皮六錢

連翹三錢

焦白芍五錢

熟石膏五錢

初四日

神識略清。脈洪數有力。周身盡赤若斑。大便大。頻用玉女煎加苦以堅陰。今晚明早。如神識不甚清爽。再服紫雪丹三五錢。

大生地一兩

黃連三錢

黃芩三錢

知母三錢

犀 角六錢

細生地一兩

丹 皮六錢

麥 冬二兩

生石膏八錢

炒京米一撮

頭煎煮三杯。二煎煮二杯。今日服三次。明早服二次。各一杯。

初五日

即於前方內加

元 參六錢 去京米

此證服紫雪丹共一兩八錢。牛黃丸五粒。神識清。大便通。舌苔退。脈靜身涼。後二甲復脈湯十八帖。

普 四十四歲五月廿九日

溫熱月餘不解。初用橫補中焦。致邪無出路。繼用暑溼門中剛燥。致津液大虧。溼熱之邪。仍未能化。現在乾嘔脈數。大小便閉。煩躁不安。熱仍未除。證非淺鮮。議甘寒苦寒合化陰氣。令小便自通。若強責小便。不畏泉源告竭乎。

生石膏一兩

元 參一兩

細生地六錢

知 母四錢

連 翹八錢

丹 皮五錢

麥 冬八錢

銀 花三錢

生甘草二錢

炒黃芩二錢

黃 連二錢

三十日

煮成三碗。今日分三次服完。明早再煮一碗服。昨用玉女煎銀翹散合法。再加苦寒。為甘苦合化陰氣。又為苦辛潤法。今日已見大效。汗也。便也。表裏俱通。但脈仍沈數有力。是仍有宿糞。與久羈之結邪相搏。議增水行舟。複入陰搜邪法。

麥冬一兩

丹皮六錢

生甘草三錢

黃芩炭二錢

大生地六錢

北沙參五錢

生鱉甲八錢

生牡蠣六錢

柏子霜三錢

黃連錢半

史三十歲

溫病汗後。法當脈靜身涼。今脈雖為汗衰。究有五至。且不能弱。况對醫者說病刺刺不休。豈一二日內欲虛脫者。而能若是乎。此證人僉畏其虛。我獨畏其實也。現在大便溏泄頻頻。勢若可畏。然不可與收攝腎胃兩關。蓋伏邪藏深。為日已久。茲方有出路。而可驟行納縮乎。但柔滑之品。須暫行停止。議熱淫於內。治以甘苦。佐以鹹寒法。妙在即寓堅陰收納於其中。

生牡蠣二兩

炙甘草五錢

生鱉甲二兩

黃柏炭三錢

黃芩炭三錢

周
六十三
歲六月
初八日

溫熱最忌足三陽藥。且柴胡直升少陽。不至於下竭上厥不止。且即係傷寒。從無用柴胡十數日之多。現在嘔而便血。靈樞所謂不治之症。勉議犀角地黃湯。加黃連苦甘合化法。

大生地六錢

犀角二錢

黃連一錢

生白芍四錢

丹皮四錢

麥冬六錢

黃芩二錢

分作二次服。以不嘔不便血小便不赤為度。

十一日

諸證稍減。但為日已久。以重護津液為主。複苦甘合化陰氣法。

大生地一兩

黃芩二錢

生白芍五錢

黃連八分

麥冬一兩

元參一兩

丹皮六錢

廣鬱金二錢

脈數急。身熱頭痛。思涼飲。暑傷手太陰。切忌誤認傷寒而用羌防柴葛。

連翹三錢

桑葉錢半

甘草一錢

銀花三錢

石膏四錢

苦桔梗二錢

薄荷八分

豆豉錢半

知母二錢

二十四日

即於前方內加

梁
六十二
歲丙辰
年六月
二十三日

二十五日 六脈洪大而數。渴思涼飲。純陽之症。氣血兩燔。用玉女煎。
石膏一兩 細生地八錢 知母五錢 元參四錢
廣鬱金三錢 杏仁泥三錢 荷葉邊一張

梁 二十二歲壬申年六月初四日
溫熱自汗。脈浮。舌滿白。最忌足三陽表藥發汗。用辛涼法。
煮三杯。分三次服。

苦桔梗五錢 杏仁三錢 甘草三錢 薄荷二錢
銀花六錢 藿香二錢 連翹六錢 鬱金二錢

初六日 溫病脈浮自汗。喘喝。舌苔白厚。思涼飲。用辛涼重劑。
牛蒡子五錢

生石膏一兩 桑葉五錢 知母五錢 牛蒡子五錢
連翹六錢 元參一兩 銀花六錢 人中黃三錢

初七日 疫後肢痺。
共為粗末。分八包。一時許服一包。

杏仁泥三錢

連翹三錢

石膏六錢

銀花二錢

防己三錢

生甘草一錢

廣鬱金錢半

十一日 肢痺。

桂枝三錢

生苡仁三錢

生石膏五錢

防己三錢

杏仁泥三錢

片子薑黃三錢

海桐皮二錢

溫熱復作。身熱身痛。舌苔重濁。忌羌防柴葛。議辛涼合芳香法。

荊芥穗五錢

元參三錢

藿香葉二錢

薄荷三錢

豆豉三錢

連翹六錢

苦桔梗六錢

銀花八錢

甘草三錢

牛蒡子三錢

鬱金三錢

共爲粗末。分八包。一時許服一包。蘆根湯煎。

大渴思涼飲。大汗如注。脈數急。非辛涼重劑。不足以解之。

生石膏二兩

知母五錢

麥冬一兩

生甘草三錢

細生地一兩

連翹三錢

銀花三錢

桑葉二錢

煮成三碗。分三次服。

廿五歲壬申年六月十八日

用辛涼重劑。大熱已解。脈小數。以養陰清解餘邪立法。

麥冬八錢 丹皮三錢 細生地五錢 知母二錢

生甘草二錢 元參五錢

煮法如前。

溫熱七日不退。渴思涼飲。脈仍洪浮而長。急宜辛涼退熱。加入芳香化濁。最忌羌防柴葛發表。腹痛者穢濁也。勿認作寒。用溫藥。

連翹六錢 牛蒡子三錢 銀花六錢 石膏六錢

廣鬱金三錢 藿香葉三錢 苦桔梗六錢 豆豉三錢

知母二錢 人中黃二錢 黃芩二錢 丹皮二錢

共為粗末。分六包。約一時許服一包。蘆根湯煎。去渣服。

十九日 熱稍減。脈勢亦減過半。氣分尚未解透。血分亦有邪耳。今用玉女煎加芳香法。

麥冬一兩 知母三錢 細生地八錢 鬱金錢半

丹皮六錢 豆豉二錢 生甘草三錢 元參六錢

生石膏六錢

煮成三茶杯。渣再煎一茶杯。每服一杯。分四次服。

二十日

幼童溫病。熱退七八。以存陰退熱。為第一要着。

麥冬二兩

生甘草一錢

細生地八錢

知母錢半

元參兩半

丹皮三錢

頭煎兩茶杯。二煎一茶杯。三次服。

二十一日

熱漸退。手心熱特甚。陰傷之象。用存陰法。

大生地五錢

焦白芍三錢

細生地五錢

麻仁三錢

丹皮三錢

炙甘草三錢

沙參三錢

麥冬六錢

二十三日

幼童熱病退後。一以存陰為主。最忌與枳朴開胃。黃芩清餘熱。醫者誠能識此。培養小兒不少矣。

焦白芍五錢

炒玉竹二錢

炙甘草二錢

麥冬五錢

元參三錢

沙參三錢

大生地五錢

丹皮三錢

陳氏

溫病誤汗七次。以致心陽受傷。邪入心包。神昏不語。膈上之邪。仍然不解。

甲子年
四月初
三日

非芳香化濁。能入心包者。不足以救之。

牛黃丸三丸。約一時服一丸。服後如神。仍不清不語。再服二三丸。

前方用芳香開臚中。是治邪法。恐老年陰氣告竭。自汗而脫。最用復脈法護陰。是固正法。二更後服。

炙甘草三錢

生地五錢

丹皮三錢

白芍三錢

生鱉甲六錢

麥冬六錢

阿膠三錢

麻仁三錢

元參五錢

初四日

老年溫病日久。誤用風藥過多。汗出傷津。以致大便堅結不下。口乾舌黃。係陽明症。當下之。但氣血久虛。恐不任承氣。議增液湯。一面增液而補正。一面去積聚以驅邪。增水行舟計也。

元參兩半

次生地兩半

麥冬一兩二錢連心

水八碗。煮取三碗。分三次服。不便再服。便後服前方一帖。

初五日

脈仍有力。舌黃黑。仍有宿糞未淨。再服增液一帖。

元參兩六錢

細生地二兩

麥冬二兩

煮成三碗。分三次服。

初六日 大便後仍用二甲復脈法。以復其喪失之真陰。

炙甘草六錢

大生地八錢

炒白芍六錢

阿膠一錢

麻仁三錢

麥冬八錢

沙參三錢

牡蠣五錢

鱉甲五錢

濃煎三碗。零星緩服。

于

溫病誤表。面赤神昏譫語。肢掣肉瞤。先用牛黃丸清包絡之邪。

牛黃丸三粒

湯藥用麥冬 生地等味。

十三日

今日脈浮。鼻息太粗。粗甚則為喘矣。溫病大忌喘促。恐化源絕也。再手指與臂。時時掣動。癰瘰之象也。勉與玉女煎法。

細生地五錢

大生地五錢

生石膏一兩

元參五錢

知母三錢

生甘草二錢

麥冬一兩

丹皮五錢

煮成三碗。分三次服。渣再煎一碗服。

十四日 前方沃法也。今日仍用。加

石膏五錢

犀角三錢

以清包絡而護腎水。

十五日 脈浮爲邪氣還表。渴甚加石膏。

連翹五錢

銀花五錢

生石膏兩六

犀角三錢

麥冬一兩

知母三錢

甘草二錢

細生地六錢

今日一帖。明日渴甚服二帖。渴止服一帖。不熱不渴。或去石膏。

十七日 溫病誤治日久。上焦之熱未淨。下焦之液已虧。用清上實下法。

細生地五錢

大生地五錢

麥冬六錢

生鱉甲六錢

知母五錢

石膏八錢

甘草三錢

牡蠣五錢

丹皮五錢

生白芍三錢

明日熱全退不渴。去石膏。即不退全。不渴思涼飲。亦去。假使病如今日。

方亦如今日。頭煎二碗。二煎一碗。

十九日 照前方再服一帖。

二十日 渴止脈靜身涼。用復脈法。

楊
甲子年
四月初
四日

溫病自汗。脈浮。神氣昏霧。時有譫語。可先服牛黃丸二丸。繼以人參白虎湯。

生石膏

八兩
先煎

洋參四錢

知母四兩

京米二合

炙甘草一錢

神清止牛黃丸。熱退止石膏。不然俱再作服。

初五日

於前方內加洋參四錢。共成八錢。

初六日

大用白虎。脈為斂戢。熱未全退。咳而腹痛。議甘苦合化陰氣法。

麥冬六錢

生甘草二錢

沙參三錢

杏仁粉五錢

連翹三錢

細生地五錢

黃芩三錢

銀花三錢

知母三錢

黃連二錢

今日晚服一帖。明早一帖。每帖煮二碗。

初七日

今日脈少斂。但手心熱甚於手背。溫熱未淨。而津液已虧。用存陰退熱法。兼潤肺燥。

沙參八錢

桑葉三錢

麥冬二兩

柏子霜三錢

細生地一兩 丹皮六錢 知母六錢 生甘草五錢

元參五錢

煮四碗。分四次服。

初十日 脈復大而訖。

生石膏二兩 知母八錢 甘草六錢 京米一撮

洋參二錢 麥冬八錢 細生地六錢

五杯水煮兩杯。分二次服。渣如上法。

十一日 脈勢火斂。但手心熱甚。應治裏。議熱淫於內。治以甘苦。佐以鹹寒。

炒知母三錢 甘草三錢 細生地六錢 生鱉甲八錢

麥冬八錢 生牡蠣五錢 黃芩炭二錢

頭煎三杯。二煎一杯。分四次服。

十二日 脈復浮大而訖。前方去二甲黃芩。加石膏洋參。

十三日 脈少斂。熱未淨。左脈仍空大。用存陰退熱法。

細生地八錢 丹皮五錢 元參四錢 白芍六錢

麥冬一兩 桑葉三錢 知母三錢

煎四碗。日三服。夜一服。

十四日 邪少虛多。且左大爲下焦血分。非右大可比。議復脈法。復胃中之陰。漸有驅邪之勢。

炙甘草五錢 阿膠三錢 麥冬六錢 麻仁三錢

生白芍六錢 大生地六錢 生鱉甲六錢 生牡蠣六錢

知母四錢

頭煎水八碗。煎成三碗。二煎一碗。日三服。夜一服。

十八日 服前方。

五月初五日 溫病愈後十五日。未服真元。復中暑溫卒厥。俗名暑風。治在厥陰足少陽。

桑葉二錢 杏仁泥錢半 羚羊角二錢 菊花二錢

銀花二錢 連翹二錢 勾藤錢半 生甘草一錢

荷葉邊三錢

日三帖。

岳

七十八
歲二月
十八日

右脈大於左。滑而且數。舌苔老黃。渴欲涼飲。診尺篇。所謂尺膚熱爲溫病者是也。法宜辛涼解肌。合芳香化濁。切忌辛溫發表。甘熱溫裏。

連翹二錢

銀花二錢

藿香葉錢半

薄荷一錢

元參錢半

牛蒡子二錢

鬱金二錢

杏仁泥二錢

豆豉二錢

蘆根三把

水三杯。煮一杯。日三服。

十九日

其人素有痰飲。又以客氣加臨。身熱苔黃。脈數思涼。爲溫病。昨用辛涼芳香。今日大便後。病勢仍未除。仍須辛涼解散。金匱所謂先治新病。舊病當後治也。但當回護痰飲耳。

生石膏四錢

杏仁粉三錢

連翹三錢

蘆根二錢

鬱金一錢

牛蒡子二錢

薄荷八分

藿梗錢半

生甘草一錢

今晚明早共三帖。

二十日

病勢雖較前稍減。脈體亦小。黃苔亦微。但寒從左升。熱入陰分。寒少熱多。

頗似溫瘧。議白虎桂枝法。加青蒿等。使陷下之邪。一齊湧出。庶不致纏綿日久。坐耗真元也。

煅石膏三錢

知母錢半

甘草一錢

桂枝三錢

京米一撮

青蒿八分

日二十一

痰飲是本病。溫熱是客氣。客氣易退。本病難除。現在客氣已減六七。脅下常痛引痛。係痰飲爲患。大溫大涼。皆在難施之際。仍議以辛而微涼者。清不盡之邪。復以芳香降氣開痰止痛。如下半日渴思涼飲。仍加石膏三錢。

降香末三錢

蘇子霜二錢

製香附三錢

連翹二錢

杏仁泥三錢

銀花三錢

旋覆花包三錢

鬱金二錢

日二十二

脈靜身涼。舌苔悉退。溫熱已盡。惟餘痰飲脅痛。一以宣通懸飲爲法。

生香附二錢

降香末三錢

廣皮錢半

旋覆花包三錢

小茴香三錢

半夏四錢

蘇子霜二錢

鬱金二錢

杏仁泥三錢

甘瀾水五杯。煮取二杯。分二次服。明早一帖。

二十三日 今大便後。面微赤。脈微大。舌微苔。胸中熱思涼飲。又有餘邪上泛之故。

議芳香之中。仍稍加辛涼。

旋覆花三錢

杏仁泥五錢

連翹二錢

降香末二錢

小枳實三個

銀花三錢

生香附二錢

鬱金二錢

蘆根三把

二十四日 猶有餘熱。舌苔未化。仍用前法。但小便不禁。去枳實。
二十五日 脈靜身涼。惟頭微熱。飲邪已去八九。一以宣肺透飲為主。須能入脅者宜之。

杏仁泥三錢

鬱金二錢

茯苓三錢

旋覆花三錢

蘆梗三錢

降香末二錢

生香附三錢

甘瀾水五杯。煮成兩杯。分二次服。

食復。脈弦細而滑。脅痛脹。舌苔重濁。不思食。其人本有痰飲。與兩和肝胃法。

三月初四日

旋覆花三錢

青皮錢半

鬱金二錢

製香附半錢

廣皮炭錢半

紅麴八分

降香末三錢

半夏三錢

神麴炭二錢

脈雖安靜。苔尚未化。未可恣意飲食。脅下刺痛。開胃兼與和絡。

半夏五錢

新絳三錢

烏藥二錢

廣皮錢半

旋覆花三錢

歸鬚二錢

青皮錢半

降香末三錢

鬱金二錢

生香附二錢

延胡索一錢

小枳實一錢

章

丙寅年
二月十一日

頭痛身熱。脈訖數。口渴。自汗。喉痛。舌苔重濁。而尖赤甚。溫病也。勢甚重。法宜辛涼。最忌發汗。

連翹三錢

銀花三錢

麥冬三錢

桔梗三錢

桑葉錢半

細生地三錢

甘草一錢

薄荷八分

射干二錢

元參三錢

牛蒡子三錢

今晚一帖。明早一帖。

十二日

溫熱咽痛之極。陰本虧也。

桔梗八錢

人中黃三錢

馬勃三錢

牛蒡子八錢

十三日

元參八錢 連翹六錢 射干四錢 黃連三錢
黃芩三錢 銀花三錢 薄荷二錢 荊芥穗二錢
細生地四錢
共爲粗末。分八包。一時服一包。蘆根湯煎。去渣服。
大便通。咽痛減。脈漸靜。不可躁。

十四日

桔梗三錢 麥冬五錢 黃芩一錢 銀花三錢
元參五錢 連翹二錢 射干二錢 人中黃一錢
丹皮二錢 蘆根二根 黃連一錢 細生地五錢
白茅根三錢 牛蒡子三錢
煮兩碗。分二次。今晚明早各半帖。
脈靜痛止大半。小便未暢。餘燄尙存。仍不可食穀。

細生地五錢 連翹二錢 射干二錢 丹皮三錢
銀花二錢 人中黃錢半 元參三錢 牡蠣三錢
桔梗二錢 黃芩一錢 麥冬六錢 黃連八分

二帖共煎四碗。分四次服。明日午前服完。計今日兩碗。明日兩碗。如服完後。喉仍微痛。小便不暢。明曉再服一帖。如喉痛已止。小便亦暢。可少啜粥湯。靜俟十六日換方服藥。

十六日

脈靜身涼。用一甲復脈湯。

炙甘草 三錢

大生地 六錢

阿膠 三錢

麥冬 五錢

白芍 六錢

麻仁 三錢

牡蠣 八錢

趙初六日

熱病脈七至。煩躁無寧晷。譫語神昏。汗出輒復熱。脈不為汗衰。內經所謂見三死不見一生。雖愈必死也。余向來見此症。每用一面大劑護陰清熱。一面搜逐心包之邪。獲效亦不少。但黃帝岐伯所云之死症。誰敢謂必生。勉與玉女煎法。

生石膏 四兩

次生地 八錢

知母 一兩

麥冬 八錢

甘草 五錢

京米 一合

煮五杯。分五次服。外服紫雪丹。

初七日

溫熱未清。又加溫毒喉腫。舌腫。唇腫。項強。面色反青。伏毒不發。與痘科之

悶痘相似。可與代賑普濟散。

一時許服一包。鮮荷葉邊湯煎。其紫雪丹照舊服不可斷。有好牛黃清心丸亦可。

初八日

熱病瘵癉。瘵厥神昏。脈洪大而芤。與育陰潛陽。鹹以止厥法。但喉舌之腫。未能一時消盡。可與代賑普濟散間服。其紫雪丹仍用。

細生地一兩

麥冬連心

生白芍五錢

勾藤勾三錢

丹皮四錢

生鱉甲八錢

生牡蠣八錢

犀角三錢

黃芩二錢

煮三杯。分三次服。

初十日

左脈洪而有力。右脈甚軟。是溫邪日久。陷入下焦血分無疑。古謂三時熱病。深入下焦血分者。每借芳香以爲搜逐之用。仍用紫雪丹五分一次。約三次。熱退神清。能言即止。

次生地一兩

丹皮三錢

生鱉甲六錢

生白芍五錢

麥冬連心

生龜板六錢

生牡蠣六錢

生甘草五錢

生阿膠五錢入

十一日 汗已得而脈未靜。宿糞已解而腫未消。神未清。其代賑普濟散仍服一二
次。紫雪丹仍服三五分。其湯藥與重收陰氣。

生白芍五錢

細生地一兩

生甘草五錢

麥冬五錢

黃芩三錢

生牡蠣二錢研粉

煮三杯。分三次服。渣再煎一杯。明日服。

十二日 汗出脈靜身涼之後。甫過七八日。忽又身熱。脈洪數有力。便濇口渴思涼。

乃餘邪續出。以當日受邪之時。非一次也。並非食復勞復之比。但久病不
宜反復。恐氣血不支也。與玉女煎法。紫雪丹三分一次。身熱神昏瘕瘕
則服。否則止。

生石膏八錢

生甘草三錢

知母五錢

細生地五錢

麥冬五錢

黃芩三錢

京米一撮

十三日 減石膏。

十四日 今日脈浮大。下行極而上也。

生石膏^{二兩}另煎有熱則加。

知母五錢

次生地八錢

生鱉甲五錢

生甘草四錢

龜板五錢

麥冬六錢

生牡蠣五錢

京米一撮

頭煎三杯。今夜服。二煎兩杯。明早服。若能睡熟但令穩睡。不可呼之服藥。

十五日

今日右脈已小。左脈仍壯。邪氣又歸下焦血分。先用紫雪丹以搜之。繼以培陰清熱。熱淫於內。治以鹹寒。佐以苦甘法。

知母五錢

生甘草四錢

生牡蠣六錢

次生地一兩

丹皮四錢

生鱉甲六錢

黃柏三錢

麥冬六錢

生龜板六錢

生白芍三錢

煮五杯。今晚服三杯。明早兩杯。

十六日
今日右脈復浮而大。猶思涼飲。暫與玉女煎法。其芳香搜逐邪濁之法。仍不能止。

生石膏一兩

知母五錢

生甘草四錢

次生地六錢

麥冬六錢 生鱉甲六錢 京米一合

煮四杯。分四次服。

十七日

今日右脈稍沈而小。左脈仍洪大而浮。餘邪續出。神識反昏。微瘕瘕。肢微厥。非吉兆也。舌上津液已回。大便甚通。自始至終。總無下法。只有護陰一面。搜逐深入之伏邪。

大生地一兩 生鱉甲五錢 生甘草四錢 丹皮三錢

勾藤勾三錢 生白芍六錢 生牡蠣五錢 麥冬六錢

阿膠三錢 生龜板五錢

煮五杯。分五次服。

十八日

神清改方。

十九日

溫毒日久。諸症減。惟脈未靜。應照邪少虛多例。其不盡之邪。付之紫雪可也。

生白芍四錢 勾藤三錢 生鱉甲五錢 大生地八錢

麥冬六錢 生龜板五錢 炙甘草三錢 羚羊角三錢

二十日

病雖漸次就退。伏熱猶未清楚。暫與少加清熱之品。

生牡蠣五錢 丹皮四錢 阿膠三錢

養四杯。分四次服。

生白芍四錢 勾藤二錢 次生地一兩 生甘草三錢

羚羊角三錢 丹皮三錢 麥冬六錢 生牡蠣六錢

黃芩二錢 生鱉甲四錢

養三杯。分三次服。

二十一日

猶有瘕瘕。仍從少陽中求之。再用紫雪丹一錢。分二次服。

劉日

六十歲

癸丑年

七月初

九日

溫病誤表。津液消亡。本係酒客。熱由小腸下注。溺血每至半盆。已三四日矣。又亡津液。面大赤。舌苔老黃而中黑。唇黑裂。大便七日不下。勢如燎原。與急下以存津液法。

大承氣。減枳朴分量。加丹皮 犀角

初十日

昨日下午。舌上津液已回。溺血頓止。與清血分之熱。

焦白芍四錢 犀角四錢 麥冬四錢 丹皮五錢

銀花五錢

細生地五錢

生甘草二錢

天冬二錢

十一日 照前方。

十二日 前方加 麻仁三錢

十三日 前方四帖。

十七日 邪去七八。已能進粥。陰虛甚於餘邪。

復脈湯去參桂薑棗。二帖。

十九日 照前方加 生牡蠣 生鱉甲 二帖。

二十一日 照前方又加 生龜板 服二十一帖。

八月初十日 照前方又加 海參二條 鮑魚片五錢 服二十帖。

史氏 溫熱誤汗於前。又誤用龍膽蘆薈等極苦化燥於後。致七月胎動不安。舌

苔正黃。爛去半邊。目睛突出眼眶之外。如蠶豆大。與玉女煎加犀角。以氣

血兩燔。脈浮洪數極故也。

生石膏四兩

知母一兩

炙甘草四錢

犀角六錢

京米一撮

細生地六錢

麥冬五錢

初二日 煩躁稍靜。胎不動。餘如故。照前方再服三帖。
初五日 大便不通。小便數滴而已。溺管痛。舌苔黑。唇黑裂。非下不可。雖有胎。經云

有故無殞。故無殞也。

生大黃六錢

元明粉四錢

川朴一錢

枳實一錢

煮兩杯。分二次服。得快便即止。

初六日 下後脈靜身涼。目睛漸收。與甘寒柔潤。

初十日 復脈湯去剛藥。

十四日 復脈加三甲。

二十日 服專翕大生膏十二斤。至產後彌月方止。

趙 體瘦無子。過服桂附。津液枯燥。於二十二日得溫熱。自服補中益氣湯三

帖。致邪無出路。服辛涼輕劑二帖。竹葉石膏湯三帖。至七月初二日煩躁

不寐。並不臥床。赤身滿地。混抓。謔語乾熱。無汗舌黃。與調胃承氣湯。加元

參一小劑。得大便少許。隨出赤紅疹數十枚。少安半日。其症如前。與沃陰

之甘涼法。二三日大躁大狂。又與調胃承氣湯一小帖。又出疹數十枚。又

癸丑年
六月二
十六日

少安。熱總不退。脈總不靜。如是者前後共下十三次。出疹十三次。而後脈靜身涼。服復脈湯七帖。後作專翕大生膏半料。計十二斤。半年後始復原。此證原案已失。舉其大略。以備一格。

王三十八歲

溫病狂熱。大渴引飲。周十二時。飲涼水擔餘。癩狂譫語。大汗不止。每日用白虎湯合犀角地黃湯。石膏用半斤。日服二帖。外用紫雪一兩有餘。間服牛黃清心丸五六丸。如是者七八日。熱始漸退。藥漸減。後以復脈湯收功。溫疫者。厲氣流行而兼穢濁。戶戶皆然。如役所使也。是證也。悉從口鼻而入。先病手太陰。而後延布三焦。治法一以護陰清熱逐穢為主。然法者。規矩也。規矩不能使人巧。巧用在人也。今於其證中之有證者。先生則法中之有法。病見極重之證。方施至重之方。然未嘗有一毫護此失彼之弊。如案中王趙史劉數姓之病。非先生胸有定見。法施奇絕。安望其生耶。真乃運用之妙。存乎一心。豈庸手所能乎。至於精微妙旨。善讀者細玩案中。自知其妙。予不敢再加妄論也。舒配瑯

吳鞠通醫案

卷二

暑溫

廿四

歲

壬戌六

月二十

九日

暑溫邪傳心包。譫語神昏。右脈洪大數實而模糊。勢甚危險。

細生地六錢

知母五錢

銀花八錢

元參六錢

連翹六錢

生甘草三錢

麥冬六錢

竹葉三錢

生石膏一兩

煮三碗。分三次服。

牛黃丸二丸

紫雪丹三錢

溫邪入包絡。神昏痙厥。極重之證。

連翹三錢

竹葉三錢

銀花三錢

生石膏六錢

細生地五錢

甘草錢半

丹皮三錢

知母二錢

麥冬五錢

周

五十二歲

壬戌年七月十四日

今晚一帖。明早一帖。再服 紫雪丹四錢

世人悉以羌防柴葛。治四時雜感。竟謂天地有冬而無夏。不亦冤哉。以致暑邪不解。深入血分成厥。衄血不止。夜間煩躁。勢已膠固難解。焉得速功。

鮮蘆根一兩

丹皮五錢

荷葉邊一張

羚羊角三錢

元參五錢

杏仁三錢

桑葉三錢

滑石三錢

犀角三錢

細生地五錢

今晚一帖。明早一帖。

十五日

厥與熱似乎稍緩。據云夜間煩躁亦減。是其佳處。但脈沉弦細數。非痊厥所宜。急宜育陰退熱而戀陽。複鹹以止厥法。

生地六錢

元參六錢

麥冬八錢

生白芍四錢

桑葉三錢

羚羊角三錢

丹皮三錢

犀角三錢

生鱉甲六錢

日服二帖。

十六日

脈之弦剛者。大覺和緩。沉者已起。是為起色。但熱病本應傷陰。况醫者誤

以傷寒溫燥藥五六帖之多。無怪乎舌燥如草也。議啓腎液法。

元參一兩

丹皮五錢

桑葉二錢

犀角三錢

天冬三錢

麥冬五錢

沙參三錢

銀花三錢

生鱉甲八錢

日服三帖。

十七日

即於前方內加

連翹錢半

鮮荷葉邊三錢

細生地六錢

再按暑熱之邪。深入下焦血分。身半以下。地氣主之。熱來甚於上焦。豈非熱邪深入之明徵乎。必借芳香以爲搜邪之用。不然。恐日久膠固之邪。一時難解也。熱邪一日不解。則真陰正氣日虧一日矣。紫雪丹之必不可少也。

紫雪丹錢半

分三次服。

十八日

厥已回。面赤。舌乾黑苔。脈洪數有力。十餘日不大便。皆下證也。人雖虛。然亦可以調胃承氣小和之。

生大黃五錢

元明粉沖三錢

生甘草三錢

先用一半煎一茶杯。緩緩服。俟夜間不便。再服下半劑。服前半劑即解便。後用此方。

生白芍六錢

大生地一兩

麥冬一兩

生鱉甲一兩

十九日

大下宿糞如許。舌苔化而乾。未滋潤。脈仍洪數。微有潮熱。除存陰無二法。

生白芍六錢

沙參六錢

炙甘草三錢

麥冬六錢

丹皮四錢

牡蠣五錢

天冬三錢

大生地一兩

鱉甲五錢

日服二帖。

二十一日

小便短而赤甚。微咳。面微赤。尺脈仍見洪數象。議甘潤益下以治虛熱。少複苦味。以治不盡之實邪。且甘苦合化陰氣而利小便也。按甘苦合化降氣利小便法。舉世不知。在溫熱門中。誠為利小便之上等法。蓋熱傷陰液。小便無由而生。故以甘潤益水之源。小腸火府。非苦不通。為邪熱所助。故以苦藥瀉小腸而退邪熱。甘得苦則不呆膩。苦得甘則不剛燥。合而成功。

也。

炙甘草四錢

生鱉甲八錢

生白芍六兩

元參五錢

阿膠三錢

麥冬六錢

麻仁三錢

丹皮三錢

沙參三錢

黃連一錢

已得效。仍服前方二帖。

復脈複苦法。清下焦血分之陰熱。

炙甘草五錢

生鱉甲五錢

麥冬五錢

生白芍六錢

阿膠三錢

丹皮五錢

麻仁五錢

天冬二錢

元參三錢

日服二帖。

王
三十八
歲癸亥
六月初
三日

暑溫舌苔滿佈。色微黃。脈洪弦而剛甚。左反大於右。不渴。初起即現此等脈症。恐下焦精血之熱。遠甚於上焦氣分之熱也。且舊有血溢。故手心之熱。又甚於手背。究竟初起。且清上焦。然不可不先知其所以然。

連翹二錢

豆豉錢半

細生地錢半

丹皮二錢

銀花二錢

生甘草一錢

蘆梗一錢

元參錢半

薄荷三分

牛蒡子錢半

白茅根二錢

麥冬二錢

苦桔梗一錢

初六日

熱退大半。胸痞。腹中自覺不和。按暑必挾溼。熱退溼存之故。先清氣分。

連翹二錢

豆豉二錢

杏仁泥二錢

銀花錢半

生苡仁三錢

白扁豆二錢

蘆梗三錢

白通草八分

鬱金二錢

滑石錢半

日二帖。

初七日

病退。六腑不和。

蘆梗三錢

鬱金一錢

半夏二錢

厚樸二錢

豆豉二錢

生苡仁三錢

廣皮炭一錢

滑石三錢

初八日

向有失血。又屆暑病之後。五心發熱。法當補陰以配陽。但脈雙弦而細。不惟陰不充足。即真陽亦未見其旺也。議二甲復脈湯。仍用舊有之桂參薑棗。

馬三十八歲
癸丑年
六月初六日

炒白芍四錢
阿膠二錢
麥冬四錢
麻仁二錢
炙甘草五錢
生鱉甲五錢
沙參三錢
大生地四錢
生牡蠣五錢
桂枝二錢
大棗二個
生薑二片

又丸方

八仙長壽丸。加麻仁白芍蜜丸。每日三服。每服三錢。
暑熱本易傷陰。誤用消導攻伐。重傷陰氣。致令頭中耳中。鳴無止時。此係肝風內動。若不急救肝腎之陰。痙瘓熱厥至矣。

炒白芍六錢
炙甘草三錢
生鱉甲五錢
大生地六錢
麥冬五錢
生牡蠣五錢
丹皮三錢
桑葉三錢
茶菊炭二錢
麻仁二錢便不實去此

服四帖。

十二日 外邪雖退。無奈平素勞傷太過。虛不肯復。六脈無神。非參不可。

沙參三錢
大生地六錢
阿膠三錢
元參六錢
麻仁三錢
生鱉甲六錢
麥冬六錢
生白芍六錢

炙甘草四錢

得大便後。去元參。加

牡蠣三錢 人參三錢 桂枝大棗二枚 生薑一片

病後飲食不調。又兼暑濕著裏。腹中絞痛。痛極便溏。脈微數。欲作滯下。議
芩芍法。奪其滯下之源。

七月初六日

黃芩炭二錢

小茴香炭八分

廣木香一錢

厚樸二錢

焦白芍錢半

黃連炭八分

炒廣皮錢半

枳實一錢

神麴炭二錢

山查炭錢半

一二帖後腹痛除。仍復脈湯服十餘帖。

暑溫挾痰飲怒鬱。故脈芤身熱而脅痛。誤用足六經表藥。煩躁不安。六日
不解。至危之證。

榮十五歲
乙丑六月十一日

生香附三錢

旋覆花三錢

連翹二錢

蘆梗三錢

生石膏四錢

杏仁三錢

薄荷一錢

鬱金二錢

每帖煮兩杯。分二次服。三時一帖。服二日大見效。再商。

十三日

於前方內加

青橘葉二錢

鮮荷葉邊一張

蘆根五錢

暑傷足太陰。發為腹脹。渴不欲飲。飲則嘔。身微熱。舌白滑。肢逆。二便閉塞。病在中焦居多。以香開六腑濁氣為主。

半夏五錢

釐梗三錢

廣皮二錢

枳實三錢

厚樸四錢

生香附三錢

鬱金二錢

生苡仁三錢

白蔻仁二錢

杏仁三錢

旋覆花三錢

煮兩杯。分兩次服。今日一帖。明日一帖。

頭痛左關獨高。責之少陽內風掀動。最有損一目之弊。若以為外感風寒。則遠甚矣。議清少陽膽絡法。再此症除左關獨高。餘脈皆緩。所謂通體皆寒。一隅偏熱。故先清一隅之熱。金匱謂先治新病。舊病當在後也。

羚羊角二錢

苦桔梗二錢

生甘草一錢

薄荷六分

丹皮錢半

桑葉錢半

菊花錢半

刺蒺藜一錢

勾藤勾一錢

鮮荷葉半張

今日一帖。明日一帖。

初八日 前日左關獨浮而弦。係少陽頭痛。因暑而發。用清膽絡法。茲左關已平其半。但緩甚。舌苔白厚而滑。胸中痞悶。暑中之熱已解。而溼尚存也。議先宣上焦氣分之熱。

生苡仁五錢

鬱金三錢

旋覆花三錢

蘆梗三錢

杏仁泥五錢

白蔻仁連殼二錢

半夏五錢

廣皮三錢

茯苓皮三錢

滑石六錢

通草一錢

頭煎二杯。今日服。二煎一杯。明早服。

初九日

諸症俱減。舌白未除。中溼尚多。議進法於前方內加。

生蒼朮三錢

炒草果一錢

王

暑傷兩太陰。手太陰之證多。一以化肺氣為主。

杏仁泥五錢

鮮荷葉一錢

銀花三錢

蔻仁連皮二錢

連翹三錢

滑石八錢

生苡仁五錢

厚樸三錢

白通草一錢

藿香葉一錢

白扁豆花一枝

二十八
歲
初三日

初四日

煎二杯。分兩次服。今晚明早各一帖。
兩太陰之暑症。昨用冷香合辛涼。暑中之熱。已退其半。但裏溼與熱未克
即除。故大便紅水。胸中痞悶。

杏仁泥 三錢

生苡仁 五錢

藿 梗 三錢

澤 瀉 五錢

白蔻仁 錢半

滑 石 六錢

厚 樸 三錢

猪 苓 五錢

鬱 金 二錢

白通草 二錢

茯苓皮 三錢

煎三杯。今晚明早各一帖。

初五日

舌苔白厚。腹甚不和。腸鳴泄瀉。聚溼尚多。急宜分泄。

生苡仁 六錢

白蔻仁 三錢

澤 瀉 五錢

半 夏 五錢

藿 梗 三錢

茯苓皮 六錢

椒 目 五錢

廣 皮 三錢

滑 石 六錢

蒼 朮 三錢

厚 樸 三錢

水八盞。煎取三盞。分三次服。渣再煎一盞服。

廣 二十四歲

六脈洪大之極。左手更甚。目斜視。怒氣可畏。兩臂兩手。卷曲而痠癢。舌斜
而不語。三四日。面赤身熱。舌苔中黃邊白。暑入心包。膽絡。以清心膽之邪。

七月二十日

爲要。先與碧雪丹。

桑葉三錢

羚羊角三錢

細生地五錢

連翹五錢

竹茹三錢

銀花五錢

丹皮三錢

鮮嫩荷葉一張

天冬三錢

麥冬五錢

犀角三錢

煮四杯。分四次服。

碧雪丹三錢

涼開水調服。以神清熱退爲度。不

清再服三錢。雖三四次均可服。

二十三日

肝熱之極。加天冬涼肝。於前方加

天冬三錢

碧雪丹仍照前調服。

二十四日

暑入心膽兩經。與清心絡之伏熱。已見小效。仍用前法而進之。

犀角五錢

連翹四錢

細生地五錢

羚羊角三錢

銀花三錢

茶菊花三錢

麥冬五錢

桑葉三錢

丹皮五錢

煮四杯。分四次服。

二十五日

加鮮白扁豆花一枝

鮮荷葉邊一張

黃連錢半

黃芩三錢

二十六 暑入心膽兩經。屢清二經之邪。業已見效。今日飲水過多。水入微嘔。蓋暑必夾溼。議於前方內去柔藥。加淡滲。

犀角二錢

茯苓皮五錢

黑山梔三錢

茵陳三錢

荷葉邊一錢

桑葉三錢

銀花三錢

羚羊角三錢

黃連一錢

連翹三錢

黃柏炭二錢

生苡仁五錢

二十七 暑熱退後。嘔水。身微黃。熱退溼存。

茵陳三錢

杏仁泥三錢

白通草一錢

銀花三錢

白蔻皮二錢

連翹三錢

生苡仁五錢

黃柏炭二錢

茯苓連皮

黑山梔三錢

服二帖。

二十九 熱未盡退。舌起新白苔。胸痞。暑兼溼熱。不能純治一邊。

銀花三錢

黃連錢半

滑石六錢

連翹三錢

蘆梗三錢

杏仁泥五錢

白通草一錢

生苡仁五錢

雲苓皮五錢

白蔻仁錢半

八月初二日

煮三杯。分三次服。二帖。

暑熱已退七八。唯十餘日不大便。微有譫語。脈沈。可與輕通陽明。與增液承氣法。

元 參八錢

生大黃四錢

麥冬六錢

細生地六錢

煮成三杯。先服一杯。約二時許。如不大便。再服第二杯。明早得大便。止後服。否則服第三杯。

初三日

溫病下後宜養陰。暑溫下後宜兼和胃。蓋暑必挾溼。而舌苔白滑故也。脈緩。與外臺茯苓飲意。

茯苓五錢

厚樸二錢

半夏三錢

白蔻皮錢半

麥冬五錢

生苡仁五錢

蘆梗三錢

鬱金一錢

暑溫熱退溼存。故嘔。腹不和而舌白苔。

杏仁泥五錢

厚樸二錢

白蔻仁錢半

益智仁一錢

半夏五錢

生苡仁五錢

黃芩三錢

蘆梗三錢

生薑三片

服二帖。

鞠通自醫。丁巳六月十三日。時年四十歲。

先暑後風。大汗如雨。惡寒不可解。先服桂枝湯一帖。為君之桂枝用二兩。

盡劑毫無效驗。次日用桂枝八兩。服半劑而愈。

右脈洪大無倫。暑傷手太陰。有逆傳心包之勢。喘渴太甚。煩躁不寧。時有

譫語。身熱。議兩清營衛之法。

史男
七歲癸亥六月
十二日

連翹一錢

生石膏三錢

知母一錢

銀花二錢

真山蓮一錢

生甘草八分

竹葉二錢

厚樸一錢

杏泥二錢

藿梗一錢

丹皮一錢

日二帖。

十三日

諸證俱減。熱已退。但右脈仍洪。舌黃而滑。嘔未盡除。

銀花錢半

飛滑石一錢

真山蓮一錢

連翹錢半

生苡仁二錢

炒知母八分

生甘草八分

鮮荷葉邊三錢

葦根三錢

杏泥錢半

二帖。

俞男
三歲七
月初二
日

暑溼傷脾。暮夜不安。小兒脈當數。且少腹以下常腫痛。肝腎亦復虛寒。况面色青黃。舌白苔。手心時熱。調理乳食要緊。防成疳疾。議腑以通為補。食非溫不化例。

生苡仁二錢

薑 夏錢半

厚 樸錢半

炒扁豆一錢

杏 泥錢半

小枳實八分

焦 麴錢半

雞內金一錢

廣皮炭八分

白薏仁四分

煨 薑三片

小 茴一錢
炒黑

四帖。

前證已愈。惟脾尚虛弱。以疏補中焦為主。

田
十四歲

暑溫誤下。寒涼太多。洞泄之後。關閘不藏。隨食隨便完穀。絲毫不化。脈弦。與桃花湯改粥法。

人 參

赤石脂末

禹餘糧細末

炙甘草

乾 薑

粳 米

先以參草薑三味煎。去渣。湯煮粥成。然後和入石脂餘糧末。愈後補脾陽。

而大健。

伏暑

周十四歲
壬戌八月十六日

伏暑內發。新涼外加。脈右大左弦。身熱如烙。無汗。膠痰。舌苔滿黃。不宜再見泄瀉。不渴。腹脹。少腹痛。是謂陰陽並病。兩太陰互爭。難治之症。擬先清上焦溼熱。蓋氣化溼亦化也。

杏仁泥三錢

銀花二錢

白通草一錢

滑石三錢

蘆根二錢

淡竹葉一錢

生苡仁錢半

厚樸二錢

大貝母一錢

連翹二錢

梨皮二錢

今晚一帖。明早一帖。

十七日

案仍前。

連翹二錢

蘆根二錢

杏仁泥錢半

銀花二錢

薄荷八分

厚樸錢半

梨皮錢半

桑葉一錢

苦桔梗錢半

知母三錢

鮮荷葉邊一張

滑石三錢

白扁豆皮二錢

午一帖。晚一帖。明早一帖。

十八日

兩與清上焦。熱已減其半。手心熱於手背。謂之裏熱。舌苔紅黃而厚。為實熱。宜宣之。用苦辛寒法。再按暑必夾溼。按腹中之痛脹。故不得不暫用苦燥法。

杏仁泥三錢

小枳實錢半

黃連薑汁炒

木通二錢

厚樸錢半

黃芩炭一錢

廣木香一錢

瓜蒌仁八分

廣皮炭一錢

小茴香炭錢半

炒知母錢半

檳榔八分

十九日

腹之痛脹俱減。舌苔乾燥黃黑。唇肉色絳。嗆咳痰粘。幼童陰氣未堅。當與存陰退熱。

麥冬連心錢

丹皮五錢

元參五錢

沙參三錢

炒知母二錢

犀角三錢

蛤粉三錢

杏仁三錢

生甘草一錢

細生地四錢

煅石膏四錢

二十日

津液稍回。宿糞未除。潮熱因邪還表。夜間透汗。右脈仍然浮大。未可下。宜

保津液。護火剋金之嗽。

焦白芍四錢

沙參三錢

牡蠣粉錢半

麥冬六錢

柏子霜三錢

杏仁粉二錢

細生地六錢

霍石斛三錢

煅石膏三錢

元參六錢

犀角一錢

養三杯。陸續服。

日二十一

諸症悉解。小有潮熱。舌絳苔黑。深入血分之熱。未盡除也。用育陰法。

焦白芍四錢

天冬錢半

柏子霜三錢

大生地五錢

麥冬六錢

丹皮三錢

沙參三錢

炙甘草二錢

牡蠣三錢

頭煎二杯。二煎一杯。分三次服。

日二十二

津液消亡。舌黑乾刺。用復脈法。

炒白芍六錢

丹皮四錢

柏子霜四錢

生鱉甲六錢

麻仁三錢

麥冬六錢

生牡蠣四錢

阿膠沖三錢

大生地六錢

二十三

頭煎二杯。今日服。二煎一杯。明早服。
右脈仍數。餘邪陷入肺中。欬甚痰艱。議甘潤兼涼肺氣。

甜杏仁泥三錢

桑葉三錢

菊花三錢

苦桔梗三錢

麥冬連心

玉竹三錢

大貝母三錢

梨皮三錢

細生地五錢

沙參三錢

甘草三錢

丹皮二錢

煎四茶杯。分四次服。

二十四

舌黑苔退。脈仍數。仍咳。腹中微脹。

杏仁粉三錢

象貝母二錢

鬱金錢半

茯苓三錢

沙參三錢

蘆梗二錢

生扁豆三錢

丹皮三錢

細生地五錢

桔梗二錢

麥冬五錢

頭煎三杯。二煎一杯。分四次服。

二十五

昨晚得黑糞如許。潮熱退。唇舌仍絳。熱之所過。其陰必傷。與復脈法復其陰。

沙參三錢

麥冬一兩

阿膠二錢

炙甘草三錢

炒白芍六錢 生鱉甲五錢 丹皮三錢 元參三錢

大生地八錢 麻仁三錢 生牡蠣五錢

八碗水。煮成三盃。分三次服。二煎煮一盃。明早服。

日二十六 又得宿糞如許。邪氣已退八九。但正陰虛耳。故不欲食。晚間乾咳無痰。

大生地八錢 阿膠三錢 生白芍五錢 麻仁三錢

炙甘草三錢 牡蠣粉三錢 沙參三錢 麥冬六錢

天冬二錢

日二十七 外用梨汁藕汁葶薺汁各一黃酒杯。重湯燉溫頻服。熱傷津液。便燥。微有潮熱。乾咳。舌赤。用甘潤法。

元參六錢 知母二錢 阿膠二錢 沙參三錢

麻仁三錢 細生地五錢 麥冬六錢 郁李仁二錢

梨汁一杯 地栗汁一杯酒

日二十八 伏邪內漬。續出白痧如許。脈較前卻稍和。第二次舌苔未化。不大便。

連翹二錢 麻仁三錢 牛蒡子三錢 炒銀花二錢

阿膠錢半

沙參三錢

元參三錢

生甘草一錢

大生地五錢

麥冬六錢

服此方後晚間即得大便。

潮熱復作。不大便。燥糞復聚。與增液承氣湯微和之。

九月初四日

元參五錢

細生地五錢

麥冬五錢

甘草一錢

生大黃二錢

服此得黑糞如許。而潮熱退。脈靜。以後一以養陰收功。

左脈洪大數實。右脈陽微。陰陽逆亂。伏暑似瘧。最難即愈。議領邪外出法。

陳二十八歲

生鱉甲三錢

青蒿四錢

桂枝三錢

麥冬八錢

焦白芍三錢

甘草錢半

沙參三錢

丹皮三錢

知母三錢

三帖即愈。

十四日

伏暑寒熱已愈。不食不饑不便。胸中痞悶。九竅不和。皆屬胃病。

半夏五錢

廣皮錢半

青皮錢半

桂枝錢半

三帖。
鬱金二錢
生苡仁五錢
茯苓五錢
黨參三錢

十七日
久病真陽虛則膺病。餘邪化熱則口苦。正氣不復則肢倦。

西洋參二錢
桂枝三錢
茯苓三錢
半夏三錢
黃芩炭錢半
焦白芍三錢
生薑二片
廣皮炭錢半
炙甘草錢半
大棗二枚

某
乙丑八月二十
日
不兼溼氣之伏暑誤治。津液消亡。以致熱不肯退。唇裂舌燥。四十餘日不解。咳嗽膠痰。謔語口渴。可先服牛黃清心丸。清包絡而搜伏邪。湯藥與存陰退熱法。

細生地三錢
麥冬五錢
白芍三錢
甘草一錢
沙參三錢
生牡蠣五錢
生龍甲五錢
生扁豆三錢

二十四日
暑之偏於熱者。誤以傷寒足經藥治之。以致津液消亡。昨用存陰法。兼芳香開絡中閉伏之邪。已見大效。茲因小便赤甚而短。熱雖減而未除。議甘苦合化陰氣法。

二十六日

二甲復脈湯加黃芩三錢。如有譫語。其牛黃丸仍服。昨用甘苦合化陰氣法。服後大見涼汗。茲熱已除。脈減。舌黃退盡。但六脈重按全無。舌仍乾燥。議熱之所過。其陰必傷例。用二甲復脈湯。重加鱉甲生甘草八帖。

某乙丑九月十六日

夏傷於溼。冬必咳嗽。况六脈俱弦。木旺剋土。脾土受剋。則泄瀉。胃土受剋。則不食欲嘔。前曾腹脹。現在胸痞。舌白滑。此寒溼病也。而脈反數。思涼思酸。物極必反之象。豈淺鮮哉。急宜戒怒惱。小心一切為要。

半夏三錢

旋覆花二錢

杏仁泥四錢

白蔻皮一錢

生苡仁五錢

滑石三錢

鬱金二錢

茯苓皮五錢

通草一錢

水五杯。煮兩杯。渣再煮一杯。分三次服。二帖。

十八日

脈數甚。思涼。溼中生熱之故。

通草二錢

鬱金二錢

滑石六錢

茯苓皮六錢

白蔻仁錢半

蘆梗三錢

生苡仁六錢

半夏四錢

杏仁泥 六錢

小枳實 錢半

黃芩 二錢

水八碗。煮三茶碗。渣再煮半碗。分四次服。日三夜一。二帖。

二十日

伏暑必挾火與溼。不能單顧一邊。至服藥後反覺不快。乃體虛久病。不任開泄之故。渴思涼者火也。得水則瀉者溼也。

生石膏 六錢

半夏 三錢

杏仁泥 六錢

炒知母 錢半

薏仁 一錢

黃芩 一錢

麥三杯。三次服。二帖。

二十二日

去薏仁。加

通草 錢半

石膏 四錢

滑石 四錢

知母 五分

蘆梗 三錢

二十七日

飲居右脅。不得臥。格拒心火。不得下通於腎。故隘乾。

杏仁粉 三錢

蘇子 三錢

小枳實 三錢

香附 三錢

廣皮 二錢

旋覆花 三錢

半夏 五錢

茯苓皮 三錢

蘆梗 三錢

十月初二日

小便不通。於前方內加

滑石三錢

通草錢半

生苡仁三錢

前後共九帖。

初六日

小便已通。於前方內去

滑石

通草

苡仁

服三帖。

巴

三十二歲

面目青黃。其為溼熱無疑。右脈單弦。其為伏飲無疑。脘痞胸痛。合之脈弦。其為肝鬱無疑。上年夏日曾得淋症。誤服六味酸甘化陰。致令溼熱穩伏。久踞。故證現龐雜無倫。治法以宣通三焦。使邪有出路。安胃能食為要。

生石膏八錢

半夏五錢

旋覆花三錢

滑石一兩

蠶砂三錢

香附三錢

生苡仁五錢

茯苓皮五錢

鬱金三錢

通草二錢

杏仁泥三錢

草薢四錢

初六日

其人本有飲症。又加內暑外涼。在經之邪。似瘧而未成。在腑之邪。泄瀉不止。恐成痢疾。急以提邪外出為要。按六脈俱弦。之泄瀉。古謂之木泄。即以。小柴胡為主方。况加之寒熱往來乎。六脈俱弦。古謂脈雙弦者寒也。指中焦虛寒而言。豈補水之生熟地所可用哉。現在寒水客氣。燥金司天。而又

大暑節氣。與柴胡二桂枝一法。

柴胡六錢

炙甘草一錢

桂枝三錢

黃芩二錢

半夏六錢

生薑三錢

焦白芍二錢

大棗二錢

蘆梗三錢

廣皮二錢

青蒿二錢

寒熱止即止。

初八日

寒暑兼受。成瘧則輕。成痢則重。前用柴胡二桂枝一法。現在面色青。熱退。痰多而稀。舌之赤者亦淡。脈之弦勁者微細。不渴。陽虛可知。與桂枝柴胡各半湯。減黃芩。加乾薑。

桂枝二錢

半夏六錢

柴胡三錢

黃芩一錢

白芍錢半

炙甘草二錢

乾薑三錢

生薑五錢

大棗三錢

煮三杯。分三次服。

初九日

內暑外寒。相搏成瘧。大便溏泄。恐致成痢。口乾不渴。經謂自利不渴者。屬太陰也。合之腹痛。則更可知矣。仲景謂表急急當救表。裏急急當救裏。茲

表裏無偏急象。議兩救之。救表仍用柴胡桂枝各半法。以太少俱有邪也。救裏與理中法。

桂枝四錢

黃芩炭二錢

生苡仁五錢

白芍二錢炒

乾薑三錢

炙甘草錢半

川椒炭三錢

柴胡四錢

良薑二錢

半夏六錢

白蔻仁錢半

生薑五錢

大棗二個

初十日

昨用兩救表裏。已見小效。今日仍宗前法而退之。脈中陽氣已有生動之機故也。不可性急。反致債事。

桂枝三錢

黃芩錢半炒

厚樸二錢

白芍二錢炒

乾薑二錢

炙甘草錢半

川椒炭二錢

柴胡三錢

煨草果一錢

半夏六錢

生薑五錢

大棗二個

十一日

內而痰飲蟠踞中焦。外而寒暑擾亂胃陽。連日已奪去成痢疾之路。一以和中蠲飲爲要。蓋無形之邪每借有形質者。以爲依附也。

青蒿三錢

小枳實三錢

黃芩炭錢半

杏仁泥三錢

十二日

雜受寒暑再三分晰。方成瘧疾。寒多熱少。脈沉弦。乃邪氣深入。與兩分陰陽之中。偏於溫法。

茯苓皮	五錢	柴胡	三錢	半夏	一兩	廣皮	二錢
白蔻仁	錢半	生苡仁	五錢	桂枝	三錢	炒白芍	二錢
生薑	三片						

青蒿	三錢	半夏	八錢	檳榔	一錢	柴胡	三錢
----	----	----	----	----	----	----	----

厚樸	三錢	良薑	二錢	黃芩炭	錢半	枳實	二錢
----	----	----	----	-----	----	----	----

蘆梗	三錢	生薑	五片	瓜蒌皮	二錢	大棗	二個
----	----	----	----	-----	----	----	----

十四日

寒熱少減。胸痞甚。去甘加辛。去棗加生薑。脈弦細。指尖冷。陽微不及四末之故。兼之腹痛便溏。痰飲咳嗽。更可知矣。

十六日

以和胃陽。溫中陽。逐痰飲立法。

半夏	六錢	良薑	二錢	杏仁	三錢	川椒炭	三錢
----	----	----	----	----	----	-----	----

乾薑	二錢	炒廣皮	三錢	桂枝	三錢	蔻仁	二錢
----	----	-----	----	----	----	----	----

生苡仁	五錢	生薑	三片				
-----	----	----	----	--	--	--	--

張十七日

伏暑酒毒。遇寒涼而發。九日不愈。脈緩而軟。滯下。身熱譫語。溼熱發黃。牛清溼熱。開心包。

茵陳 五錢

茯苓皮 五錢

黃連 二錢

梔子炭 二錢

通草 一錢

黃柏炭 三錢

滑石 五錢

生苡仁 三錢

黃芩 三錢

十八日 熱退。滯下已愈。黃未解。

茵陳 三錢

黃連 八分

茯苓皮 五錢

滑石 五錢

梔子炭 三錢

杏仁 三錢

黃柏炭 三錢

通草 一錢

燈草 一錢

草薢 三錢

十九日 黃亦少退。脈之軟者亦鼓指。惟舌赤。小便赤濁。餘濕餘熱未盡。尙須清之。

茯苓皮 五錢

茵陳 四錢

生苡仁 三錢

黑梔子 三錢

杏仁 三錢

黃柏炭 二錢

半夏 三錢

黃連 八分

廣皮炭 二錢

草薢 三錢

滑石 五錢

二十日 黃退。小便赤濁。舌赤脈洪。溼熱未淨。

王
二十八
歲乙酉
三月二
十日

滑石五錢
梔皮二錢
草薢三錢
黃連一錢
海金沙三錢
半夏三錢

上年初秋伏暑。午後身熱汗出。醫者誤以爲陰虛勞損。不食。胸痞。欬嗽。舌苔白滑。四肢倦怠。不能起床。至今三月不解。已經八月之久。深痼難拔。勉與宣化三焦。兼從少陽提邪外出法。

桂枝三錢
薤仁二錢
黃芩二錢
青蒿三錢

茯苓皮五錢
滑石六錢
苡仁五錢
半夏五錢

杏仁四錢
廣皮三錢
通草一錢

此藥服二帖。能進飲食。服四帖。飲食大進。即能起行立。後八月復診。以調理脾胃而愈。

伏暑如瘧狀。脈弦數。寒熱往來。熱多於寒。解後有汗。與青蒿鱉甲湯。五帖而愈。

上年伏暑。寒熱時發如瘧狀。以通宣三焦立法。補水補火皆妄也。

杏仁三錢
藿梗三錢
薤仁五錢
茯苓皮五錢

李
十八歲
十一月初九日
金氏
三十歲

乙酉四月二十
二日

苡仁五錢 半夏四錢 青蒿八分 炒黃芩二錢
生薑二錢 大棗二個
服四帖。

初二日 伏暑愈後。以平補中焦爲要。仍須宣通。勿得粘滯。

半夏三錢 蓮子五錢去心皮 廣皮二錢 益智仁一錢
茯苓五錢 生薑三片 生苡仁五錢

某
九月二十四日

初因肝鬱。繼因內飲。招外風爲病。現在寒熱如瘧狀。又有伏暑內發。新涼
外加之象。六脈弦細而緊。兩關獨大而浮。厥陰尅陽明。醫者全然不究病
從何來。亦不究脈象之是陰是陽。一概以地黃等柔藥補陰。以陰藥助陰
病人命其何堪哉。勢已沉重。欲成噎食反胃。勉與兩和肝胃。兼提少陽之
邪外出法。

桂枝三錢 蔻仁二錢 川椒炭二錢 青蒿一錢
苡仁三錢 杏仁三錢 半夏六錢 香附三錢
生薑四錢 廣皮三錢 旋覆花三錢

二十八日

寒熱減半。嘔止。舌苔滿黃。但仍滑耳。於前方內加

黃芩二錢

再服四帖。如一二帖內寒熱止。去青蒿。若舌苔乾燥。腹痛止。去川椒。加

茯苓五錢

十月初六日

伏暑已解七八。痰飲肝鬱未除。下焦且有溼熱。

杏仁四錢

旋覆花三錢

通草一錢

薤仁三錢

香附三錢

草薢五錢

苡仁五錢

半夏五錢

蠶砂三錢

茯苓皮五錢

廣皮二錢

煮三杯。分三次服。數帖全愈。

陶五十八歲乙酉九月十八日

伏暑遇新涼而發。舌苔白。上灰黑。六脈不浮不沈而數。誤與發表。胸痞不食。此危證也。何以云危。蓋四氣雜感。又加一層腎虛。又加一層肝鬱。又加一層誤治。又加一層酒客中虛。何以克當。勉與河間之苦辛寒法。一以宣通三焦。而以肺氣為主。望其氣化而溼熱俱化也。

杏仁四錢

薤仁三錢

藿香葉三錢

薤仁三錢

二十三日
黃芩三錢 黃連一錢 苡仁五錢 滑石五錢
半夏五錢 茯苓皮五錢 通草一錢 廣皮三錢
舌之灰化爲黃。滑而不燥。唇赤。脈之弦者。化而爲滑數。是溼與熱俱重也。

二十六日
杏仁泥五錢 茯苓六錢 木通五錢 薤仁三錢
茵陳五錢 苡仁五錢 黃連二錢 滑石一兩
黃柏炭四錢 半夏五錢
伏暑。舌之灰者。化黃。茲黃雖退。而白滑未除。當退苦藥。加辛藥。脈滑甚。重。加化痰。小心復感要緊。

十月初二日
杏仁五錢 鬱金三錢 滑石一兩 薤仁三錢
蘆梗三錢 苡仁五錢 枳實三錢 半夏一兩
黃柏炭三錢 廣皮三錢 茯苓皮六錢
煮三杯。分三次服。
伏暑雖退。舌之白滑未化。是暑之伏溼尙存也。小心飲食要緊。脈之滑大。

者已減。是暑中之熱去也。無奈太小而不甚流利。是陽氣未充。未能化溼。重與辛溫。助陽氣化溼氣。

杏仁泥 五錢

廣皮 五錢

半夏 六錢

蔻仁 三錢

益智仁 三錢

川椒炭 三錢

苡仁 五錢

乾薑 三錢

木通 三錢

煮三杯。分三次服。以舌苔黃為度。

伏暑之外感者。因大汗而退。舌白滑苔。究未能化黃。前方大用剛燥未除也。務要小心飲食。毋使脾困。

初六日

杏仁泥 四錢

煨草果 八分

益智仁 三錢

蔻仁 三錢

茅朮炭 三錢

半夏 五錢

苡仁 五錢

廣皮炭 五錢

厚樸 二錢

茯苓皮 五錢

神麴炭 三錢

王氏
二十二歲
二月二十六日

伏暑咳嗽寒熱。將近一年不解。難望回生。既咳且嘔而泄瀉。勉與通宣三焦。俾邪有出路。或者得有生機。何以知其為伏暑而非勞瘵。勞之咳。重在丑寅卯木旺之時。或午前。或終日。溼家之咳。旺在戌亥子。勞之寒熱後無

汗。伏暑寒熱如瘧狀。丑寅卯陽升。乃有汗而止。勞之陰虛身熱。脈必芤大。伏暑之脈。弦細而弱。故知其為伏暑而非勞瘵也。再左邊久不着席。此水在肝也。

生苡仁五錢

廣皮三錢

蔻仁二錢

半夏五錢

茯苓皮五錢

鬱金一錢

青蒿八分

香附三錢

桂枝三錢

旋覆花三錢

生薑三片

大棗二個

煮三杯。分三次服。

此方服四帖。寒熱減。去青蒿。又服十帖。後健脾胃收功。

酒客中虛溼重。面色滯暗。業已有日。現在又感伏暑新涼。頭脹便澹。舌白滑。脈弦細。中虛寒溼可知。不能戒酒。斷乎病不除根。蓋客症易除。久病伏溼。虛寒難退也。

杏仁三錢

廣皮五錢

薑梗三錢

苡仁一兩

半夏六錢

黃芩炭六錢

蔻仁三錢

茯苓一兩

青蒿二錢

癸
四十歲
乙酉八
月初五
日

周
五歲

煮三杯。分三次服。頭脹除去青蒿。服七帖愈。
本係伏暑。誤以為風寒。挾食發表。消導雜進。致邪氣深入下焦血分。夜熱早涼。與煎厥瘧瘧相似。食減脈大。汗多便結。先與救陽明之陰。
梨汁一杯一酒 藕汁一杯一酒 鮮蘆根汁半杯
荸薺汁一杯一酒 元參五錢 連心麥冬五錢
三帖。

溫毒

劉
甲子五
月十三
日

面赤腫。喉痛。身熱。自汗。舌黃。

馬勃 <small>三錢</small>	銀花 <small>六錢</small>	牛蒡子 <small>六錢</small>	荊芥穗 <small>二錢</small>
元參 <small>六錢</small>	薄荷 <small>錢半</small>	人中黃 <small>二錢</small>	桔梗 <small>五錢</small>
連翹 <small>六錢</small>	射干 <small>二錢</small>	板藍根 <small>三錢</small>	桑葉 <small>六錢</small>

共為粗末。分七包。一時許服一包。蘆根湯煎。

十四日

用前法。

十五日 於前方內加

黃連二錢 黃芩三錢

溫毒喉痛發疹。腿痠痛甚。重症也。須用急急輕揚。恐其聚而為災也。

某 甲子五月十一日

馬勃五錢 射干五錢 薄荷五錢 元參一兩

連翹二錢 荆芥穗六錢 桔梗兩半 僵蠶五錢

板藍根三錢 銀花一兩 牛蒡子八錢 人中黃四錢

共為粗末。七錢一包。一時服一包。通十二時服十包。服完再作服。蘆根湯煎。二帖愈。

王氏 二十三歲 甲子五月十一日

溫毒頰腫。脈伏而象模糊。此謂陽證陰脈耳。面目前後俱腫。其人本有瘰癧。頭痛身痛。謔語肢厥。勢甚凶危。議普濟消毒飲法。

連翹二錢 牛蒡子八錢 銀花兩半 荆芥穗四錢

桔梗八錢 薄荷三錢 人中黃四錢 馬勃五錢

元參八錢 板藍根三錢

共為粗末。分十二包。一時許服一包。蘆根湯煎服。腫處敷水僊膏。用水

仙花根去蘆。搗爛敷之。中留一小口。乾則隨換。出毒後。敷三黃二香散。

三黃二香散

黃連一兩

黃柏一兩

生大黃一兩

乳香五錢

沒藥五錢

右爲極細末。初用細茶汁調敷。乾則易之。繼用香油調敷。

十二日 脈促。卽於前方內加

生石膏三兩

知母八錢

十三日 卽於前方內加

犀角八錢

黃連三錢

黃芩六錢

十四日 於前方內加

大黃五錢

十五日 於前方內去大黃。再加

生石膏一兩

十六日 於前方內加

十八日

金汁半茶分次冲入藥內服。脈出身壯熱邪機向外也。然其勢必凶。當靜以鎮之。勿事荒張。稍有譫語。即服。

二十日

牛黃清心丸一二丸。其湯藥仍用前方。腫消熱退。脈亦靜。用復脈湯七帖全愈。

王二十三
歲乙丑
八月十
一日

溫毒發斑。時在初秋。盛暑未消。何妄用大汗大下之傷寒六經法。悖謬已極。右脈洪大甚。渴甚。汗太甚。急急重用化斑湯。

生石膏 四兩

細生地 一兩

知母 二兩

京米 一兩

炙甘草 一兩

犀角 五錢

水八盞。煮三盞。分三次服。渣再以水五盞煮兩碗。夜間明早服。至已前完。

史二十二
歲

溫毒三日。喉痛脹。滴水不下。身熱。脈洪數。先以代賑普濟散五錢煎湯。去渣嗽口與喉。噙化少時。俟口內有涎。即控吐之。再嗽再化再吐。如是者三五時。喉即開。可服藥矣。計用代賑普濟散二兩後。又用五錢一次與服。每

日十數次。三日而喉痛止。繼以玉女煎五帖。熱全退。後用復脈湯七帖收功。

代賑普濟散方

主治溫毒、喉痺、項腫、發疹、發斑、溫痘、牙痛、楊梅瘡毒、上焦一切風熱、皮毛癩瘡等證。如病極重者。晝夜服十二包。至輕者服四包。量病增減。如喉痺滴水不下咽者。噙一大口。仰面浸患處。少時有稀痰吐出。再噙再吐。四五次。喉即開。服藥後如大便頻數。甚至十數次者。勿畏也。毒盡前愈。如服三五次。大便尚堅結不通者。每包可加酒炒大黃五六分。或一錢。

桔梗	十兩	牛蒡子	八兩	黃芩	六兩	人中黃	四兩
荊芥穗	八兩	銀花	一兩	蟬蛻	六兩	馬勃	四兩
板藍根	四兩	薄荷	四兩	元參	十兩	大青葉	六兩
生大黃	四兩	連翹	十兩	僵蠶	六兩	射干	四兩

右爲粗末。每包五錢。小兒減半。磁瓶收好。勿出香氣。

按此方用東垣普濟消毒飲。去直升少陽陽明之升麻柴胡。直走下焦之黃連。合化清氣之培貤散。改名曰代貤普濟散。大意化清氣降濁氣。穢毒自開也。方名代貤者。凶荒之後。必有溫疫。凶荒者。賑之以穀。溫疫者。賑之以藥。使貧者病者皆得食賑。故方名代貤也。

李四十歲

周身斑疹。夾紫黑痘數百枚。與代貤普濟散。日五兩。服至七日後愈。感受穢濁。滿面滿脊。楊梅密佈。與代貤普濟散。每日六兩。九日消盡。

徐

因溼毒而發。天行楊梅瘡。脈弦兼有外風。

五十一歲

代貤普濟散。每日服三包。每包五錢。加

五月二十日

土茯苓五錢。煎三杯。分二次服。日共六次。

陳

三十二歲

溫熱面赤。口渴煩燥。六七日壯熱大汗。鼻衄。六脈洪數而促。左先生用五苓散。雙解表裏。余曰。此溫病陽明經證也。其脈促。有燎原之勢。豈緩藥所能挽回。非白虎不可。

生石膏八兩

知母一兩

生甘草五錢

粳米二合

白茅根一兩

側柏葉炭八錢

煮四碗。分四次服。盡劑而脈靜身涼。脈經謂數而時一止曰促。緩而時一止曰結。按古方書從無治促結之明文。余一生治病。凡促脈主以石膏。結脈主以杏仁。蓋促為陽。屬火。故以石膏得肺胃之陽。結脈屬陰。乃肺之細管中塊痰。堵截隧道而然。故以杏仁利肺氣而消塊痰之陰。無不如意。然照世人用藥。石膏用七八錢。杏仁用三五錢。必無效也。吾嘗謂未能學問思辨。而驟然篤行。豈非孟浪之極。既已學問思辨。而不能篤行。豈非見義不為。無勇乎。

溼溫

證似溫熱。但心下兩脅俱脹。舌白。渴不多飲。嘔惡噯氣。則非溫熱而從溼溫例矣。用生薑瀉心湯之苦辛通降法。

王三十三歲
壬戌四月二十日

生薑一兩 乾薑五錢 茯苓六錢 生薏仁五錢
半夏八錢 黃芩三錢 黃連三錢 生香附五錢
水八碗。煮三茶杯。分三次服。約二時服一次。二煎用水三杯。煎一茶杯。

明早服。

日二十三 心下陰霾已退。溼已轉陽。應清氣分之溼熱。

連翹五錢

杏仁泥三錢

銀花五錢

藿梗三錢

蘆根五寸

滑石五錢

熟石膏五錢

黃芩炭三錢

鬱金三錢

黃連二錢

水八碗。煎三碗。分三次服。渣再煮一碗服。

日二十四 斑疹已現。氣血兩燔。用玉女煎合犀角地黃湯法。

生石膏兩半

牛蒡子六錢

知母四錢

元參八錢

銀花一兩

薄荷三錢

連翹一兩

細生地六錢

犀角三錢

桔梗四錢

黃芩炒四錢

人中黃一錢

日二十五 面赤舌黃。大渴。脈沈。肢厥。十日不大便。轉矢氣。譫語。下證也。小承氣湯。

生大黃八錢

枳實五錢

厚樸四錢

水八碗。煮三碗。先服一碗。約三時得大便。止後服。不便再服第二碗。又大便後。宜護陰液。議增液法。

麥冬一兩連心 連翹三錢 細生地一兩 銀花三錢

元參三錢 甘草二錢

煮三杯。分三次服。能寐不必服。

二十六 日 陷下之餘邪不清。仍思涼飲。舌微黃。以調胃承氣湯小和之。

生大黃二錢 元明粉八分 生甘草一錢

二十七 昨日雖大解而不爽。脈猶沉而有力。身熱不退而微厥。渴甚。面赤。猶宜微

和之。但恐犯數下之戒。議增液承氣。合玉女煎法。

生石膏八錢 知母四錢 黃芩三錢

生大黃三錢 另煎分爲三分 每次沖一分服

煮成三碗。分三次服。如大便稀而不結不黑。後服勿沖大黃。

二十八 日 大便雖不甚爽。今日脈浮。不可下。渴思涼飲。氣分熱也。口中味甘。脾熱甚

也。議用氣血兩燔例之玉女煎。加苦藥以清脾瘴。

生石膏三兩 黃連三錢 元參六錢 麥冬一兩

細生地一兩 知母三錢 黃芩六錢

二十九日

煮四碗。分四次服。得涼汗。止後服。不渴。止後服。大用辛涼。微合苦寒。斑疹續出如許。身熱退其大半。不得再用辛涼重劑。議甘寒合化陰氣。加辛涼以清斑疹。

連翹三錢

元參四錢

細生地五錢

銀花三錢

黃芩三錢

花粉三錢

黃連二錢

薄荷一錢

麥冬五錢

犀角三錢

煮三碗。三次服。渣再煮一碗服。

大熱雖減。餘燄尙存。口甘弄舌。面光赤色未除。猶宜甘寒苦寒合法。

連翹三錢

細生地五錢

黃芩三錢

丹皮三錢

元參四錢

黃連二錢

麥冬五錢

銀花三錢

水八碗。煮三碗。分三次服。

初二日

於前方內加

犀角二錢

知母錢半

初三日

邪少虛多。宜用復脈。去桂棗。以其人本係酒客。再去甘草之重甘。加二甲

丹皮黃芩。

初四日

此甘潤化液。復微苦化陰。又苦甘鹹寒法。尙有餘邪未盡。以甘苦合化入陰搜邪法。

元參二兩

黃芩二錢

麥冬八錢

知母二錢

細生地六錢

生龍甲八錢

銀花三錢

丹皮五錢

連翹三錢

青蒿一錢

頭煎三茶碗。二煎一茶碗。分四次服。

陳

二十二

歲

乙丑

四月

十七

日

面赤。目赤。舌苔滿布如積粉。至重之溫病也。最忌發表。且用辛涼。

荊芥穗五錢

薄荷四錢

生甘草三錢

桔梗六錢

連翹八錢

銀花八錢

藿香葉五錢

牛蒡子五錢

杏仁五錢

共爲粗末。分八包。一時許服一包。蘆根湯煎。去渣服。

某
初九日

面赤。目赤。舌苔滿布。至重之溫熱病。脈反緩而弦。外熱反不盛。口反不渴。肢微厥。所謂陽證陰脈。乃本身陽氣不能十分充滿。不肯化解耳。茲與化

邪法。

荊芥穗二錢

鬱金二錢

藿梗二錢

豆豉錢半

銀花二錢

連翹心錢半

青蒿一錢

桔梗錢半

薄荷八分

杏仁泥二錢

今晚一帖。明早一帖。

十一日

溫病未有不渴而燥者。今舌苔布滿而不渴。雖黃而滑。脈緩甚。勢不壯。蓋夾溼之故也。議照溼溫例。治用苦辛寒法。

生蒼朮三錢

廣皮二錢

鬱金三錢

黃連一錢

蔻仁一錢

連翹三錢

銀花二錢

藿香二錢

天花粉三錢

黃芩一錢

今晚一帖。明早一帖。各兩杯。兩帖而安。

陳

三十三歲
初八日

六脈弦細而勁。陰寒脈也。欬嗽稀痰。陰溼咳也。舌苔刮白而滑。陰舌苔也。嘔吐泄瀉。陰溼證也。雖發熱汗出而解。乃溼中兼風。病名溼溫。天下有如是之陰虛證乎。

初十日

痰飲兼風。誤治成壞證。前用溫平逐溼除風。諸惡證俱減。惟寒少熱多。熱後汗出未除。現在面赤口渴。暮夜譫語。有風化熱之象。但六脈尙弦。未盡轉陽也。再咳嗽則胸脅少腹俱微痛。又有金剋木之象。

茯苓四錢 澤瀉四錢 桂枝三錢 於朮三錢
炒白芍二錢 生苡仁五錢 半夏五錢 廣皮炭二錢

生薑汁三匙

十四日

脈弦數。午後潮熱。前有白苔。復變黃苔。嘔惡口渴。頗有溼瘧之象。但咳嗽便溏。又有溼溫之形。伏邪內陷。所感最難清理。

桂枝四錢 茯苓皮五錢 生石膏八錢 青蒿二錢
知母三錢 杏仁泥三錢 炙甘草二錢 苡仁五錢
滑石六錢 豬苓五錢 石膏六錢 大棗二個
炙甘草三錢 半夏二錢 炒白芍二錢 生薑三片

某
初十日

六脈俱弦而細。左手沈取。數而有力。面色淡黃。目白睛黃。自春分午後身熱。至今不愈。曾經大瀉後。身軟不渴。現在雖不泄瀉。大便久未成條。午前小便清。午後小便赤濁。與溼中生熱之苦辛寒法。

茵陳四錢

杏仁三錢

滑石六錢

茯苓皮五錢

通草錢半

黃連一錢

苡仁四錢

蠶砂三錢

黃芩二錢

海金沙四錢

蒼朮炭三錢

十三日

前方內去蒼朮。加石膏。增芩連。

文
三十八
歲丁卯
七月初
二日

溼溫。舌苔白滑厚濁。脈象模糊。弦細而且沉濡。用通三焦法。先寒熱。繼微熱。後不熱。更方三十餘帖。大抵不出滲溼之苦辛淡法。四十五日以後方解。解後以兩和脾胃收功。

冬溫

張
六十八
歲

舌黃。口渴。頭不痛而惡寒。面赤。目赤。脈洪熱甚。形似傷寒。實乃冬溫夾痰飲。與伏暑一類。

甲子十一月十五日

連翹六錢

桔梗八錢

杏仁六錢

荊芥穗五錢

銀花六錢

甘草三錢

半夏八錢

廣皮三錢

鬱金三錢

通草三錢

藿梗七錢

共為粗末。分七包。一時許服一包。蘆根湯煎。

二十六日

前方內減

荊芥穗

通草

二十七日

餘熱未清。

連翹三錢

杏仁三錢

知母二錢

桔梗三錢

薄荷一錢

小生地三錢

黃芩錢半

甘草一錢

銀花二錢

水五杯。煮兩杯。二次服。二帖。

二十九日

溫病渴甚。熱甚。面赤甚。脈洪甚。

杏仁五錢

生甘草三錢

半夏四錢

銀花五錢

石膏八錢

連翹六錢

鬱金二錢

荊芥穗三錢

薄荷三錢

桔梗五錢

三十日 溫病最忌食復。况年老氣血已衰。再復則難治矣。口渴甚。痰多。脅痛。前方加

香附一錢

煮三杯。分三次服。二帖。

初一日 大勢已退。餘熱尙存。仍須清淡數日。無使食復。

細生地五錢

麥冬五錢

連翹三錢

銀花三錢

丹皮二錢

甘草二錢

元參二錢

黃芩錢半

頭煎二杯。二煎一杯。分三次服。

初二日 脈洪滑。於前方內加

半夏三錢

某 脈不浮而細數。大渴欲飲。大汗。裏不足之熱病也。用玉女煎法。

生石膏一兩

甘草三錢

桑葉三錢

知母四錢

麥冬五錢

細生地五錢

粳米一撮

二十三日 溫熱大渴。大汗。脈數。昨用玉女煎法。諸證俱減。平素有消渴病。服昨藥後。

大便稀澹。加牡蠣。一面護陰。一面收下。

生石膏 五錢

炒知母 二錢

炙甘草 三錢

大生地 五錢

麥冬 五錢

京米 一撮

牡蠣 一兩

某
初一日

冬溫。脈沈細之極。舌赤。面赤。譫語。大便閉。邪機純然在血分之裏。與潤下法。

元參 六錢

元明粉 一錢

細生地 六錢

麥冬 六錢

生大黃 五錢

丹皮 三錢

生甘草 二錢

初三日

煮三杯。先服一杯。得便。止後服。湯藥之先。先服牛黃清心丸二丸。

冬溫。譫語神昏。皆誤表之故。邪在心包。宜急急速開臆中。不然。則內閉外脫矣。大便閉。面正赤。昨與潤下法未通。經謂下不通。非細故也。得藥則嘔。忌甘也。先與牛黃清心丸二三丸。以開臆中。繼以大承氣湯。攻陽明之實。

生大黃 八錢

元明粉 三錢

枳實 四錢

厚樸 二錢

元參 八錢

丹皮 五錢

煮三杯。得便則止。不便再服。

吳鞠通醫案 卷二 冬溫

吳鞠通醫案

卷二

中風

陶氏
六十八歲

左肢拘攣。舌厚而蹇不能言。上有白苔。滴水不能下咽。飲水則噎。此中風挾痰之實症。前醫誤與補陰。故隧道俱塞。先與開肺。

生石膏 四錢

防己 五錢

杏仁 四錢

薑半夏 五錢

茯苓塊 五錢

桑枝 五錢

陳皮 三錢

白通草 錢半

服一帖而飲下咽。服七帖而舌腫消。服二十帖。諸病雖漸減。而無大效。左肢拘攣如故。舌雖消腫。而語言不清。脈兼結。余曰。此絡中痰堵塞。皆誤補致壅之故。非鍼不可。於是延郊七兄鍼之。舌上中泉穴一鍼。出紫黑血半茶碗。隨後有物如蚯蚓。令伊子以手探出。即使鍼孔中拉出膠痰一條。如勻粉。長七八寸。左手支溝穴一鍼。透左關手背三陽之絡。用

小鍼十數鍼。以後用藥日日見效。前方止減石膏之半。服至七十餘帖。自行出堂上轎矣。

中風。溼口歪。臂不舉。腿腫。脈洪數。口渴。胃不開。與涼開水道法。

哈
六十六
歲

桂枝三錢 防己二錢 飛滑石一兩 通草二錢
半夏五錢 桑葉五錢 石膏四錢 茯苓皮一兩

晚蠶砂三錢

二帖而效。十四帖全愈。後以補脾胃收全功。

中風。神呆不語。前能語時。自云頭暈。左肢麻。口大歪。不食。六脈弦數。此痺中也。與柔肝法。

生白芍三錢 麥冬二錢 生龍甲五錢 左牡蠣五錢

炙甘草三錢 生地黃八錢

一帖而神有清意。人與之言。能點頭也。又於前方加生阿膠三錢。丹皮四錢。三帖而半語。七帖而愈。能食。十二三帖而如故。

李氏

伏暑挾痰。飲肝鬱。又加中風。頭痛。舌厚白苔。言蹇。畏寒。脈洪數而弦。先與

七十二歲 辛涼清上

苦桔梗三錢

桑葉三錢

連翹三錢

蒺藜二錢

甘草一錢

茶菊花三錢

銀花三錢

薄荷錢半

四帖而頭痛畏寒止。舌漸消。苔不退。繼以通宣三焦。兼開肝鬱。

茯苓五錢

杏仁泥五錢

半夏四錢

白蔻仁二錢

飛滑石六錢

香附二錢

通草一錢

廣鬱金二錢

薏仁五錢

服二十餘帖而大安。一切復元。

少陽瘕瘕

某氏
己卯七月

其人本有肝風頭痛病根。少陽鬱勃。真水不能上濟可知。又現伏暑內發。新涼外加。金來尅木。木愈病矣。少陽所至為瘕瘕。理固然也。勉與清膽絡。兼清心包。

犀角三錢

丹皮五錢

鮮荷葉一張

羚羊角三錢

細生地五錢 鈎藤二錢 茶菊花三錢 桔梗二錢
甘草錢半 桑葉三錢

間服紫雪丹一二錢。

又 此症肝風無疑。昨服柔肝清熱之劑而燒退。是外邪已解。現在六脈弦細。手足發涼。似有厥意。治法熄風之中。似宜參入開心包之絡爲是。倘一二天不醒。便難挽回矣。

丹皮五錢 茶菊花三錢 細生地五錢 羚羊角三錢
嫩桑枝二十寸 刺蒺藜二錢 石菖蒲一錢 生甘草一錢
生牡蠣三錢 沙參二錢 生阿膠二錢 生鼈甲二錢
間服紫雪丹及牛黃丸。

又 用玉女煎加

犀角 丹皮

又 用玉女煎加

犀角 丹皮 連翹 銀花重用 石膏 知母。

又

少陽頭痛甚急。外因亦未盡解。

生石膏一兩	生甘草二錢	炒知母二錢	桑葉三錢
丹皮五錢	天冬二錢	菊花三錢	鈎藤二錢
銀花三錢	羚羊角三錢	左牡蠣五錢	連翹三錢
細生地五錢	麥冬五錢		

間服紫雪丹三分。

肝風

章氏七十二歲

老年下虛上盛。又當厥陰司天之年。厥陰主令之候。以致少陽風動。頭偏右痛。目系引急。最有壞眼之慮。刻下先與清上。

癸丑正月二十八日

羚羊角三錢	刺蒺藜一錢	連翹一錢	桑葉二錢
茶菊花二錢	生甘草八分	桔梗錢半	蘇薄荷八分

日二帖。服二日。

三十日

少陽頭痛已止。現在胸痞脅脹。肝胃不和。肢痛腰痛。議兩和肝胃之中。兼

與宣行經絡。

桂枝尖二錢

子青皮一錢

製半夏五錢

廣鬱金二錢

廣皮錢半

製香附二錢

杏仁泥三錢

生薑汁三匙

服二帖。

二月初二日

因食冷物晝寐。中焦停滯。腹不和泄瀉。與開太陽闔陽明法。

桂枝五錢

茯苓塊五錢

炮薑錢半

蒼朮三錢

半夏三錢

木香錢半

豬苓三錢

廣陳皮錢半

澤瀉三錢

藿香梗三錢

煨肉果錢半

頭煎兩茶杯。二煎一茶杯。分三次服。

初四日

諸症向安。惟餘晨泄。左手脈緊。宜補腎陽。

煨肉果三錢

五味子一錢

蓮子五錢連皮去心

補骨脂三錢

生於朮三錢

芡實三錢

兔絲子二錢

茯苓塊五錢

水五碗。煮成兩碗。分二次服。渣再煮一碗。明早服。

初七日

即於前方內去兔絲子。加

牡蠣粉 三錢

初十日 太陽微風。以桂枝法小和之。

桂枝 二錢

廣陳皮 二錢

白芍 二錢

茯苓塊 三錢

炙甘草 八分

半夏 三錢

生薑 二片

大棗 一枚

水三杯。煮取二杯。分二次服。

十一日 右目澀小。酉刻後眼前如有黑霧。議清肝絡。熄肝風。益肝陰法。

桔梗 錢半

青箱子 二錢

沙參 三錢

生甘草 八分

茶菊花 錢半

沙蒺藜 二錢

何首烏 三錢

三帖後。了然如故。

陶氏 右脈洪大。尺部更甚。左脈弦細。上盛下虛。卒中不能語。如中風狀。乃肝風

癸亥二月十五日 內動。絡熱竅閉之故。證勢甚重。

羚羊角 一錢

桔梗 一錢

麥冬 二錢

桑葉 一錢

沙參 錢半

生鼈甲 三錢

茶菊花 錢半

甘草 八分

刺蒺藜 一錢

細生地 錢半

日二帖服三日。

二十日

上盛下虛。竅閉不能言。用清輕合芳香。開上今稍能言。但虛煩不眠。心悸頭暈。仍係厥陽未熄。用補心肝之體。兼實下法。

白芍六錢

沙參三錢

阿膠二錢

蓮子五錢

大生地五錢

棗仁五錢

龜板四錢

硃砂五錢

麥冬五錢

炙甘草三錢

茯苓塊三錢

水五碗。煮取兩碗。分三服。再煮一杯服。

黃三十歲

肝風內動。脈弦數。乃真水不配相火。水不生木。故木直強而上行。頭暈甚。即巔厥也。久不治為癎中。醫云痰者妄也。先與清肅少陽膽絡。繼以填補真陰可也。

羚羊角三錢

茶菊花三錢

黑芝麻三錢

桑葉三錢

生甘草一錢

丹皮二錢

苦桔梗二錢

鈎藤二錢

薄荷七分

丸方

定風珠。

肝厥

高氏
四十五
歲
乙丑十
一月十
一日

肝陽上竄。因怒即發。十餘年矣。經云。久病在絡。豈經藥可效。再肝厥之症。亦有寒熱之不同。此症脈沉而弦細。其為寒也無疑。大凡寒厥必死。今不死者。以其為腑厥而非臟絕也。現在脅下有塊有聲。經色紫黑。擬先用溫通絡脈法。

新絳紗三錢

旋覆花三錢

川椒炒黑二錢

降香末三錢

歸鬚二錢

製半夏五錢

桂枝尖三錢

生香附三錢

桃仁炭三錢

煮二杯。二次服。

額三
兄夫
人
二十二
歲

先是產後受寒痺痛。醫用桂附等極剛極熱之品。服之大效。醫見其效也。以為此人非此不可。用之一年有餘。不知溫燥與溫養不同。可以治病。不可以養生。以致少陰津液被劫無餘。厥陰頭痛。單巔頂一點。痛不可忍。畏

除夕日
亥時

明。至於窗間有豆大微光。即大叫。必室如黑漆而後少安。一日厥去四五次。脈弦細數。按之無力。危急已極。勉與定風珠。潛陽育陰。以熄肝風。

真大生地八錢

麻仁四錢

生白芍四錢

麥冬四錢
帶心

海參二條

生阿膠四錢

生龜板六錢

炙甘草五錢

生牡蠣六錢

生龍甲六錢

雞子黃二枚
去渣後
化入攪勻

煮成八杯。去渣。上火煎成四杯。不時頻服。

正月初一日

微見小效。加

鮑魚片一兩

煮成十杯。去渣。煎至五杯。頻服。

初四日

腰以上發熱。腰以下冰涼。上下渾如兩截。身左半有汗。身右半無汗。左右渾如兩畔。自古方書未見是證。竊思古人云。琴瑟不調。必改弦而更張之。此症當令其復厥。厥後再安則愈。照前方定風珠減半。加

青蒿八分

當夜即厥二三次。

初五日

照前方定風珠原分量一帖。服後厥止神安。

初七日 仍照前方。

初八日 方皆如前。漸不畏明。至正月二十外。撤去幃帳。湯藥服至二月春分後。與

專翕大生膏一料全愈。

楊室女

四十九歲

甲申十

二月初

二日

初因肝鬱脅痛。繼而肝厥犯胃。醫者不識病名。肝着。與絡痛治法。無非滋陰補虛。或用涼藥。以致十年之久。不能吃飯。飲粥湯止一二口。食炒米粉止一酒杯。稍聞響聲。即瘞厥。終夜抽搐。二三日方漸平。六脈弦緊而長。經閉二年。周身疼痛。痰飲咳嗽。終年無已。骨瘦如柴。奄奄一息。此症內犯陽明。故不食。木剋脾土。故飲聚。陽明空虛。故無主。聞聲而驚。外犯太陽。故身痛而瘞。本臟致病。故厥。經謂治病必求其本。仍從肝絡論治。

新絳紗

歸鬚

川椒炭

桂枝

鬱金

旋覆花

青皮

蘇子霜

半夏

降香末

十四日 服前方七帖。脅痛雖輕。痰飲特甚。喘咳頻仍。夜臥不安。暫停絡藥。專與和

胃蠲飲。

半夏八錢

廣陳皮四錢

生苡仁五錢

茯苓六錢

枳實二錢

淡乾薑三錢

桂枝三錢

十七日

胃稍開。能食稀粥半碗。脅仍痛。仍服前活絡方。去川椒。加廣陳皮。

十二月初四日
十一日

脅痛平。咳嗽未除。又服前蠲飲方。因余有紹興之行。令其常服和胃方。脅痛發時。暫服新絳旋覆花湯。此時

乙酉二月二十
八日

已能食爛飯半盃矣。脈稍和平。雖弦而有胃氣。乾飯能吃一碗有半。經亦復通。仍間服前二方。夜間偶感燥症。欲起不得起。欲坐不得坐。欲臥不得臥。煩躁無奈。不可當。

十八日

約二時。服霹靂散三兩許始安。次日仍與和胃。能食乾飯兩小碗矣。六脈又和一等。仍間服前二方。

四月初
三日

余復由淮至紹。初八日至蘇州。不放心此病。作書一封。令其調適性情。五月間。又作書一封。痛以大道理開導之。十月間始得回書。據云竟以余書作座右銘。每日諷誦一過。飲食又進。精神大長。闔家歡樂。

脅痛

伊氏
二十歲

肝鬱脅痛。病名肝着。亦婦科之常證。無足怪者。奈醫者不識。見其有寒熱也。誤以爲風寒而用風藥。夫肝主風。同氣相求。以風從風。致令肝風鴟張。肝主筋。致令一身筋脹。肝開竅於目。致令晝夜目不合。不得臥者七八日。肝主疏泄。肝病則有升無降。失其疏泄之職。故不大便。小溲僅通而短赤特甚。醫者又不識。誤以爲腸胃之病。而以大黃通之。麻仁潤之。致令不食不饑。不便不寐。六脈洪大無倫。身熱且坐不得臥。時時欲嘔。煩躁欲怒。是兩犯逆也。金匱論一逆尙引日。再逆促命期。不待智者而知其難愈也。議宣通經脈法。肝藏血。絡主血故也。必加苦寒泄熱。脈沉洪有力。且膽居肝內。肝病膽卽相隨故也。

旋覆花 五錢

炒黃連 二錢

桃 仁 四錢

歸 鬚 四錢

鬱 金 三錢

川 楝 皮 五錢

新 絳 四錢

絳 香 末 四錢

蘇 子 四錢

急流水 八碗。

又
服前方見小效。卽於前方內加。

又

丹皮三錢 炒黑 生香附二錢 減 川棟皮二錢
脅痛減其大半。但不得寐。時時欲嘔。擬兩和陽明厥陰。仍兼宣絡。

半夏五錢 醋炒

青皮錢半

降香末三錢

新絳三錢

歸鬚三錢

蘇子霜三錢

秫米一撮

桃仁三錢

川棟皮二錢

廣鬱金二錢

黃芩二錢

又

煮三盃。日二夜一。
昨方業已效。今日復苦藥。即苦與辛合。能降能通之意。即於前方內。加

薑汁 古勇黃連二錢

又

昨用苦辛法。服減便通。今日腹中覺痛。將近經期。一以宣絡為主。

新絳紗五錢

蘇子霜二錢

丹皮二錢 炒

製香附二錢

兩頭尖二兩

旋覆花五錢

元胡索二錢

條芩錢半 酒炒

桃仁泥四錢

降香末三錢

歸鬚三錢

鬱金三錢

又

水入盃。煮取三杯。日二夜一。
昨日一味通絡。已得大便通利。腹中痛止。但不成寐。今日用胃不和則臥

不安。飲以半夏湯。覆杯則寐。法。仍兼宣絡。此仲景先師所謂衝脈累及陽明。先治衝脈。後治陽明也。

半夏一兩

旋覆花五錢

降香末二錢

秫米二兩

新絳四錢

水十杯。煮成四杯。日三夜一。

又 昨與半夏湯和胃。業已得寐。但脈沉數。洩赤短。議加苦藥。泄肝熱而通小腸火府。

半夏六錢

降香末三錢

黃蘗二錢鹽炒

秫米一兩

新絳四錢

旋覆花五錢

生香附三錢

黃連二錢炒

煎法如前。

又 昨日和胃宣絡。兼用苦通火府。今日得寐。洩色稍淡。口亦知味。是陽明有漸和之機矣。惟胸中微痛。背亦掣痛。按肝脈絡胸。背則太陽經也。是由厥陰而累及少陽。肝膽為夫妻也。由少陽而累及太陽。少太為兄弟也。今日仍用前法。加通太陽絡法。

半 夏五錢

降香末三錢

黃 蘗錢半鹽水炒

川棟皮二錢

旋覆花三錢

古勇黃連一錢

桂枝尖三錢

新 絳三錢

秫 米六錢

生香附三錢

煎法如前。

繞臍痛者。瘕也。亦衝脈肝經之病。

桂枝尖三錢

新 絳三錢

半 夏五錢

炒雲連一錢

當 歸三錢炒黑

生香附三錢

淡吳黃三錢炒

小 茴三錢炒黑

秫 米八錢

川棟子三錢

兩和肝胃。兼治瘕痛。

半 夏八錢

青 皮二錢

吳 黃三錢炒黑

新絳紗三錢

小茴香三錢炒黑

生香附三錢

旋覆花三錢

桂枝尖三錢

雲 連錢半炒黑

淡乾薑二錢

烏 藥三錢

秫 米一兩

降香末三錢

全當歸三錢炒黑

煮成四碗。日三夜一。

腹中拘急而痛。小溲短赤。皆陰絡阻塞。濁陰凝聚之象。與宣通陰絡降濁

又

又

又

法

桂枝尖三錢 降香末三錢 琥珀三分末 小茴香炒三錢
川棟皮三錢 原麝香五分研沖 新絳三錢 兩頭尖二錢
元胡索二錢 吳萸錢半 歸鬚三錢 桃仁泥二錢
水六杯。煮成二杯。每服半杯。沖韭白汁兩小茶匙。日二杯。夜一杯。明早一杯。

又

仍用前方。但昨日未用半夏。今徹夜不寐。酉刻再服靈樞半夏湯一帖。因肝病不得疏泄。兼有痺痛。擬兩疏氣血法。

又

桂枝尖三錢 川棟子三錢 小茴香炒三錢 牛膝二錢
防己二錢 降香末三錢 新絳三錢 歸鬚三錢
蠶砂三錢 桃仁泥三錢 黃連一錢吳汁炒
諸證悉減而未盡。左脈已和。右脈弦大。是土中有木。於兩疏氣血之中。兼泄木安土法。

桂枝尖三錢 牛膝二錢 鬱金二錢 歸鬚三錢

又

右脈弦剛。土中木盛。

白芍酒炒三錢	杏仁三錢	蠶砂三錢	降香末三錢
半夏五錢	青皮二錢	川棟子三錢	防己二錢
新絳三錢	小茴香三錢	茯苓皮三錢	

又

脈弦數。頭痛時止時甚。向來時發時止。已非一日。此乃少陽絡痛。虛風內動也。今日且與清膽絡法。勿犯中焦。

白芍酒炒六錢	茯苓塊四錢	鬱金三錢	桂枝尖四錢
降香末三錢	新絳三錢	薑半夏六錢	歸鬚三錢
廣皮二錢	小茴香三錢	川棟子三錢	

又

治下焦絡法。

桑葉二錢	甘菊花二錢	刺蒺藜一錢	丹皮錢半
羚羊角八分	苦桔梗一錢	炒白芍二錢	鉤藤一錢
生甘草八分			

桂枝尖二錢 澤蘭錢半 新絳二錢 整當歸五錢

生香附三錢

小茴香三錢

白芍六錢

縮砂蜜二錢

鬱金三錢

煮成三杯。日二夜一。

又

入脈麗於肝腎。肝病久。未有不累及入脈者。用通補陰絡。兼走入脈法。

桂枝尖一錢

杞子二錢

小茴香二錢

杭白芍六錢

歸身三錢

縮砂仁錢半

新絳錢半

桂圓肉二錢

又

法同前。

桂枝尖一錢

全當歸三錢

桂圓肉二錢

廣木香一錢

炒白芍六錢

降香末三錢

生香附三錢

新絳三錢

川芎二錢

澤蘭一錢

尹氏
三十二歲

誤服大辛大溫。致傷心陽。使下焦濁陰來攻。過提致少陽無忌。有升無降。上愈盛。下愈虛。且與鎮固法。非治病也。特醫藥耳。

新紗三錢

梔子三錢

半夏六錢

旋覆花三錢

古勇黃連錢半

代赭石一兩

降香末五錢

焦白芍三錢

紫石英一兩研細

炙龜板五錢

煮成三大茶杯。分三次服。渣再煎一杯服。

又

鎮衝脈。泄膽陽。業已得效。仍宗其法。其血絡之鬱痛。未能卒治。蓋事有緩急也。

紫石英一兩

代赭石一兩

焦白芍五錢

新絳紗四錢

古勇黃連一錢

山梔三錢炒

炙龜板八錢

旋覆花三錢

半夏六錢

蘇氏
三十二歲

脈弦數。左尺獨大。寢居右脅。發則攻心。痛躍不止。病名肝着。先宜宣絡。後補八脈。

新絳紗三錢

歸鬚二錢

廣鬱金二錢

旋覆花三錢

炒桃仁三錢

兩頭尖三錢揀淨

降香末三錢

丹皮三錢炒

元胡索二錢

初二日

肝着用通絡法。業已見效。仍宗前法。但必須用化癥丹間服為妙。取其治病而不傷正耳。

新絳紗三錢
歸 鬚二錢
元胡索二錢
旋覆花三錢
桃 仁三錢
生香附三錢
蘇子淨霜三錢
降香末三錢
半 夏三錢
廣鬱金三錢
烏 藥二錢

初三日 於前方內加

兩頭尖三錢
炒丹皮三錢
白 芍三錢
韭白汁三小匙
初六日 藥力不及且用進法。

新絳紗三錢
桃仁泥三錢
藏紅花二錢
旋覆花三錢
歸 鬚錢半
生香附三錢
焦白芍六錢
丹 皮五錢
川棟子三錢
三帖。

十四日 仍宗前法。

新絳紗三錢
桃仁泥五錢
歸 鬚二錢
旋覆花三錢
藏紅花三錢
降香末三錢
梔 子五錢
生香附三錢

元胡索二錢

廣鬱金二錢

蘇子霜三錢

川棟子三錢

三帖。

十六日

甲子正月十九日

業已見效。照前方日服半帖。丸藥減三分之二。經來五日。顏色已正。不得過行傷正。其瘕氣留爲丸藥化可也。茲擬寧心止汗。

白芍六錢

粉丹皮三錢

洋參二錢

茯苓塊五錢

製五味一錢

牡蠣五錢

整硃砂三錢

麥冬五錢

大生地五錢

炙龜板八錢

大棗二枚

小麥三錢

水八碗。煮取三碗。分三服。三帖。

甘氏五十歲

凡兩畔不同者。皆肝病也。此證氣至丑寅則上升。暮卒復。左脈沈弦。右脈浮弦。升降失司。痰飲斯聚。

薑半夏五錢

降香末三錢

旋覆花三錢

小枳實三錢

廣陳皮三錢

杏仁泥三錢

蘇子霜三錢

黃芩炭八分

生薑三片

肝癰

謝四十四歲
辛巳三月二十四日

病起肝鬱脅痛。痰中帶血。病名肝着。醫者不識絡病因由。與絡病治法。非見血投涼。即見血補陰。無怪乎愈治愈窮也。大凡血症之脈。左脈堅搏。治在下焦血分。右脈堅搏。治在上焦氣分。茲左手脈浮取弦。沈取洪大而數。重按即芤。前曾痰有氣味。現在痰挾瘀滯黑色。脣舌皓白。其爲肝經絡瘀挾痰飲。咳血無疑。勢已憊極。勉與宣絡止血。兼之兩和肝胃。以逐痰定咳。此服未

新絳紗三錢

旋覆花三錢

歸鬚錢半

桃仁泥三錢

半夏三錢

廣皮炭二錢

蘇子霜一錢

降香末錢半

廣鬱金二錢

煮兩茶杯。分四次服。二帖。

血家左手脈堅搏。治在下焦血分。此症先因肝絡瘀滯。以致血不歸經。日久不治。由陰經損及陽氣。自汗溺變痿弱。陽虛也。左脈洪數而芤。陰傷也。

四月初三日

如是陰陽兩傷之極。而瘀滯仍然未淨。通絡則虛急。補虛又絡滯。兩難措手。不得已用新絳一方。緩通其絡。其補藥則用陰陽兩攝法。聊盡人力而已。從此起服

遼參一錢

麥冬四錢連心

海參二錢

五味子一錢

沙苑蒺藜三錢

茯苓神五錢

枸杞子三錢

龜板五錢

牡蠣六錢

初四日

病起於脅痛。瘀血致壅。久咳成勞。至骨痠不能起床。仍有瘀滯不化之象。且痰有臭味。即係肝着成癰。前日脈雖芤大而濇。昨日大見瘀血後。今日則純然芤矣。豈非瘀血之明徵乎。若一味貪補。斷難再起。兼之宣絡。萬一得甦。妄誕之診。高明酌之。

新絳紗三錢

旋覆花二錢

歸橫鬚八分

半夏錢半

廣皮炭一錢

桃仁泥三錢

丹皮炭五錢

此方金匱載在婦人虛勞門。有識其悟之。上半日服此方完。下半日服前補方。

初五日 痰中臭味太甚。黑痰未淨。是活絡之方不能除。脈孔自汗甚。是補攝之方

又不可緩。痰稀純白。內有支飲。於補方中去牡蠣、海參。鹹味之礙飲者。此症極虛極實。時人但知其虛而不知其實。所以日誤一日。以致於此。治實礙虛。治虛礙實。焉望成功。一通一補。俱每日照前服法未改。

初七日

脈較前欽戢。於新絳方內半夏加錢半。作三錢。餘仍舊。服法亦如之。

初八日

今日左尺脈獨大。加封固腎氣法。餘有原案二方。每日間服如前。

人參一錢

炙龜板八錢

蓮子五錢

炙甘草三錢

製五味一錢

杞子三錢炒黑

沙蒺藜二錢

左牡蠣六錢

雲茯苓五錢

麥冬三錢連心

炒白芍三錢

初十日

於前方內加遼參五分作錢半。又加海參一條。淡苳蓉三錢。四帖。餘悉如前。

十三日

仍照前服。每日間服一通一補方。

十七日

左脈空大未欽。精神較前雖好。猶宜收攝下焦。於前方內去龜板、五味子、白芍、海參、苳蓉。餘如舊間服法。煮好去渣。再上火煎成二杯。分二次服。

同日 痰色猶不能清白。氣味亦不淨。仍須宣絡。

新絳紗三錢

旋覆花二錢

半夏五錢

廣皮炭錢半

廣鬱金錢半

當歸鬚一錢

上半日服。四帖。

二十一日 脈少。通補二方間服如前。四帖。

二十四日 痰濁未變。脈象少。午後微熱不寐。飲食由漸而加。不可太過不及。

人參錢半

蓮肉五錢

炙甘草三錢

枸杞三錢

沙蒺藜三錢

雲茯苓五錢

左牡蠣五錢

麥冬三錢

熟五味子一錢

炒棗仁三錢

海參二條

大淡菜三錢

午後服此。

又方

新絳紗二錢

旋覆花二錢

半夏三錢

廣鬱金二錢

歸鬚一錢

桃仁泥二錢

廣陳皮八分

香附二錢

煮兩小茶杯。午前服。

初九日 復診於補方去牡蠣、五味子。餘仍二方間服如前。
十三日 痰已漸清。肝亦漸平。精神漸旺。擬去搜逐而補中。與外臺茯苓飲意。專方

雲茯苓塊六錢 人參二錢 香附三錢 生於朮五錢
炙甘草二錢 半夏五錢 生苡仁五錢 小枳實二錢

癲狂

陀五十九歲
病由情志而傷。中年下焦精氣不固。上年露寐中之萌。近因情志重傷。又在相火主令。君火司天。君火客氣。內與本身君火相火相應。以致肝風鴟張。初起如狂。醫者仍然攻風劫痰。大用辛溫剛燥。復以苦寒直下。是助賊為虐也。現在左脈實大堅牢。大非吉兆。勉以紫雪定痙癎肢厥。而泄有餘之客熱。再以定風珠濟不足之真陰。而息內風之震動。如果病有回機。神色稍清。再擬後法。

紫雪丹二兩 每服二錢二時許一服以神清為度牙關緊閉用烏梅蘸醋擦牙根其牙即開
大生地一兩 生白芍一兩 生龍甲一兩 炙甘草六錢

真阿膠 四錢

麻仁 四錢

麥冬 八錢

左牡蠣 八錢

蚌水

半酒杯冷
沖入

雞子黃

二枚 藥煮成去渣和
入上火三沸

煮成三盃。渣再煮兩盃。共四盃。四刻服半碗。盡劑再作服。

二十日

左脈仍然牢固。較昨日諸證俱減。舌苔黃黑。尺膚熱。陽明絡現。昨謂不止。本身虛熱。且有客氣加臨。非虛語也。湯藥仍照前方。再以清宮湯。化牛黃紫雪輩。二時一次。

連翹 三錢

元參心 五錢

麥冬 五錢

蓮子心 錢半

鮮竹葉 三錢

捲心
服牛黃丸紫雪丹。即以此湯化服。

二十一日

瘈瘲肢厥雖止。其狂如故。會厭不利。脈仍牢固數大。按陽盛并於上則狂。的係陽火有餘。非極苦之藥。直折其上盛之威。其勢未必得減。况小腸火腑。非苦不降。痰亦因之而降。其會厭庶可得利矣。

洋蘆薈 三錢

真雅連 三錢

龍膽草 三錢

生白芍 六錢

知母 六錢

細生地 六錢

丹皮 八錢

麥冬 八錢

元參五錢

犀角煎入錢先代水

頭煎三碗。今日服。二煎兩碗。明早服。二帖半。

二十四 脈氣大減。但陽升阻絡。機不靈。擬兼清會厭膽絡之熱。

羚羊角三錢

龍膽草錢半

知母三錢

鉤藤二錢

連翹錢半

桑葉錢半

洋蘆薈錢半

大生地三錢

麥冬連心三錢

米醋三杯。每藥一茶杯。沖入半酒杯。今晚一帖。明早一帖。

二十五 於前方內加

石膏二兩

二十六 稍進糜粥。覺勇力培常。舌紅黑。脈亦較昨日實大。猶爲陽火有餘。

蘆薈四錢

龍膽草三錢

雅連四錢

犀角六錢

丹皮五錢

細生地四錢

麥冬五錢

知母五錢

米醋每入半杯藥和

濃煎三杯。分三次服。渣再煮二杯。明早服。

二十七日 於前方內加

鐵落一兩

初二日 諸證與脈俱減。然未能淨。苦藥猶不能除也。頰腫係客氣。擬加辛涼。

蘆薈三錢

龍膽草三錢

真犀角五錢

丹皮五錢

麥冬六錢

雅連三錢

知母三錢

羚羊角三錢

連翹三錢

鉤藤三錢

銀花三錢

鐵落水煎

頭煎三杯。二煎三杯。六次服。明日午令盡。間服牛黃紫雪輩。日三次。

初三日 於前方內加

生地八錢

齊四十二歲 已巳二月初二日 脈弦數而勁。初因肝鬱。久升無降。以致陽并於上。則狂。心體之虛。以用勝而更虛。心用之強。因體虛而更強。間日舉發。氣伏最深。已難調治。况現在卯中乙木盛時。今歲又係風木司天。有木火相煽之象。勉與補心體。瀉心用兩法。

洋參三錢

大生地一兩

蓮子心一錢

黃蘗三錢

初六日

白芍六錢 丹皮四錢 麥冬六錢 生龜板一兩
丹參三錢 真山連三錢
外用紫雪丹六錢 每次一錢。與此方間服。
操持太過。致傷心氣之狂疾。前用補心體。瀉心用。攝心神。已見大效。脈勢亦減。經謂脈小則病退是也。

洋參三錢 白芍六錢 丹皮五錢 真山連二錢

生龜板一兩 黃蘗炭二錢 麥冬三錢 女貞子四錢

蓮子五錢 龍膽草二錢 米醋一酒杯 鐵落水煎

某日二十七

左脈弦勁。經謂單弦飲癖。前五日因觀戲後。病惡夢。病狂肢厥。經謂陽並於上則狂。兩陰交盡之厥。靈樞有淫發夢一卷。大意以五臟偏勝。非因夢而後病也。前人諸般怪症。皆屬於痰之診。雖不盡然。但此症現在咳嗽塊痰。左脈單弦。應作痰治。

半夏五錢 丹皮三錢 石菖蒲二錢 天竺黃二錢

茯苓塊五錢 白附子二錢

先服陳李濟牛黃清心丸一二丸。溫開水調服。

二十八日

狂而厥。左脈單弦。咳嗽痰塊。昨議應作痰治。今日左脈漸有和平之象。證於外者亦效。但形貌怯弱。色白而嫩。脈亦不壯。此症之痰。究因驚起。凡神氣壯者不驚。况驚後惡夢發後大汗。其為陽虛神怯顯然。此症將來必大補而後收功。現在不得以攻痰見效。而忘其虛怯。與化痰之中。微加益氣。

半 夏 五錢

茯苓塊 五錢

秋小麥 八錢

石菖蒲 一錢

麥 冬 五錢

大 棗 二枚

二十九日

體虛有痰之症。不能純治一邊。今日脈微滑數。於昨日法中。少加逐痰。

半 夏 五錢

白附子 二錢

秋小麥 一合

陳膽星 一錢

石菖蒲 錢半

茯神塊 五錢

麥 冬 三錢

先服牛黃清心丸半丸。

初一日

昨日稍加逐痰。痰出如許。大勢安靜。但多怒耳。右脈仍滑。痰未淨也。

半 夏 六錢

秋小麥 八錢

白附子 二錢

石菖蒲 一錢

旋覆花 三錢

茯神塊 三錢

代赭石 五錢

炙甘草 一錢

鮑三十二歲
初十日

其後痰去。以大補心脾而安。

大狂七年。先因功名不遂而病。本京先醫市醫儒醫。已歷不少。既徽州醫。杭州醫。蘇州醫。湖北醫。所閱之醫。不下數百矣。大概補虛者多。攻實者少。間有已時。不旋踵而發。余初診時。見其蓬首垢面。下體俱赤。衣不遮身。隨作隨毀。門牕分碎。隨釘隨拆。鐐銬手足。外有鐵索數根。錮鎖於大石盤上。言語之亂。形體之羸。更不待言。細詢其情。每日非見婦人不可。婦人不願見。彼盡鬧不可。叫號聲嘶。哀鳴令人不可聞。只得令伊姬妾強待之。然後少安。次日仍然。無一日之空。診其脈六脈弦長而勁。余曰。此實症。非虛症也。於是用極苦以瀉心膽二經之火。瀉心者必瀉小腸。病在臟。治其腑也。但無出路。亦必瀉小腸也。

龍膽草三錢

胡黃連三錢

天門冬三錢

細生地三錢

丹皮三錢

大麥冬三錢
連心

服二帖而大效。妄語少而舉動安靜。初三日見其效也。以爲久病體虛。恐過剛則折。用病減者減其製例。於原方減苦藥。加補陰之甘潤。初五

日。病家來告云。昨服政方二帖。病勢大重。較前之叫哮妄語。加數倍之多。無一刻靜。此症想不能治。諒其必死。先生可不診矣。余曰。不然。初用重劑而大效。繼用輕劑加補陰而大重。吾知進退矣。復診其脈。弦長而數。於是重用苦藥。

龍膽草 六錢

洋蘆薈 六錢

天冬 五錢

麥冬 五錢

胡黃連 五錢

秋石 二錢

烏梅肉 五錢

一氣六帖。一日較一日大效。至十一日大爲明白。於是將其得病之由。因伊念頭之差。其念頭之差。因未識文章至高之境。即欲至高。尙有命在。非人力所能爲。何怒之有。人生以體親心爲孝。痛乎責之。俯首無辭。以後漸去苦藥加補陰。半月而後。去刑具。着衣冠。同跪拜。神識與好人無異。服專翕大生膏一料而大壯。下科竟中矣。

先是二月間病。神識恍惚。誤服肉桂熟地等補藥。因而大狂。余於三月間用極苦以折其上盛之威。間服芳香開心包。治三十日而愈。但脈仍洪數。余囑其戒酒肉。服專翕大生膏。補陰配陽。彼不惟不服丸藥。至午節大開

酒肉。於是狂不可當。足臭至隣。不時脫淨衣褲。上大街。一二男子不能搏之使回。五月十四日。又延余視。余再用前法隨效。二三日仍然如故。蓋少陽相火極。挾制君主行令。藥隨暫開其閉。暫折其威。相火一動。而仍然如故。延至六月十六日。午刻復自撕其褲。人不防而出大門矣。余坐視不忍。復自慚無術以已其病。因謂其胞弟曰。此症非打之極痛。令其自着衣褲。也不可。蓋羞惡之心。亦統於仁。能仁則不忍。忍則不仁。不仁之至。羞惡全喪。打之極痛。則不能忍。不忍而仁心復。仁心復而羞惡之心亦復矣。此古聖王扑作教刑之義也。伊弟見其乃姊如是景况。羞而成怒。以保父母體面爲義。於是以小竹板責其腿。令着褲。彼知痛而後自作衣着衣稍明。次月十七日立秋。余以大劑苦藥一帖而全愈。蓋打之功。與天時秋金之氣。藥之力。相須而成功也。後以專翕大生膏而收全功。

虛勞

伊 勞傷急怒。吐血二者。皆治在肝絡。醫者不識。見血投涼。以致胃口爲苦寒。

二十歲

所傷殘。脾陽腎陽亦為苦寒滑潤。伐其生發健運之常。此腹痛晨泄不食。脈沈弦細之所由來也。按三焦俱損。先健中焦。補土可以生金。腎關之虛。亦可仰賴於胃關矣。

蓮子五錢

芡實三錢

白扁豆錢半

冰糖三錢

茯苓塊三錢

廣皮炭一錢

人參一錢

緩緩多服為宜。

陳二十三歲

左脈搏大。下焦肝腎吐血。上焦咳嗽。中焦不食。謂之三焦俱損。例在不治。勉擬三焦俱損。先建中焦法。

桑葉二錢

白扁豆三錢

茯苓塊一錢

蓮子三錢

芡實三錢

冰糖三錢

桂枝二錢

焦白芍錢半

沙參三錢

胡肉桃三錢

服四帖後能食。

脈弦細失音。謂之金碎不鳴。暮熱不食。食則嘔。亦係俱損為難治。

陳氏三十二歲甲子

胡桃肉三錢

甜杏仁三錢

冰糖三錢

白扁豆五錢

四月初五日

茯苓塊二錢 桑葉二錢 洋參二錢 沙參三錢

柏子霜三錢

另含鮑魚片。洋參片。

形寒而六脈弦細。時而身熱。先天不足。與諸虛不足之小建中法。

施二十歲

芍藥六錢 生薑四錢 大棗四枚 桂枝四錢

炙甘草三錢 膠糖一兩去渣化入

前方服過六十劑。諸皆見效。陽雖轉而虛未復。於前方內減薑桂之半。加

柔兼藥與護陰法。

大生地五錢 五味子二錢 麥冬四錢

六脈弦細而緊。勞傷吐血。諸虛不足。小建中湯主之。

小建中湯加茯苓神四錢。

共服二十一帖全愈。

李

二十四歲 乙酉

每日五更。胃痛欲飲。得食少安。胃痛則背冷如冰。六脈弦細。陽微。是太陽之陽虛。累及陽明之陽虛。陽明之陽虛現症。則太陽之陽更覺其虛。此等

五月初三日

陽虛。只宜通補。不宜守補。

半 夏 六錢

廣 皮 四錢

川 椒 炭 五錢

乾 薑 四錢

桂 枝 八錢

十四日

背寒減。腹痛下移。減桂枝。加吳萸、良薑。

傅

十八歲 乙酉五月十三日

六脈弦細而緊。吐血遺精。陽氣不攝。胃口不開。法當與建中復其陽。奈係酒客。中焦濕熱壅聚。不可與甘。改用辛淡微甘以和胃。胃旺得食。而後諸症可復也。

半 夏 五錢

白 芍 五錢

薑 汁 每杯點三 廣皮炭 三錢

桂枝木 三錢

生苡仁 五錢

雲苓塊 五錢 麥 冬 三錢 連心

炒神麴 五錢

七帖。

二十二日

沈

十五歲 乙酉年

業已見效。胃開得食。脈尚弦緊。多服為宜。幼孩脈雙弦而細緊。癰癰結核。胃陽不開。色白食少。且嘔。形體羸瘦。與通補胃陽。

五月十五日

半 夏四錢
生薑三錢

雲苓塊四錢

炒廣皮二錢

白扁豆四錢

六月十二日

前藥已服十二帖。嘔止胃開。腹微脹。脈有回陽之氣。於前方加厚樸、杉皮、消脹。脹消後。接服前方化痰。於前方內去生薑、廣皮。加香附、土貝母、忍冬、藤、青橘葉、海藻。以化癰瘰痰核。六脈弦緊。胃痛。久痛在絡。當與和絡。

錢二十七歲乙酉五月十八日

公丁香八分
桂枝尖三錢
半 夏三錢

小茴香炭二錢
降香末三錢

生薑二錢
烏藥二錢

歸鬚二錢
良薑一錢

八月十九日

此方服七帖後痛止。以二十帖神麴為丸。服過一料。六脈弦細而緊。臟氣之沉寒可知。食難用飽。稍飽則腹脹。食何物則噯何氣。間有胃痛時。皆腑陽之衰也。陽虛損症。與通補臟腑之陽法。大抵勞陽者十之八九。勞陰者十之二三。不然經何云勞者溫之。世人僉以六味八味治虛損。人命其何堪哉。暫戒猪肉介屬。

半 夏六錢

川椒炭三錢

白蔻仁三錢

益智仁四錢

小枳實二錢

良薑三錢

茯苓塊三錢

生薑五錢

丁香二錢

廣陳皮五錢

經謂必先歲氣。毋伐天和。今年陽明燥金。太乙天符。故用藥如右。他年溫熱宜減。

二十四日

前藥已服五帖。脈之緊無胃氣者和。痛處已止。頗能加餐。神氣亦旺。照前方減川椒一錢。丁香一錢。再服七帖。可定丸方。

三十日

前因脈中之陽氣已回。頗有活潑之神。恐剛燥太過。減去川椒。丁香各一錢。今日診脈。雖不似初診之脈緊。亦不是念四日之脈和肢涼。陽微不及四末之故。與前方內加桂枝五錢。再服七帖。

丸方

諸症向安。惟六脈尚弦。與通補脾胃兩陽。

茯苓塊八兩

小枳實二兩

生苡仁八兩

白蔻仁一兩

半夏八兩

於朮四兩

廣陳皮四兩

人參二兩

益智仁四兩

共為細末。神麴八兩。煎湯法丸。梧子大。每服三二錢。再服三服。自行斟酌。

備用方

陽虛之體質。如冬日畏寒。四肢冷。有陽微不及四末之象。服此方五七帖。以充陽氣。

白芍六錢

生薑五錢

炙甘草三錢

桂枝四錢

大棗三枚

膠糖一兩

煮兩杯。分二次服。

此方亦可加棉黃耆、人參、茯苓、白朮、廣橘皮。

病後六脈弦細而緊。絕少陽和之氣。形體羸瘦。幸喜胃旺。可以守補。與形不足者。補之以氣法。

白芍六錢

雲茯苓塊四錢

生薑三錢

桂枝四錢

人參三錢

大棗二枚

炙甘草三錢

桂圓肉三錢

譚
四十七
歲乙酉
八月二
十八日

陳十九歲

脈虛數。頭目眩冒。暮有微熱。飲食減少。面似桃花。身如柳葉。

炙黃耆四錢 膠糖一兩

炙甘草六錢 大麥冬五錢連心 生牡蠣五錢 乾地黃六錢

阿膠三錢 生龍甲八錢 生白芍六錢 麻仁三錢

李四十歲

服二十帖。紅退暈止。食進。後用專翕大生膏四斤收功。面赤舌絳。脈虛弦而數。聞婦聲則遺。令其移居大廟深處。

三甲復脈湯。

炙甘草 麻仁 生牡蠣 生白芍

阿膠 生龍甲 乾地黃 麥冬連心

生龜板

服四十帖。由漸而效。後以天根月窟膏一整料二十四斤收功。粉紅色。虛數脈。頭時暈。身微熱。心悸氣短不寐。食少。與補心腎之陰。

宗二十五歲

洋參 丹皮 蓮子連心 麥冬連心

丹參 地黃 五味子 雲苓塊

炒棗仁 冰糖
服五帖漸安。後以專翕大生。硃砂爲衣。一料收功。

吐血

王
脈弦如刃。吐血後左脅微痛。喉中如有物阻。治在肝絡。使血不瘀。則吐可止。止後當與補陰。

新絳紗三錢	歸鬚二錢	元胡索二錢	旋覆花三錢
炒桃仁三錢	降香末三錢	丹皮三錢	蘇子霜二錢
鬱金二錢			

又
如刃之脈已漸平減。但虛數如故。

新絳紗三錢	製香附錢半	焦白芍三錢	旋覆花三錢
丹皮 <small>炒五錢</small>	細生地三錢	降香末三錢	歸鬚二錢
廣鬱金二錢			

又
肝爲剛藏。勁氣初平。未便膩補。取鬆靈之解肝絡者宜之。

遼沙參三錢

細生地三錢

丹皮五錢

桑葉錢半

焦白芍六錢

整石斛三錢

白蒺藜三錢

麥冬五錢

生甘草一錢

廣鬱金二錢

歸鬚錢半

又

昨日仍有瘀血吐出。今尙未可呆補。

沙參三錢

細生地三錢

沙苑蒺藜二錢

桑葉錢半

丹皮五錢

茶菊花二錢

麥冬五錢

焦白芍三錢

釵石斛五錢

當歸錢半

生甘草一錢

羚羊片二錢

外另服新絳三錢。

普女
二十三歲

大凡吐血。左脈堅搏。治在下焦血分。右脈堅搏。治在上焦氣分。又有心血、肝血、大腸血、小腸血、胃血、衝脈血。各種不同。豈一概見血。投涼所可治哉。無怪乎室女童男。勞瘵乾血甚數。體厚色白。少腹痛。小便短赤。咳吐瘀紫。繼見鮮紅血。喉中鹹。此衝脈襲受寒邪。致經不得行。倒送而吐耳。大忌柔潤寒涼。議溫鎮衝脈。行至陰之瘀濁。使經得行而血症愈矣。苦辛通法。

小茴香二錢

兩頭尖二錢

桃仁三錢

降香末三錢

羅三十二歲

右脈浮洪。咳痰吐血。脣絳。治在上焦氣分。

韭白汁三茶匙 紫石英三錢 歸 鬚二錢 川棟子三錢

琥 珀三分
研細冲

桑 葉二錢 生苡仁五錢 杏 仁三錢 茯苓塊五錢

沙 參三錢 連 翹八分 生扁豆五錢

三帖。

初三日 血後咳不止。進食不香。右脈不浮而仍洪。兼與養陽明之陰。

桑 葉錢半 茯苓塊三錢 百 合二錢 生扁豆三錢

生苡仁三錢 玉 竹二錢 麥 冬二錢 沙 參三錢

甜杏仁二錢

初五日 諸症俱退。惟進食不旺。右脈大垂尺澤。先與甘寒養胃陰。

大麥冬六錢 桑 葉一錢 生扁豆三錢 玉 竹三錢

甜杏仁三錢 細生地三錢 秋梨汁一酒杯 沙 參三錢

初九日 甘潤養陰。

麥冬六錢

桑葉一錢

生扁豆三錢

甜杏仁二錢

大生地三錢

玉竹二錢

沙參三錢

柏子霜二錢

火麻仁二錢

白芍三錢

冰糖三錢

四帖。

六脈弦數。兩關獨浮。左更甚。右脅痛。胸中痞塞。肝鬱吐血。先理肝絡。

新絳紗三錢

廣鬱金二錢

旋覆花二錢

歸鬚二錢

降香末二錢

丹皮三錢

蘇子霜三錢

三帖。

細生地五錢

丹皮五錢

白芍四錢

甘草錢半

阿膠二錢

麻仁三錢

沙參二錢

天冬三錢

麥冬四錢

真雲連一錢

黃柏炭三錢

三七一錢

水八碗。煮取三杯。分三次服。

左脈仍弦細數鋒鋼如刃。吐血。左手脈堅搏。治在下焦血分。

細生地五錢

丹皮五錢

白芍四錢

甘草錢半

二十三日

乙丑三月十七日

伊二十四歲癸酉七月二十五日

霍石斛五錢

阿膠二錢

麻仁三錢

沙參三錢

天冬三錢

麥冬四錢

元參三錢

茯苓塊三錢

黃芩炭二錢

煮四杯分四次服。

脈數減弦剛甚。

二十六日

大生地五錢

炒白芍四錢

炙甘草錢半

丹皮五錢

阿膠二錢

麻仁二錢

洋參三錢

麥冬四錢

茯苓塊三錢

生牡蠣三錢

章

丙寅二月初九日

勞傷吐血脈雙弦。金匱謂大則為虛。弦則為減。虛弦相搏。其名曰革。男子失精亡血諸不足。小建中湯主之。

白芍六錢

桂枝四錢

炙甘草三錢

大棗二枚

生薑四錢

膠飴一兩去渣後入

水五碗。煮取兩碗。渣再煮一碗。分三次服。病輕者日一帖。重則日再作服。

章
丙寅二
月二十
四日

右脈空大。左脈弦。血後咳吐濁痰腥臭。真液不守。陰火上衝。尅金。非純補
純清之症。然而憊矣。

沙參二錢 麥冬三錢 生扁豆三錢 枇杷葉錢半

霜桑葉三錢 生阿膠三錢 甜杏仁二錢蜜炙去尖皮 白花百合二錢

五味子錢半 天門冬三錢

蘆石斛五錢。煎湯代水。濃煎兩杯。分二次服。

服少斂。痰咳亦減。切戒用心。

二十八
日

沙參三錢 麥冬三錢 天門冬三錢 百合三錢

生阿膠三錢 生牡蠣三錢 桑葉二錢 生白扁豆三錢

生西洋參錢半 五味子三錢

水五碗。煮取兩碗。渣再煮一杯。分三次服。日二帖。

脈大欬戢。古所謂脈小則病退是也。頗有起色。若得舌苔化去。則更妙矣。

沙參三錢 桑葉三錢 白扁豆三錢 麥冬三錢

洋參錢半 天門冬三錢 五味子三錢 蘆根汁五錢

梨汁一升
生苡仁五錢
四帖。

勞傷吐血。汗多足麻。六脈弦細不數。小建中湯主之。

白芍六錢
桂枝四錢
炙甘草三錢
生薑五錢

大棗三枚
膠飴一兩
去核後入

汗減足麻愈。食少加再服。

前藥已服十四帖。諸症皆愈。惟咳嗽未止。於前原方加雲苓半夏。

六脈弦數。勞傷吐血。建中湯主之。

白芍六錢
生薑汁三匙
桂枝三錢
大棗三枚

炙甘草三錢
膠飴一兩

加麥冬五錢
丹皮三錢

煮三杯。分三次服。四帖。

肝鬱脅痛。病名肝着。治在肝經之絡。經藥弗愈也。

新絳紗三錢
歸橫鬚二錢
吳萸一錢
旋覆花三錢

廣鬱金二錢

青皮三錢

蘇子霜三錢

廣皮炭二錢

降香末三錢

半夏三錢

煮三杯分三次服。

十五日

六脈弦勁。前用建中。現脈已和。左手仍勁。胸前咳甚則痛。間有一二日紫色之血。按肝脈絡胸。是肝絡中尚有瘀滯。且與宣絡。

新絳紗二錢

歸鬚二錢

廣皮炭二錢

旋覆花三錢

丹皮炭三錢

桃仁泥三錢

蘇子霜三錢

鬱金二錢

降香末三錢

薑半夏五錢

四帖。

二十一日

六脈弦數。以清氣在頭之故。受微風。右寸獨浮大而衄血。暫與清清道之風熱。

白茅根五錢

甜杏仁三錢

黑山梔一錢

桑葉三錢

側柏葉三錢

茶菊花三錢

鮮蘆根三錢

吳

周身癢不可當。脈洪。狂吐血。與大黃黃連瀉心湯。以後永不發。

七十歲

史

五十歲

吳

二十五歲

歲

壽

二十歲

乙酉十一月十日

二日

二十二日

十二月十五日

酒客大吐狂血盛盆。六脈數洪。面赤。三陽實火為病。與大黃黃連瀉心湯。

一帖而止。二帖脈平。後七日又復發。血如故。又二帖。

每日飽食就床。脾陽致困。因失其統血之職。此為傷食吐血。脈弦。與竈中

黃土。每日一斤。分二次煎服。將盡半月而愈。戒其夜食。永遠不發。

怒傷吐血。兩脅俱痛。六脈弦緊。誤補難愈。凡怒傷肝鬱。必有瘀血。故症現

脅痛。一以活肝絡為主。俟瘀血去淨。而後可以補虛。

新絳紗三錢

桃仁三錢

丹皮炭三錢

歸鬚三錢

降香末三錢

蘇子霜二錢

旋覆花三錢

廣鬱金二錢

煮三杯。分三次服。四帖。

復診脈之弦緊雖減。而未和緩。脅痛雖大減。而未淨除。與原方去桃仁。加

細生地五錢。

四帖。

六脈弦細而緊。金匱謂脈雙弦者寒也。弦則為減。男子失精亡血。小建中湯主之。怒傷吐血愈後。以小建中復陽生陰。

焦白芍六錢

生薑三錢

桂枝三錢

大棗二枚

炙甘草三錢

膠飴一兩入
後化入

初九日

加丹皮三錢

麥冬三錢

服八帖。

十八日

諸症全愈。胃口大開。虛未全復。於原方加麥冬二錢。使分佈津液於十二經臟。則虛從飲食中復矣。

金

三十日

肝鬱脅痛吐血。病名肝着。且有妊娠。一以宣肝絡為要。與新絳旋覆花湯法。切戒惱怒介屬。

新絳紗三錢

旋覆花包三錢

丹皮五錢

降香末三錢

歸鬚三錢

桃仁二錢

香附三錢

廣鬱金二錢

蘇子霜二錢

以脅痛止為度。

便血

毛
十二歲
癸亥十
二月初
二日

糞後便紅。責之小腸寒溼。不與糞前爲大腸熱溼同科。舉世業醫者。不知有此。無怪乎十數年不愈也。用古法黃土湯。

竈中黃土二兩

生地黄三錢

製蒼朮三錢

熟附子三錢

阿膠三錢

黃芩二錢

炙甘草三錢

加酒炒白芍

全歸錢半

水八碗。煮成三碗。分三次服。

初七日

小兒脈當數而反緩。糞後便血。前用黃土湯。業已見效。仍照前法加剛藥。即於前方內去白芍。全當歸。加

附子一錢

蒼朮二錢

孫男

湖州孝廉其人。素有便紅之症。自十八歲起至今不絕。現面色痿黃。失血太多。急宜用古法。有病則病受。雖暑月無礙也。

方法分兩同前。服一帖即止。次日停後服。半月復發。再服一帖全愈。

福

初因恣飲冰振黃酒。冰浸水果。又受外風。致成風水。頭面與身腫大難狀。腫起自頭。先與越婢湯發其汗。頭面腫消。繼與利小便。下截三消脹減。後

二十九歲

與調理脾胃。自上年十月間服藥。至次年三月方止。共計湯一百四十三帖。其病始安。囑其戒酒肉生冷。不意夏月暑熱甚時。仍恣吃冰冷水果。自八月後糞後大下狂血。每次有升數之多。余用黃土湯去柔藥。加剛藥。每劑黃土用一斤。附子用六錢。或止復來。伊本人見其血之不止也。加附子至八錢。或一兩。他藥接是。服至九十餘帖。始大愈。本係酒客。溼中生熱。久而發黃。顏色暗滯。六脈俱弦。其來也漸。此非陽黃。况糞後見紅。非又為小腸寒濕乎。

胡
三十歲
乙酉年
九月十
七日

竈中黃土八兩代煎 熟附子三錢 茵陳五錢 蒼朮炭三錢
黃柏三錢炒 猪苓三錢 澤瀉三錢 雲茯苓三錢

煮三杯。分三次服。五帖全愈。

陳
三十五歲
乙酉年
四月二
十一日

糞後便紅。寒溼為病。誤補誤涼。胃口傷殘。氣從溺管而出。若女子陰吹之屬。瘕氣者然。左脅肝部。臥不着席。得油膩則寒戰發雜無倫。幾於無處下手。議治病必求其本。仍從寒溼診治。令能安食再商。與黃土湯中去柔藥。加剛藥。

川椒炭三錢

廣陳皮三錢

生薑二錢

竈中黃土四兩

雲茯苓五錢

生茅朮三錢

香附三錢

熟附子三錢

益智仁三錢

煮三杯。分三次服。服三帖。

五月初二日。又服二帖。

初三日

心悸短氣。加小枳實四錢。乾薑二錢。已服四帖。

十一日

去川椒三錢。已服三帖。

二十一日

諸症皆效。大勢未退。左脈緊甚。加附子一錢。降香末三錢。乾薑一錢。已服

三帖。

二十七日

諸症向安。惟糞後便血又發。與黃土湯法。糞後便血。乃小腸寒溼。不與糞

前為大腸熱溼同科。

竈中黃土

八兩

廣皮炭三錢

熟附子四錢

益智仁二錢

黃芩炭四錢

雲茯苓五錢

蒼朮四錢

煮三杯。分三次服。以血不來為度。

七月十四日

面色青黃滯暗。六脈弦細無陽。胃口不振。暫與和胃。其黃土湯。俟便紅發時再服。

薑半夏六錢

雲苓塊五錢

廣陳皮三錢

生苡仁五錢

益智仁三錢

川椒炭一錢

白蔻仁一錢

煮三杯。分三次服。

十七日

加桂枝五錢

十一月十五日

肝鬱挾痰飲。寒溼為病。前與黃土湯。治糞後便血之寒溼。茲便紅已止。繼與通補胃陽。現在飲食大進。諸證漸安。惟六脈細弦。右手有胃氣。左手弦緊。痰多畏寒。脅下仍有伏飲。與通補胃陽。兼逐痰飲。

桂枝六錢

小枳實三錢

川椒炭三錢

旋覆花三錢

香附四錢

廣皮五錢

炒白芍三錢

乾薑三錢

雲苓五錢

薑半夏八錢

煮三杯。分三次服。

十二月初十日

脈弦緊痰多畏寒。衝氣上動。與桂枝茯苓甘草湯。合桂枝加桂湯法。

桂枝一兩 茯苓塊二兩 炙甘草五錢 全當歸三錢

川芎二錢 芍藥五錢 桂枝去粗皮

服一帖。衝氣已止。當服藥後。吐頑痰二口。

十一日 衝氣已止。六脈緊退。而弦未除。可將初十日方。再服半帖。以後再服二十

九日。改定方。以不畏寒為度。

十三日 服十一月十五日疎肝藥二帖。

十四日 背畏寒。脈仍弦緊。再服十二月初十日桂枝加桂湯二帖。以峻補衝陽。服

藥後吐頑痰二口。

十七日 脈仍弦緊。背猶畏寒。陽未全復。照原方再服二帖。分四日服。

十九日 前之畏寒。至今雖減。而未全愈。脈之弦緊。亦未冲和。衝氣微有上動之象。

可取初十日桂枝加桂湯法。再服二帖。分四日。立春以後故也。

六脈俱弦。左脈更緊。糞後便紅。小腸寒溼。黃土湯為主方。議黃土湯去柔

日 丙午正月初五日 藥。加淡滲通陽。雖自覺胸中熱。背心如熱水澆。所云熱非熱也。况又惡寒

乎。

竈中黃土八兩

生苡米五錢

雲苓塊六錢

熟附子四錢

蒼朮炭四錢

桂枝五錢

黃芩炭四錢

廣皮炭四錢

煮四碗。分四次服。血多則多服。萬一血來甚湧。附子加至八錢。以血止爲度。再發再服。切勿聽淺學者妄轉一方也。

丸方

陽虛脈弦。素有寒溼痰飲。與蠲飲丸方。通陽滲溼而補脾陽。

桂枝八兩

蒼朮炭四兩

生苡仁八兩

雲苓塊八兩

乾薑炭四兩

炙甘草三兩

益智仁四兩

半夏八兩

廣皮六兩

神麴糊丸。小梧子大。每服三錢。日三服。忌生冷猪肉介屬。

初十日

糞後便紅雖止。寒溼未盡。脈之緊者亦減。當退剛藥。背惡寒未罷。行溼之中。兼與調和營衛。

蒼朮炭三錢

黃芩炭錢半

竈中黃土一兩

焦白芍四錢

生苡仁三錢

陳三十二歲甲寅
年二月初四日

煮三杯。分三次服。以背不惡寒爲度。戒生冷介屬猪肉。

腫脹

太陰所至。發爲臌脹者。脾主散津液。脾病不能散津。土日敦阜。斯臌脹矣。厥陰所至。發爲臌脹者。肝主疏泄。肝病不能疏泄。木穿土位。亦臌脹矣。此症起於肝經鬱勃。從頭面腫起。腹因脹大。的係蠱脹。而非水腫。何以知之。滿腹青筋暴起如蟲紋。並非本身筋骨之筋。故知之。治法行太陽之陽。泄厥陰之陰。爲要。醫用八味丸誤治。反攝少陰之陰。又加牡蠣潛陰戀陽。使陽不得行。而陰凝日甚。六脈沉弦而細。耳無所聞。目無所見。口中血塊累累續出。經所謂血脈凝泣者是也。勢太危極。不敢驟然用藥。思至陽而極靈者。莫如龍。非龍不足以行水。而聞介屬之翕。惟鯉魚三十六鱗能化龍。孫真人曾用之矣。但孫真人千金原方去鱗甲用醋煮。茲改用活鯉魚大者一尾。得六斤不去鱗甲。不破肚。加葱一斤。薑一斤。水煮熟透。加醋一斤。任服之。

服鯉魚湯一晝夜。耳聞如舊。目視如舊。口中血塊全無。神氣清爽。但腫脹未除。

初五日

經謂病始於下而盛於上者。先治其下。後治其上。病始於上而盛於下者。先治其上。後治其下。此病始於上腫。當發其汗。與金匱麻黃附子甘草湯。

麻黃去節 黃二兩

熟附子一兩六錢 炙甘草一兩二錢

煮成五飯碗。先服半碗。得汗。止後服。不汗再服。以得汗爲度。

此方甫立。未分量。陳頌箒先生一見云。斷然無效。予問曰。何以不效。陳先生云。吾曾用來。予曰。此在先生用。誠然不效。予用或可效耳。王先生名謨忘其字云。吾甚不解。同一方也。藥止三味。並無增減。何以爲吳用則利。陳用則否。豈無知之草木。獨聽吾兄使令哉。予曰。蓋有故也。陳先生性情忠厚。其膽最小。伊恐麻黃發陽。必用八分。附子護陽。用至一錢。以監制。又恐麻黃附子。皆慄悍藥也。甘草平緩。遂用一錢二分。又監制麻黃附子。服一帖無汗。改用八味丸矣。八味陰柔藥多。乃敢大用。如何能效。病者乃兄陳蔭山先生入內室。取二十八日陳頌箒所用原方分量。一毫不差。在座者六

七人皆譁然笑曰。何先生之神也。予曰。余常與頌箒先生一同醫病。故知之深矣。於是麻黃去淨。節用二兩。附子大者一枚。得一兩六錢。少麻黃四錢。讓麻黃出頭。甘草一兩二錢。又少附子四錢。讓麻黃附子出頭。甘草但鎮中州而已。衆見分量。又大譁曰。麻黃可如是用乎。頌箒先生云。不妨。如有過差。吾敢當之。衆云。君用八分。未敢足錢。反敢保二兩之多乎。頌箒云。吾在鞠溪先生處。治產後鬱冒。用當歸二錢。吳君痛責。謂當歸血中氣藥。最能竄陽。產後陰虛陽越。例在禁條。豈可用乎。夫麻黃之去當歸。奚啻千百。吾用當歸。伊責之甚。豈伊用麻黃。又如是多。竟無定見乎。予曰。人之畏麻黃如虎者。爲其能大汗亡陽。未有汗不出而陽亡於內者。湯雖多。但服一杯。或半杯。得汗卽止。不汗再服。不可使汗淋漓。何畏其亡陽哉。但此症閉錮已久。陰霾太重。雖盡劑。未必有汗。予明日再來發汗。病家始敢買藥。而仙芝堂藥鋪竟不賣。謂想是錢字。先生誤寫兩字。主人親自去買。方得藥。服盡劑。竟無汗。

初六日

衆人見汗不出。僉謂汗不出者死。此症不可爲矣。余曰不然。若竟死症。鯉

魚湯不見效矣。予化裁仲景先師桂枝湯。用粥發胃家汗法。竟用原方分量一帖。再備用一帖。又用活鯉魚一尾。得重四斤。煮如前法。服麻黃湯一飯碗。即接服鯉魚湯一碗。汗至眉上。又一次。汗至上眼皮。又一次。汗出下眼皮。又一次。汗至鼻。又一次。汗至上脣。大約每一次。汗出三寸許。二帖俱服完。鯉魚湯一鍋。喝一晝夜。亦服盡。汗至伏兔而已。未過膝也。臍以上腫俱消。腹仍大。

初七日

經謂汗出不止足者死。此症尙未全活。雖腰以上腫消。而腹仍大。腰以下其腫如故。因用腰以下腫。當利小便例。與五苓散。服至二十一日。共十五天不效。病亦不增不減。陳蔭山先生云。前用麻黃。其效如神。茲小便滴不下。奈何。祈轉方。予曰。病之所以不效者。藥不精良耳。今日先生去求好肉桂。若仍係前所用之桂。明日予不能立方。固無可轉也。

二十二日

陳蔭山購得新鮮紫油邊青花桂一枝。重八錢。乞予視之。予曰。得此桂必有小便。但恐脫耳。膀胱爲州都之官。氣化則能出焉。氣虛亦不能化。於是用五苓二兩。加桂四錢。頂高遼參三錢。服之盡劑。病者所睡係棕床。予囑

洪氏
六十八
歲

備大盆二三枚。置之床下。溺完被溼不可動。俟明日予親視擲床。其溺自予正始通。至卯正方完。共得溺大盆有半。予辰正至其家。視其週身如空布袋。又如腐皮。於是用調理脾胃全愈。

孀居三十餘年。體厚憂鬱太多。肝經鬱勃久矣。又因暴怒重憂。致成厥陰太陰兩經膜脹並發。水不得行。腫從跗起。先與腰以下腫。當利小便例之五苓散法。但陰氣太重。六脈沈細如絲。斷非輕劑所能了。

桂枝五錢

生蒼朮五錢

猪苓五錢

澤瀉五錢

茯苓皮六錢

肉桂四錢

廣皮五錢

厚樸四錢

前方服三五帖不效。亦無壞處。小便總不見長。肉桂加至二三兩。桂枝加至四五兩。他藥稱是。每劑近一斤之多。作五六碗。服五七帖後。六脈絲毫不起。腫不消。便亦不長。所以然之故。肉桂不佳。陰氣太重。憂鬱多年。暴怒傷肝。必有陳菟。仍用原方加雞矢醴熬淨烟六錢。又加附子八錢。服之小便稍通。一連七帖。腫漸消。飲食漸進。形色漸喜。於是漸減前方分量。服至十四帖。腫脹全消。後以補脾陽疎肝鬱收功。

郭氏
六十二歲

先是郭氏喪夫於二百里外其祖墓之側。郭攜子奔喪。饑不欲食。寒不欲衣。悲痛太過。葬後廬墓百日。席地而臥。哭泣不休。食少衣薄。回家後致成單腹脹。六脈弦。無胃氣。氣喘不能食。脣舌刮白。面色淡黃。身體羸瘦。余思無情之草木。不能治有情之病。必得開其愚蒙。使情志暢遂。方可冀見效於萬一。因問曰。汝之痛心疾首。十倍於常人者何故。伊答曰。夫死不可復生。所遺二子。恐難成立耳。余曰。汝何不明之甚也。大凡婦人夫死。曰未亡人。言將待死也。汝如思夫愈切。即死墓側。得遂同穴之情。則亦已矣。雖有病何必醫。醫者求其更甦也。其所以不死者。仍係相夫之事業也。汝子之父已死。汝子已失其蔭。汝再死。汝子豈不更無所賴乎。汝之死。汝之病。不惟無益於夫。而反重害其子。害其子。不惟無益於子。而且大失夫心。汝此刻欲盡婦人之道。必體亡夫之心。盡教子之職。汝必不可死也。不可死。且不可病。不可病。必得開懷暢遂。而後可愈。單腹脹。死症也。脈無胃氣。死脈也。以死症而見死脈。必得心火旺。折泄肝鬱之陰氣。而後血脈通。血脈通。臟氣遂。死證亦有可生之道。詩云。見睟曰消者是也。伊聞余言大笑。余曰。

吳氏
二十八歲

笑則生矣。伊云。自此以後。吾不惟不哭。並不敢憂思。一味以喜樂從事。但求得生。以育吾兒而已。余曰。汝自欲生則生矣。於是爲之立開鬱方。十數劑而收全功。

旋覆花三錢新絳紗包

降香末三錢

歸鬚二錢

蘇子霜三錢

鬱金三錢

香附三錢

川厚樸三錢

薑半夏四錢

廣皮三錢

青橘皮二錢

春夏間乘舟。由南而北。途間溫毒愈後。感受風濕。內脹外腫。又有肝鬱之過。時當季夏。左手勞宮穴。忽起勞宮毒。如桃大。此症治熱礙溼。治濕礙熱之弊。選用幼科痘後餘毒歸肺。喘促咳逆之實脾利水法。加極苦合爲苦淡法。俾熱毒由小腸下入膀胱。隨溼熱一齊泄出也。蓋勞宮毒屬心火。瀉心者必泄小腸。小腸火府。非苦不通。腰以下腫。當利小便。利小便者。亦用苦淡也。

猪苓一兩

茯苓皮一兩

白通草三錢

澤瀉一兩

晚蠶砂二兩

雅連四錢

黃柏四錢

飛滑石四錢

黃芩四錢

煮成五碗。分五次服。以小便長者為度。此方服七帖。分量不增減。腫脹與勞宮毒俱消。以後補脾收功。

脈弦細而緊。不知饑。內脹外腫。小便不利。與腰以下腫。當利小便法。陽欲滅絕。重加熱以通陽。况今年燥金太乙天符。經謂必先歲氣。毋伐天和。

桂枝六錢

猪苓五錢

生茅朮三錢

澤瀉五錢

廣橘皮三錢

川椒炭五錢

厚樸四錢

茯苓皮六錢

公丁香二錢

杉木皮一兩

煮四杯。分四次服。

二十五日

諸症皆效。知饑。腫脹消其大半。惟少腹有疰。竟如有一根筋吊痛。於原方內減丁香一錢。加小茴香三錢。

腫脹六年之久。時發時止。由於肝鬱。應照厥陰膜脹例治。

單氏四十二歲

降香末三錢

木通二錢

香附三錢

旋覆花三錢

歸鬚三錢

鬱金二錢

青皮二錢

厚樸三錢

二十六日

大腹皮三錢 雲苓六錢 半夏四錢
煮成三杯。分三次服。不能寬懷消怒。不必服藥。
服前方八帖。腫脹稍退。惟陽脈微弱。加以椒炭三錢。大便不通。加兩頭尖三錢。去陳莢。

單腹脹

毛四十四歲

病起肝鬱。木鬱則剋土。剋陽土則不寐。剋陰土則腹脹。自鬱則脅痛。肝主疎泄。肝病則不能疎泄。故二便亦不宣通。肝主血。絡亦主血。故治肝者必治絡。

新絳紗三錢

半夏八錢

香附三錢

旋覆花三錢

青皮三錢

小茴香三錢

歸鬚三錢

降香末三錢

廣鬱金三錢

蘇子霜三錢

頭煎兩杯。二煎一杯。分三次服。三帖。

初七日 服肝絡藥。脹滿脅痛不寐少減。惟覺胸痛。按肝脈絡胸。亦是肝鬱之故。再

小便赤濁。氣溼也。

桂枝嫩尖三錢

晚蠶砂三錢

歸鬚二錢

川棟子三錢

半夏六錢

降香末三錢

白通草三錢

青橘皮三錢

茯苓皮三錢

旋覆花三錢
絳紗包新

小茴香三錢
炒黑

兩頭尖三錢

服二帖。

初十日

驅濁陰而和陽明。現在得寐。小便少清。但肝鬱必剋土。陰土鬱則脹。陽土鬱則食少而無以生陽。故清陽虛而成胸痺。暫與開痺。

薤白頭三錢

半夏一兩

廣鬱金三錢

括蕒實三錢
皮仁研

生苡仁五錢

桂枝尖五錢

茯苓皮五錢

厚樸三錢

小枳實二錢

服三帖。

十四日

脈緩。太陽已開。而小便清通。陽明已闔。而得寐能食。但腹脹不除。病起肝鬱。與行溼之中。必兼開鬱。

降香末三錢

生苡仁五錢

白通草八錢

厚樸三錢

徐三十歲

煨肉果錢半 茯苓皮五錢 半 夏五錢
腹脹且痛。脈弦細。大便泄。小便短。身不熱。此屬寒溼。傷足太陰。

猪苓三錢 黃芩炭一錢 澤瀉三錢 桂枝三錢

厚樸三錢 廣皮二錢 乾薑錢半 生苡仁五錢

通草二錢

滯下

俗名痢疾。又曰積。紅色屬熱。屬血。白色屬寒。屬氣。

丁氏五十歲

滯下白積。欲便先痛。便後痛減。責之積重。脈遲而弦。甚痛。蓋冷積也。非溫下不可。

熟附子片五錢 廣木香三錢 小枳實三錢 生大黃片五錢

廣陳皮五錢 南查肉三錢 厚樸五錢 炒白芍三錢

良薑炭二錢 黃芩炭三錢 堅檳榔三錢

滯下白積。欲便先痛。便後痛減者。責之有積。用溫下法。

炒白芍二錢 廣皮二錢 枳實錢半 黃芩二錢

梁二十八歲

木香一錢

檳榔錢半

雲連炒一錢

錦紋軍酒炒黑

厚樸三錢

熟附子三錢

五杯水。煮成兩杯。分二次服。

先泄而後滯下。脾傳腎。為難治。

大白芍二錢

真雅連錢二分
吳萸炒

黃芩炭二分

生茅朮三錢

猪苓三錢

澤瀉三錢

生苡仁二錢

廣木香錢半

老厚樸二錢

川椒目五錢

夏薑二錢

廣皮錢半

水六杯。煮取二杯。渣後再煎一杯。三次服。

先泄後滯下。古云難治。非一時可了。且喜脈弱。尚有生機。

白芍三錢

南檳榔錢半

木香錢半

當歸尾一錢

地榆炭三錢

廣陳皮二錢

小枳實搗碎

紅花二錢

煎法如前。

二十三
日。脈沉有力。滯下。脹痛太甚。便後少減。片時其痛仍然。議網開一面。用溫下法。

白芍三錢酒炒

黃芩三錢酒炒

真山連二錢酒炒黃

大黃五錢酒炒

枳實三錢

厚樸三錢

廣木香二錢

安邊桂二錢去粗皮

廣皮炭二錢

紅花二錢

歸尾錢半

水五杯。煮成三杯。分三次服。一帖。

日二十三 於二十日方內加

兩頭尖三錢

日二十四 腎症復歸於脾。用四苓合苓芍湯法。

猪苓五錢

澤瀉五錢

生苡仁五錢

茯苓皮五錢

焦白芍二錢

黃芩錢半

廣木香錢半

生白朮五錢

廣陳皮錢半

厚樸二錢

真山連錢半

水八杯。煮取三杯。分三次服。

日二十五 於前方內加

白通草二錢

日二十六 肝鬱則小便亦不能通。此徒用四苓不效。議開陰絡法。

降香末三錢

麝香五厘冲

桃仁三錢

歸鬚二錢

琥珀三分冲

猪苓三錢

兩頭尖一錢

澤瀉三錢

小茴香三錢

川棟子三錢

日二十七 已效。於前方內加

安邊桂三分

生香附三錢

鬱金六錢

日二十八 九竅不和。皆屬胃病。用開太陽。闔陽明。兼瀉心法。

半夏六錢

青皮二錢

廣陳皮二錢

茯苓連皮三錢

猪苓三錢

澤瀉三錢

黃芩二錢

生苡仁三錢

厚樸一錢薑汁炒

乾薑二錢

炒山連錢半

廣木香一錢

水五杯。煮成二杯。再煮一杯。三次服。

日二十九 開太陽。闔陽明。兼去濕中之熱。

半夏六錢

茯苓皮三錢

生苡仁三錢

廣皮二錢

白芍二錢

白通草二錢

廣木香一錢

茯苓三錢

澤瀉三錢

黃芩炭二錢

真山連錢半

草薢二錢

三十日 糞後便血。加黃土湯法。

半夏五錢

廣木香一錢

竈中黃土六錢

黃芩炭二錢

草薢三錢

炒白芍三錢

茯苓皮三錢

廣皮二錢

全當歸錢半

老厚朴二錢

炒蒼朮三錢

水五杯。煮取二杯。渣再煮一杯。分三次服。

初一日 舌絳甚。胸中嘈雜無奈。喉且痛。糞中猶帶血跡。議酸苦泄熱法。

烏梅九枚

竈中黃土八錢

黃芩二錢

初二日 四苓合苓芍法。以小便短。口糜。猶有滯下也。

炒白芍二錢

半夏三錢

真山連錢半

澤瀉三錢

炒黃芩錢半

猪苓三錢

烏梅肉三錢

茯苓皮三錢

赤苓炭錢半

當歸一錢

竈中黃土三錢

頭煎一杯。二煎一杯。分三次服。

初三日 少腹脹痛。不小便。仍係肝鬱。不主疏泄之故。

真雲連二錢

黃芩炭二錢

桃仁泥三錢

生香附三錢

初四日 於前方內加

韭白汁三滴 兩頭尖三錢 降香末三錢 麝香末五厘
小茴香三錢 炒黑 歸鬚二錢 琥珀末五分 同冲

廣鬱金二錢

初五日

苦辛淡。開下焦溼熱。兼瀉肝火法。

草薢五錢 雲連二錢 炒黑 小茴香三錢 炒黑 白通草二錢

川棟子三錢 吳萸錢半 炒黑 黃蘗炭二錢 生香附三錢

小兒滯下紅積。欲便先痛。便後痛減。積滯太重。非溫下不可為功。恐纏綿日久。幼孩力不能勝。滯下為臍病也。

焦白芍錢半 炒 黃芩錢半 雲連一錢 炒黑 神麴錢半

生大黃二錢 老厚朴錢半 廣木香八分 廣皮七分

枳殼六分 桃仁八分 南檳榔八分 歸尾一錢

地榆炭一錢 肉桂八分

即於前方內去大黃、肉桂。方中再去歸尾、地榆、桃仁。加蒼朮一錢五分。

積聚

張二十七歲甲子三月十三日

臍右有積氣。以故右脈沈細弦伏。陽微之極。濁陰太甚克之也。溯其初原。從左脅注痛而起。其為肝着之咳無疑。此症不必治咳。但宣通肝之陰絡。久病在絡故也。使濁陰得有出路。病可自己。所謂治病必求其本者也。如不識綱領而妄冀速愈。必致剝削陽氣殆盡而亡。

桂枝尖三錢

小茴香三錢

降香末二錢

桃仁三錢

川棟子二錢

青皮絡二錢

炒廣皮一錢

歸鬚三錢

烏藥三錢

蘇子霜三錢

旋覆花三錢新絳紗包

十九日

服通絡藥已見小效。脈氣大為回轉。但右脅着席則咳甚。脅下支飲故也。議於前方內去桃仁、川棟、小茴。加

生香附三錢

半夏六錢

杏仁三錢

肉桂八分

再服四帖。

二十三日

先痛後便而見血。議通陰絡法。

蘇子霜三錢

歸鬚二錢

降香末三錢

桃仁二錢

兩頭尖三錢

丹皮三錢

藏紅花一錢

半夏五錢

小茴香三錢

香附二錢

廣木香一錢

廣陳皮一錢

臍左癥瘕。面黃。肢倦。食少。不能作文。看書亦不能久。宛如虛損。與

化癥回生丹

張二十八歲

緩緩通絡法。每日空心服一丸。亦有早晚服一丸。時服之。二年有餘。計服化癥回生丹六百丸之多。癥始化淨。氣體復原。看書作文。始舉進士。

吳三十一歲

臍右結癥。逕廣五寸。畢如鵝卵大。以受重涼。又加暴怒而得。痛不可忍。不能立。不能坐。並不能臥。服辛香流氣飲。三日服五帖。重加附子肉桂。至五七錢之多。絲毫無效。因服天台烏藥散。初服二錢。滿腹如火燒。明知藥至臍右患處。如搏物然。痛加十倍。少時腹中起痞。無數。凡一痞。下濁氣一次。如是者二三十次。腹中痛楚。鬆快。少時痛又大作。服藥如前。腹中熱痛。起痞。下濁氣亦如前。但少輕耳。自己初服藥起。至亥正共服五次。每次輕一等。次日腹微痛。再服烏藥散。則腹中不知熱矣。以後每日服二三

葉四十五歲乙酉四月二十八日
六月初九日

次。七日後腫痛全消。後以習射助陽而體壯。無論癰瘰。雖有氣血之分。然皆係陰病結於陰部。豈有用陰藥之理。維日已久沈寒痼冷疾。非巴豆不能除根。用

天台烏藥散

業已見效。未能除根。照常服前藥。早晚各五分。癰瘰痛發時服二錢。舌苔厚白。面色淡黃而暗。左脈沈細陽微。再與湯藥行經通陽。

雲茯苓塊五錢

益智仁錢半

草薢四錢

白蔻仁連皮一錢

生苡仁五錢

半夏五錢

廣陳皮二錢

桂枝二錢

白通草一錢

服至舌苔退為度。

十年瘕氣。六脈弦細而緊。

淡吳萸三錢

烏藥三錢

川椒炭五錢

歸身二錢

夏薑二錢

小茴香炒黑錢

煮三杯。分三次服。已服五帖。

廿二十九歲乙酉年五月初一日

初九日

病減者減其製。每日服半帖。

王氏

四十歲

六脈弦緊。心下伏梁。非易化之症。一生憂泣。肝之鬱也。又當燥金太乙天

乙酉五月二十

一日

降香末三錢

川椒炭二錢

香附三錢

半夏三錢

枳實三錢

歸鬚三錢

公丁香八分

廣皮

服四帖。

二十五日

諸症皆效。自覺氣上阻咽。加

旋覆花五錢

效不更方。再服。

加吳萸三錢

余氏

三十歲

乙酉五月二十

四日

瘕結臍左。經來必痛。六脈沉細。陽微。

吳茱萸三錢

川棟子三錢

公丁香一錢

良薑二錢

全當歸三錢

降香末三錢

小茴香三錢

艾炭三錢

煮三杯。分三次服。服七帖後。接服丸藥。

六月初
二日
二十日

車
五十五
歲

業已見效。每日服半帖。再服十天。
每行經前三日。腹微痛時。空心服化癥回生丹一丸。服至經盡後。腹中絲
毫不痛爲止。下月經行。腹痛發時。再如此服法。癥瘕痛亦服回生。空心服
一丸。化淨爲度。

鬚髮已白大半。臍左堅大如盤。隱隱微痛。不大便十數日。先延外科治之。
外科謂腸癰。以大承氣下之。三四次終不通。延余診視。按之堅冷如石。面
色青黃。脈短澹而遲。先尙能食。屢下之後。糜粥不進。不大便已四十九日。
余曰。此癥也。金氣之所結也。以肝木抑鬱。又感秋金燥氣。邪中入裏。久而
結成。愈久愈堅。非下不可。然寒下非其治也。以天台烏藥散二錢。加巴豆
一分。薑湯和服。設三服以待之。如不通。第二次加巴豆霜分半。再不通。第
三次加巴豆霜二分。服三次後。始下黑亮球四十九枚。堅莫能破。繼以苦
溫甘辛之法調理。漸次能食。又十五日不大便。余如前法。下至第二次而
通。下黑亮球十五枚。雖亦堅結。然破之能碎。但燥極耳。外以香油熬川椒
熨其堅處。內服芳香透絡。月餘化淨。於此證方知燥金之氣傷人如此。而

溫下之法。斷不容紊也。

乙酉年

治通廷尉久疝不愈。時六十八歲。先是通廷外任時。每發疝。醫者必用人參。故留邪在久不得愈。至乙丑季夏。受涼復發。堅結肛門。坐臥不得。脹痛不可忍。汗如雨下。七日不大便。余曰。疝本寒邪。凡堅結牢固。皆屬金象。況現在勢甚危急。非溫下不可。亦用天台烏藥散一錢。巴豆霜分許。下至三次。始通。通後痛漸定。調以倭硫黃丸。兼用金匱蜘蛛散。漸次化淨。

淋濁

便泄帶血。既有膀胱之溼。又有小腸之熱。用導赤合四苓湯法。

郎五十六歲

猪苓三錢

茯苓皮五錢

草薢五錢

澤瀉三錢

次生地五錢

甘草梢一錢

淡竹葉二錢

木通三錢

飛滑石五錢

少腹痛。於前方內加。

十二月
初一日

川棟子三錢

小茴香炭三錢

王 溼土司天。溼熱下注。致成淋症。莖腫。

十七歲

草 薢 三錢

白通草 一錢

甘草梢 三錢

茯苓皮 五錢

滑 石 二錢

生苡仁 五錢

車前子 二錢

澤 瀉 三錢

蘆 根 三錢

十五日

於前方內加

黃柏炭 三錢

龔 五十八歲

先是大小便俱閉。自用大黃八錢。大便雖通而小便點滴全無。續用五苓。仍不通。診其六脈弦緊。病因肝鬱而成。開陰絡法。

降香末 三錢

歸 鬚 三錢

兩頭尖 三錢

琥 珀 三分

丹 皮 三錢

韭白汁 三匙

麝 香 五厘

一帖而通。二帖而暢。

普 三十八歲

小便淋濁。莖管痛不可忍。自用五苓八正草薢分清飲等滲溼。愈利愈痛。細詢病情。由房事不遂而成。余曰。溺管與精管異途。此症當治精管為是。用虎杖散法。現無虎杖草。以杜牛膝代之。

杜牛膝五錢

歸 鬚三錢

降香末三錢

麝 香五厘

桃仁泥三錢

兩頭尖三錢

琥 珀六分

丹 皮三錢

一帖而痛減。五帖而痛止。七帖而濁淨。後以補奇經而愈。

血淋太多。先與導赤。赤不應。繼以脈弦。細詢由怒鬱而起。轉方與活肝絡。

珍 四十五歲

新絳紗三錢

蘇子霜一錢

丹皮炭五錢

旋覆花三錢

桃 仁三錢

紅 花二錢

片薑黃三錢

香 附三錢

歸 鬚三錢

鬱 金二錢

降香末三錢

四帖而安。

小便狂血。脈弦數。病因肝鬱。

王 四十五歲

新絳紗三錢

細生地五錢

青 皮二錢

旋覆花三錢

丹皮炭五錢

桃 仁三錢

降香末三錢

香 附三錢

歸 鬚三錢

范

服四帖而血止。止後兩月。又因生氣而發。仍與前方七帖而愈。因怒鬱而大小便閉。與極苦而通小腸。借火腑通膽腑法。

二十八歲

黃芩三錢

歸鬚三錢

桃仁泥三錢

胡黃連三錢

龍膽草三錢

廣鬱金二錢

二帖而大小皆通。

保女十八歲

怒鬱。少腹脹大如斗。小便點滴全無。已三日矣。急不可耐。仰臥不能轉側起立。與開經絡。

降香末三錢

香附米三錢

廣鬱金二錢

龍膽草三錢

青皮二錢

韭白汁三匙

歸鬚三錢

琥珀五分

兩頭尖三錢

麝香五厘

一帖而通。二帖而暢。

保五歲

夏日痘後受暑。小便不通。脈洪數。玉莖腫亮。蜷曲如勾。與涼利勝胱。

白通草錢半

蠶砂三錢

滑石六錢

雲苓皮五錢

苡仁五錢

杏仁三錢

一帖而通。三帖而玉莖復元。

葉

金實無聲。六脈俱弦。痰飲兼之溼痺。小便白濁。先與行溼。

四十五歲
乙酉年七月初一日

伏苓皮五錢 川草薢五錢 通草一錢 桂枝五錢
防己三錢 蠶砂五錢 半夏五錢 杏仁泥四錢
生苡仁五錢 甘草一錢 滑石六錢
服七帖。

十四日

復診加

猪苓三錢 澤瀉三錢

九月初三日

伏飲溼痺便濁。前與淡滲通陽。已服三十帖。因停藥二十餘日。現在飲又上泛。胸滿短氣。腰酸淋濁未除。且與行心下之飲。脈弦細。陽不復。

薑半夏五錢 杏仁四錢 雲苓皮五錢 廣陳皮三錢

防己四錢 桂枝三錢 枳實四錢 草薢五錢

通草錢半 晚蠶砂三錢

十二日

服九帖。

去杏仁防己。加薏苡五錢

十月初五日

又服三十餘帖。

痰飲痺症淋濁皆寒溼為病。誤與補陰。以至溼邪膠痼沉着。急難清楚。前與開痺和胃現今雖見效不少。究竟溼邪為患。陰柔之邪。久為呆補所困。難以旦夕奏功也。

桂枝四錢

川草薢五錢

澤瀉三錢

薑半夏六錢

滑石六錢

雲苓皮五錢

廣皮五錢

蠶砂三錢

車前子三錢

枳實三錢

猪苓三錢

生苡仁五錢

煮三杯。分三次服。

十月二十五日

溼濁誤補久留。與開太陽闔陽明法。數十帖之多。雖見大效。究未清楚。小便仍間有濁時。腿仍微有酸痛。

薑半夏一兩

桂枝四錢

片薑黃二錢

廣陳皮五錢

通草一錢

川草薢五錢

晚蠶砂三錢

川椒炭三錢

生苡仁五錢

防己三錢

猪苓三錢

小枳實二錢

茯苓皮五錢

十一月十八日

痺症挾痰飲。小便濁。喉啞。先開上焦。後行中下之溼。餘有原案。

苦桔梗 五錢

甘草 三錢

杏仁 五錢

半夏 一兩

雲苓皮 五錢

生苡仁 五錢

喉啞服此。

備用方

桂枝 四錢

廣皮 三錢

生苡仁 五錢

雲苓皮 六錢

半夏 六錢

蠶砂 三錢

川草薢 五錢

車前子 四錢

滑石 一兩

川黃柏 三錢
鹽水炒

便濁服此。

泄瀉

久泄脈弦。自春令而來。古謂之木泄。侮其所勝也。

柴胡 三錢

猪苓 三錢

生薑 五錢

薑半夏 五錢

炙甘草 二錢

大棗 三枚
去核

澤瀉 三錢

廣陳皮 三錢

陶四十五歲
乙酉四月十五日

十九日 茯苓塊五錢 桂枝三錢
泄瀉已減前數。加

蒼朮三錢

前後共計服十三帖全愈。

五月初六日 前曾木泄。與小柴胡湯十三帖而愈。向有糞後便紅。乃小腸寒溼之症。現在脈雖弦而不勁。且兼緩象。大便復溏。不必用柴胡湯矣。轉用黃土湯法。

竈中黃土四兩

黃芩炭二錢

熟附子三錢

茯苓塊連皮五錢

炒蒼朮五錢

廣皮炭二錢

煮三杯。分三次服。

十二日 溼溫成五泄。先與行溼止泄。其糞後便紅。少停再擬。

猪苓五錢

蒼朮四錢

澤瀉五錢

茯苓連皮六錢

桂枝五錢

苡仁五錢

廣皮四錢

廣木香二錢

煮三杯。分三次服。以泄止為度。

八月初六日 胃不開。大便溏。小便不暢。脈弦。

猪苓三錢

白蔻仁二錢

澤瀉三錢

生苡仁五錢

茯苓皮五錢

廣皮二錢

薑半夏三錢

柴胡一錢

煮三杯。分三次服。

六脈弦細。面色淡黃。泄則脾虛。少食則胃虛。中焦不能建立。安望行經。議

先與強土。

藿香梗二錢

廣皮炭錢半

廣木香錢半

白蔻仁一錢

雲苓塊三錢

蘇梗錢半

苡仁二錢

薑半夏三錢

益智仁一錢

煮三杯。分三次服。七帖。

右脈寬泛。緩也。胃口稍開。泄則加添。小便不通。加實脾利水。

猪苓三錢

澤瀉三錢

茯苓五錢

苡仁五錢

六月十八日

前方服十四帖。泄止。胃稍醒。腕中悶。舌苔滑。周身痺痛。六脈弦細而沈。先與和中。治痺在後。

桂枝三錢

防己三錢

益智仁錢半

藿香梗三錢

王
三十五
歲

杏仁三錢
苡仁五錢
薑半夏五錢
白蔻仁二錢

廣皮三錢

煮三杯分三次服。

渴而小便後淋濁。此溼家渴也。况舌苔黑滑乎。議金匱渴者猪苓湯法。但前醫大劑地黃五味麥冬龜膠等。純柔粘膩補陰封固日久。恐難速愈。戒猪肉介屬滑膩。

猪苓六錢
草薢六錢
澤瀉五錢

初五日

渴而小便短。便後淋濁。與猪苓湯法。小便長而淋濁大減。渴止舌黑苔退。惟肩背微有麻木痠楚之象。是臟腑之溼熱已行。而經絡之邪未化也。與經腑同治法。

生石膏八錢
雲苓塊五錢
晚蠶砂三錢
杏仁四錢
廣皮錢半
通草一錢
防己二錢
草薢四錢
生苡仁四錢
桂枝三錢
黃柏炭錢半

吳鞠通醫案 卷三 泄瀉

吳鞠通醫案

卷四

痘症

周女

一週零一月

庚申六月

身熱耳冷。隱隱有點。防痘。夏令感溫暑而發。先宜辛涼解肌。令其易出。切忌辛溫發表。致表虛發痒。潰爛。且助溫熱。

連翹三錢

甘草一錢

苦桔梗三錢

蘆根三錢

炒銀花三錢

薄荷八分

芥穗八分

初二日

點出未透。仍宜解肌。照前方。

初三日

險痘三天。業已出齊。但頂陷色暗。與活血提頂法。再色白皮薄。兩太陰素虛之體。此痘如用羌活防風。必致癰癢。進苦降必致泄瀉。

當歸二錢

苦桔梗一錢

焦白芍錢半

銀花三錢

白芷二錢

黃芩炭錢半

木通二錢

紫草八分

初四日

氣虛則根鬆頂陷。血鬱則色淡盤軟。毒重則攢簇。且與消毒活血提頂。扶過七日。能用補托。方可有成。不然九朝壅癢可慮。況現泄瀉。

南山查炭 一錢

連翹 二錢

暹羅犀角 一錢

當歸 土炒 二錢

甘草 錢半

白芷 二錢

紅花 一錢

暹羅犀角 三錢

皂針 一錢

羚羊角 三錢

連翹 三錢

苦桔梗 二錢

紫草 錢半

炒銀花 三錢

公鷄冠血 每大半黃酒
杯點三小匙

初五日

痘五天半。氣虛不能解毒外出。牽延時日。必致內陷癰癢。今日仍然外感。用事未敢大補。亦須少用託法。

白芷 二錢

連翹 錢半

丹皮 二錢

皂針 錢半

苦桔梗 二錢

白歸身 三錢

甘草 五分

紫草 一錢

燕窩根 五錢

生綿黃耆 三錢

鷄冠血 三五匙

濃煎一茶杯。服完。渣再煮濃半杯。明早服。

初六日

六天少用補託。業已起脹。顏色頗鮮。但皮薄殼亮。今日須大補。明日須峻補。

生綿黃耆 五錢

苦桔梗 三錢

鷄冠血 每三酒杯

炙甘草 錢半

紫 草 二錢

黨 參 三錢

白歸身 三錢

廣皮炭 一錢

白 芷 二錢

川 芎 一錢

燕窩根 一兩

公鷄湯煎藥。

初七日

兩用託補。色鮮而潤。陷者復起。但清漿十之二三。亮殼頗多。今到七日。臟腑已週。氣血用事。正好施補氣載毒之方。

生綿耆 五錢

廣 皮 一錢

炙甘草 二錢

白 芷 一錢

苦桔梗 三錢

人 參 一錢

廣木香 八分

煨肉果 錢半

川 芎 四分

燕窩根 一兩

公鷄湯煎藥。

入天痘頂圓綻者。不過一二。頭面行漿。胸背清漿三四。四肢全然空亮。根盤色淡。此氣血兩虛。急宜峻補。用參歸鹿茸。合陳氏異功法。

人 參 一錢

歸 身 六錢

煨肉果 二錢

黃毛茸 五錢 另煎水黃

苦桔梗 三錢

白 芷 三錢

廣木香 一錢

炙甘草 三錢

燕窩一兩

生綿耆一兩

茯苓塊三錢

廣皮炭三錢

公鷄湯一中

此藥煮成四茶杯。加葺汁半茶杯。雞湯一中碗。燕窩湯一盃。和勻上火煨濃。小人服一半。乳母服一半。

初九日 九天昨用峻補。兩臂雖有黃漿。四肢仍然空亮。泄瀉之故。用文仲大異功散。

生嫩耆一兩

人參一錢

廣木香二錢

當歸五錢

煨肉果三錢

廣皮炭二錢

煨訶子三錢

於白朮五錢

上肉桂

一錢 細去粗皮

茯苓塊六錢

炙甘草三錢

鹿茸尖六錢 酒煎

初十日

即於前方內去肉桂。鹿茸尖。歸身。減黃耆四錢。加

澤瀉五錢

十一日

照前方。

十二日

即於前方內加

薏米仁五錢

十三日 漿未十分滿足。四肢間有破損。難保無痘毒咳嗽等事。茲用利水以助結

痂。驅逐餘毒。即在其中。所謂一舉兩得者也。

洋參三錢 澤瀉三錢 廣皮炭一錢 茯苓塊五錢

生苡仁八錢 炙甘草錢半 焦於朮三錢 廣木香三錢

煨肉果二錢 煨訶子二錢

十四日 脚腫胸悶洩短。水不利也。

茯苓塊五錢 炒銀花二錢 冬白朮三錢 澤瀉二錢

生苡仁五錢 廣皮炭錢半 飛滑石二錢 連翹二錢

五穀蟲錢半

何男 三天氣虛毒重。粘連成片。兼之色滯頂陷。攻毒則礙虛。溫託則礙毒。兩難

措手。和中安表。更不濟事。勉議活血擺毒。

苦桔梗三錢 烏犀角五錢 連翹三錢 生甘草一錢

白芷一錢 薄荷一錢 炙天蟲二錢 紫草三錢

全歸三錢 南查三錢 丹皮三錢 羚羊角三錢

每一酒杯。和猪尾膏三小匙。

初五日 四天昨用活血解毒。大有起色。但喉聲微啞。面目浮腫太甚。唇色絳紅。時
癘之火毒太重。今日猶宜解毒。

苦桔梗六錢

暹羅犀角六錢

連翹三錢

人中黃三錢

桃仁錢半

古勇黃連一錢

天蟲三錢

白芷一錢

全歸二錢

炒查肉二錢

紫草三錢

穀精草三錢

丹皮三錢

羚羊角三錢

銀花五錢

紫花地丁五錢

以銀花紫地丁煎湯代水。

初六日 五天半漸有起色。但險症變幻不一。時刻小心為要。今日仍宜活血提頂。
微加托裏。

生綿耆三錢

紫草三錢

紅花三分

炙甘草三錢

歸身三錢

銀花三錢

白芷二錢

穀精草三錢

皂針一錢

犀角三錢

連翹三錢

每杯約加酒雞冠血三小匙

初七日 六天半時癘已退。氣血用事。頭面清漿三四。周身亮殼。非重用溫託不可。

看守勿懈。不致損破。可望成功。

生黃耆八錢

紫草二錢

燕窩根五錢

炙甘草三錢

廣木香錢半

歸身三錢

黨參三錢

白芷二錢

鷄冠血每酒杯三匙

初八日 七天半漿未及半。咬牙寒戰。灰白塌陷。非陳文仲大異功散不可。

人參錢半

廣皮錢半

焦於朮三錢

生綿耆八錢

廣木香二錢

茯苓塊二錢

炙甘草三錢

白芷三錢

糯米三錢

上上桂心錢半

歸身四錢

公鷄湯煎。

初九日 八天半昨用大異功法。咬牙寒戰。已去大半。但漿猶未足。用異功參歸鹿茸法。

茸法。

綿黃耆一兩

上上肉桂二錢去粗皮

廣木香二錢

人參三錢

黃毛鹿茸五錢生

白芷二錢

茯苓塊三錢

當歸三錢土炒

訶子肉二錢炒

焦於朮三錢

煨肉果二錢

炙甘草錢半

廣皮炭半錢

熬濃服。

初十日

九天半咬牙寒戰。已去十分之九。但身上漿清。腿足未灌。泄瀉頻仍。翁仲仁有泄瀉安寧大虛少毒之診。今日猶宜峻補。如泄瀉不止。再加瀉腸。

綿黃耆一兩

廣木香錢半

人參三錢

生鹿茸酒五錢
另煎

上肉桂二錢

白芷二錢

炙甘草二錢

煨肉果三錢

厚樸二錢

訶子肉三錢
煨

十一日

十天半用異功散得效。但泄瀉不止。膚癢漿薄。必有餘毒。今日仍可托補一天。議於明日用實脾利水收痂法。俾不盡之熱毒從小便而去。

生綿黃芪一兩

廣木香二錢

煨肉果三錢

人參二錢

廣皮炭二錢

炙甘草三錢

上肉桂一錢

厚樸二錢

訶子肉三錢

十二日

十一天痂雖結而漿薄。泄瀉。以實脾利水為法。仍兼瀉腸。

人參八分

煨肉果三錢

厚樸二錢

焦於朮三錢

炙甘草錢半 上肉桂一錢 茯苓塊三錢 炙黃耆五錢

生苡仁五錢 廣皮炭二錢 訶子肉五錢 廣木香二錢

十三日 十二天漿薄微咳。痂癢便糖。仍當補氣。兼與實脾。

人參八分 煨肉果錢半 厚樸二錢 生黃芪五錢

訶子肉二錢 廣木香一錢 茯苓塊五錢 炙甘草三錢

焦於朮三錢 生苡仁五錢 廣皮炭一錢

十四日 十三天喉啞咳嗽而渴。肺中餘毒未清。便糖溺短。痘後脾虛宜實。

茯苓塊三錢 五穀蟲一錢 冬白朮三錢 厚樸錢半

生苡仁五錢 苦桔梗三錢 訶子肉二錢 炒銀花二錢

地骨皮二錢 連翹錢半

險中逆痘三天。繁紅扁闊。成片不起。翁仲仁謂毒重壅遏。其形退縮。且煩躁肢逆。唇焦舌黃。洩短腹痛。痘頂先出者已焦。勉用雙解法。

芥穗三錢 全歸三錢 苦桔梗三錢 查肉三錢

生大黃五錢 生甘草一錢 牛蒡子三錢 連翹二錢

吳氏 五歲辛酉九月二十日

日二十一

四天豔紅扁闊。下後稍見起發。究不肥綻。何能起脹成漿。咳嗽痰多。且與清涼敗毒。活血鬆肌。開提肺氣。

犀角三錢

杏仁三錢

紫草二錢和猪尾膏

羚羊角三錢

苦桔梗五錢

銀花三錢

連翹三錢

甘草一錢

大力子三錢

芥穗三錢

歸尾一錢

查炭五錢

日二十二

五天密佈不齊。身熱未退。扁闊癰陷。形色滯暗。不能起脹。那得成漿。勉於清毒之中。兼與活血提頂。

犀角三錢

天蟲三錢

杏仁三錢

羚羊角三錢

歸鬚二錢

銀花三錢

苦桔梗三錢

牛蒡子三錢

白芷二錢

甘草一錢

皂針一錢

查肉二錢

連翹三錢

紫草二錢

雞冠血每杯沖四茶匙

日二十三

六天頭面雖有行漿之意。究竟周身平陷。較昨日顏色略潤耳。仍與清毒活血提頂。少加托裏。

生黃耆三錢 天 蟲二錢 全 歸三錢 皂 針錢半

人中黃一錢 杏 仁三錢 白 芷二錢 紫 草三錢

牛蒡子三錢 銀 花三錢 穿山甲一錢 苦桔梗五錢

犀 角三錢 雞冠血每杯沖四茶匙

二十四 七天頭面行漿。周身平塌空殼。用伍氏內託法。

生綿耆八錢 大力子炒研三錢 白 芷二錢 全 歸三錢

苦桔梗三錢 川 芎錢半 炙甘草錢半 洋 參錢半炒老黃色

紫 草二錢 燕窩根五錢 公雞湯一茶杯 雞冠血每杯沖三茶匙

二十五 八天頭面漿足。周身平塌者已起。空殼者亦有行漿之勢。翁仲仁謂喉啞聲嘶。漿行飽滿。亦無妨。咬牙在七日以後。屬氣虛。况其食少乎。非陰虛也。

生綿耆八錢 炙甘草一錢 公丁香四分 白 芷二錢

象 貝二錢 苦桔梗五錢 天 蟲三錢 洋 參錢半炒老黃

牛蒡子三錢 雞 湯一茶杯

二十六 九天漿已行及大半。但氣虛作癢。看守勿懈。毋令損破為要。

生綿耆一錢兩

象貝三錢

白芷三錢

天蟲三錢

苦桔梗六錢

牛蒡子三錢

洋參二錢

冬白朮二錢

炙甘草三錢

廣木香一錢

日二十七 十天漿已行及十之七八。惟痰咳微癢。眼中出膿爲可慮。

生綿芪

生甘草

穀精草

苦桔梗

焦冬朮

桑葉

生苡仁

連翹

土貝母

日二十八 十一天溼重。小便不利。畏寒咬牙。

洋參錢半

廣皮炭錢半

生黃芪五錢

炙甘草三錢

生苡仁五錢

冬白朮三錢

穀精草三錢

茯苓塊三錢

日二十九 十二天實脾利水以收痂止嗽。加辛涼敗毒以護目疾。

生黃芪二錢

地骨皮二錢

炙甘草錢半

連翹二錢

炒冬朮三錢

炒銀花二錢

茯苓塊三錢

穀精草三錢

生苡仁五錢

初一日 十三天溼氣已行。痂結過半。正氣已化。痂落過半。飲甚好。目開無恙。已收全功。惟咳嗽減而未清。仍宜實脾利水。復以辛涼敗毒。

炒冬朮三錢

地骨皮一錢

茯苓塊三錢

炒銀花錢半

生苡仁三錢

五穀蟲一錢

連翹錢半

象貝錢半

某七官

痘粒分類。原屬純正。但殼薄頂平無漿。間有二三陷者。且有灰色。明日七朝。氣血用事。非峻補不可。一切辛竄走裏者。必不可不用。爲其溫中而託絡也。其走表者斷不可用。以其虛表而致塌癢也。再九日以後。須防泄瀉咳嗽。

嵩女

相火用事。病民病溫。防發痘。先宜辛涼達表。切忌發汗。

五個月
初十日

連翹二錢

銀花二錢

甘草一錢

苦桔梗二錢

杏仁粉二錢

薄荷五錢

芥穗八分

蘆根三把

牛蒡子二錢

十一日 險痘一天。

連翹二錢

銀花二錢

苦桔梗二錢

甘草一錢

紫草一錢 蘆根二兩 歸鬚八分 薄荷八分
牛蒡子二錢 芥穗一錢 煎湯代水。
十二日 脾經險痘二天。色重粘連。船小載重。夜間煩躁。先以活血敗毒。

查肉三錢 大黃一錢 連翹二錢 當歸土炒
銀花五錢 桃仁泥八分 地丁三錢 苦桔梗二錢
紅花三分 人中黃一錢 丹皮二錢 犀角一錢
猪尾膏三小匙 白茅根一兩 煎湯代水。

十三日 險痘三天。色重粘連。間有陷頂。議涼血提頂。

連翹二錢 細生地錢半 銀花錢半 歸鬚八分
苦桔梗一錢 白茅根三錢 甘草八分 犀角八分
紅花五分 羚羊角二錢 丹皮二錢 蘆根三把
十四日 險痘四天。形色俱有起色。但頂平便塘耳。將就可望有成。

生黃芪三錢 茯苓塊三錢 炙甘草錢半 炒洋參一錢
白芷一錢 炒山甲一錢 白茅根三錢 皂針八分

白朮炭二錢

炒銀花二錢

雞冠血三小匙

公雞湯煎藥。

十五日

五天即於前方內。去銀花、雞冠血。加

廣皮一錢

十六日

六天雖然行漿。但色灰便溏。

焦於朮錢半

廣木香一錢

訶子肉一錢

茯苓塊三錢

煨肉果錢半

炙甘草二錢

綿黃芪三錢

廣皮炭一錢

洋參二錢
薑汁炒

水煎濃。

十七日

七天業已回漿。十分全功。但便溏溼重。仍有意外之虞。法宜實脾利水。

焦於朮三錢

廣木香一錢

茯苓塊三錢

訶子肉一錢

生苡仁三錢

煨肉果一錢

廣皮炭八分

人參一錢
薑炒

炙甘草一錢

芥穗錢半

藿香葉八分

防風錢半

薄荷八分

高女
三歲癸

亥十一月初十日

連翹二錢 杏仁一錢 甘草一錢 桑葉一錢
苦桔梗二錢 蘆根二把

十一日 重險痘一天。熱一日而見點。陽明絡現。粘連成片。汗多便溏。氣虛毒重。九

朝瘡癢難防。勉與擺毒鬆肌。

連翹三錢 銀花五錢 桑葉三錢 丹皮二錢

紫花地丁五錢 梔子五錢 歸尾八分 苦桔梗三錢 牛蒡子八分

甘草一錢 蘆根五把 猪尾膏三匙 和入

十二日 二天出不爽快。未三歲之兒。九日限期時刻有違陷之慮。即於前方內加

白茅根五錢 暹羅犀角一錢

十三日 重險三天。面貌繁紅。殼薄頂陷根鬆。粘連成片。身上色淡不起。小便清。大

便多而稀。頭溫足冷。應作氣虛不能送毒外出看。總之九朝瘡癢之症。勉

與活血提頂。而補氣兼之。

連翹二錢 白芷二錢 紅花一錢 川山甲一錢

甘草一錢 皂針一錢 歸尾錢半 洋參一錢

犀角一錢

生綿芪三錢

猪尾膏三匙冰片二厘拌

十四日

重險四天。較昨日稍好。然不能起脹。焉能成漿。癰癢之證。勉與提頂。

薄荷八分

生綿耆五錢

苦桔梗二錢

川山甲一錢

杏仁二錢

犀角二錢

白芷二錢

紅花一錢

甘草一錢

皂針一錢

銀花二錢

雞冠血五錢

十五日

重險五天。較昨日略好。究竟不能起脹。面紅身白灰。頭溫足冷。虛寒之極。勉與辛溫而甘者。助其元陽。

生綿芪五錢

紅花錢半

川山甲二錢

焦於朮錢半

洋參二錢薑一片同搗炒枯

半夏錢半

白芷二錢

煨肉果八分

公丁香五分

廣木香錢半

桑葉一條生搗汁冲

炙甘草錢半

濃煎如膏。

十六日

六天虛寒殼亮。急用峻補。以救萬一。

生綿芪一兩

歸身三錢炒

川山甲三錢

焦於朮四錢

洋參六錢

鹿茸五錢

白芷三錢

紅花錢半

廣木香三錢

煨肉果錢半

炙甘草三錢

茯苓塊三錢

廣皮炭二錢

老公雞湯煎如膏。

十七日 七天殼薄無漿便塘。氣血兩虛。用陳文仲法。

生綿芪一兩

炙甘草三錢

洋參三錢
薑炒

煨肉果二錢

焦於朮二錢

煨訶子三錢

鹿茸尖六錢
酒炒

真檫桂八分
去粗皮

白芷二錢

公丁香八分

煨木香二錢

廣皮炭錢半

半夏錢半

公雞湯煎如膏。

十八日 八天咬牙。泄瀉。目開。殼薄無漿。皆係虛欲痛癢之象。急用陳文仲大異功

散法。惜無力用參耳。

防風五錢

訶子肉三錢

肉果霜三錢

生綿芪三錢

洋參五錢

熟附片一錢

於朮四錢

檫桂錢半

茯苓塊三錢

公丁香三錢

白芷二錢

廣木香三錢

廣皮二錢 炙甘草三錢

濃煎如膏。分六七次服。

十九日 九天昨用文仲大異功。仍然塌陷咬牙。水漿不得入口。然根盤未散。斷不可棄而不治。議於前方加

煨肉果二錢 丁香二錢

連服二帖。

二十日 十天昨日異功散方。連服二帖。頭面業已行漿。下身仍然灰白塌陷。再用前方二帖。

二十一日 十一天灰白漿不足必陷。仍服前方二帖。

二十二日 十二天頭面漿足。四肢空殼尙多。於前方內改肉桂爲桂枝。再二帖。

二十三日 十三天仍須託理溫中。白晝服完。夜間再服半帖。

二十四日 十四天灰白咬牙。泄瀉猶在險途。

生綿芪五錢 桂枝五錢 洋參五錢 茯苓塊五錢

於朮五錢 白芷三錢 訶子肉三錢 炙甘草三錢

肉果霜 六錢

生苡仁 五錢

公丁香 六錢

黨參 五錢

廣木香 五錢

廣皮 三錢

九碗水煎如膏。

徐男

六歲

癸亥臘

月初四

日

重險痘三天。骨立無肉。血枯而燥。乾紅色暗。粘連成片。皆隱在皮中。乃集毒把持之故。勉議兩解重法。如照常理立方。恐鞭長莫及。

大黃 四兩 黃酒炒 黑牛

查肉 三錢 生半炒

犀角 一兩

紫地丁 一兩

桃仁 四兩 生半炒

青皮 二兩

銀花 一兩

紅花 三錢

小猪尾血 半酒杯 入梅片 三厘

水八碗。煮成三碗。先服半碗。約二時再進。以舌苔退痘起發為度。

初五日

重險痘四天。大下後。業已起發。不必再用沈降。議涼血提頂。

犀角 八錢

紫地丁 五錢

白芷 二錢

銀花 八錢

苦桔梗 五錢

皂針 二錢

羚羊角 五錢

人中黃 三錢

白茅根 一兩

連翹 五錢

初六日

重險痘五天。大有起色。仍宜涼血活血。兼與敗毒。

細生地八錢
紫地丁五錢
白芷三錢
犀角五錢
羚羊角五錢
人中黃二錢
連翹四錢
銀花八錢
白茅根一兩
苦桔梗五錢

初七日 重險痘六天。雖然行漿。但火毒太重。不必用補。亦不可瀉。猶宜用涼血解毒。以爲結痂之地。

元參五錢
紫地丁六錢
銀花八錢
細生地一兩
苦桔梗五錢
連翹三錢
犀角一兩
人中黃二錢

初八日 七天於前方內減犀角一半。加白茅根一兩。粉丹皮八錢。

麥冬五錢

初九日 八天漿已滿足。色漸蒼。胃已旺。議辛涼以助結痂之用。

連翹三錢
白茅根五錢
銀花三錢
五穀蟲錢半
生甘草錢半
麥冬五錢
連心

初十日 九天四肢太熱。非重用辛涼。其痂不結。

連翹五錢

黃芩錢半酒炒黑

元參五錢

銀花五錢

生甘草錢半

麥冬八錢連心

細生地五錢

白茅根六錢

丹皮五錢

十一日 十天回漿甚緩。微咳。用辛涼少兼實脾。

連翹二錢

黃芩一錢

白茅根三錢

人中黃錢半

麥冬三錢連心

桑葉一錢

細生地三錢

生苡仁五錢

地骨皮一錢

丹皮三錢

十二日 十一天仍服前方一帖。

十三日 十二天再服前方一帖。

十五日 十四天十分全功。惟敗餘毒而已。

連翹二錢

人中黃錢半

白茅根三錢

五穀蟲一錢

粉丹皮三錢

仙人杖皮二錢

呂女 重險痘二天。色重。粘連成片。攢簇頗多。第一方以達外感活血鬆肌爲法。

癸亥臘月十三日

芥 穢二錢 苦桔梗三錢 牛蒡子三錢 杏仁三錢
前胡錢半 薄荷一錢 甘草一錢 半夏二錢

蘇葉一錢 當歸錢半 南紅花一錢

十四日 早第二方。以擺開梟毒為主。蓋攢簇者必攻也。况色重乎。

生大黃用一兩半生半炭 桃仁六錢生半炭 南查六錢生半炭 苦桔梗四錢

青皮半生半炭 人中黃二錢 猪尾膏每次沖入梅片五厘一酒

十五日 申刻重險痘三天。早用必勝法。現在顏色已退。唇舌色絳。抱髻蒙頭。腰中

腎俞太重。弄口嘔嘴。心火太重。恣議以涼血敗毒。

犀角六錢 甘草錢半 羚羊角三錢 銀花三錢

真山連一錢 大力子二錢 連翹三錢 廣皮錢半

苦桔梗三錢 杏仁三錢 全歸三錢 次生地三錢

猪尾膏每次三兩匙研入冰片五厘

十六日 險中逆痘四天。氣血既虛而毒又重。色暗根鬆。癰闊殼薄。頭溫足冷。抱髻

攢腰。下不可補。又不可此其所以難也。勉與活血提頂。

紅 花錢半

人中黃三錢

犀 角五錢

全 歸三錢

紫地丁五錢

白 芷三錢

銀 花五錢

皂 針三錢

苦桔梗六錢

川山甲炙二錢

查 肉六錢

粉丹皮五錢

奪命丹三粒

猪尾膏每次沖三匙冰片五厘

十七日

險中逆痘五天。較昨日雖有起色。究竟色滯而重。板着不行。二日不大便。皆係梟毒把持。恐不能行漿。如過此關。則不能再行用沉降矣。議必勝法。

生大黃用酒一兩半炒黑

青 皮六錢 桃 仁生炒各半

焦查肉一兩

紅 花錢半

苦桔梗六錢

甘 草三錢

十八日

險中逆痘六天。昨日復用必勝法。雖有起色。究竟頭面不如周身之半。梟毒把持。陽亢可知。

犀 角五錢

大 黃酒五錢炒黑

紅 花二錢

人中黃三錢

全 歸三錢

銀 花五錢

紫地丁五錢

川山甲炙二錢

苦桔梗五錢

皂 針二錢

南查炭三錢

廣 皮二錢

白 芷三錢

十九日 險中逆痘七天頭面起發。色鮮。周身色淡。逆者已順。現有行漿之勢。一以上漿為主。

於朮	三錢	防風	三錢	整綿芪	生一兩	炒廣皮	二錢
洋參	三錢	炙甘草	三錢	白芷	三錢	茯苓塊	三錢
黨參	五錢	桂枝	五錢	歸身	土炒二錢		

二十日 八天照前方仍服一帖。

二十一日 九天身上色淡灰。四肢尙空。大便頻仍。寒戰發癢。皆係虛象。急用陳文仲法。防其內陷。

黨參	三錢	肉果霜	五錢	訶子肉	煨五錢	茯苓塊	五錢
於朮	五錢	炙甘草	三錢	廣木香	三錢	官桂	去粗皮一錢
白芷	三錢	炒廣皮	二錢	薑半夏	三錢	熟附子	一錢
洋參	三錢	生薑	三片	大棗	去核二枚		

咬牙加

公丁香 三錢 第二帖做細末。

二十二日

呂男

二歲甲

子正月

十一日

將昨日第二帖之末藥。每服三錢。約二三個時辰服一次。狀元痘原不必服藥。但現在半生半熟。泄瀉唇寒。猶恐遭毒損目。議托溫法。

生黃耆三錢

黨參三錢

白朮一錢

茯苓三錢

炙甘草三錢

半夏一錢

廣皮一錢

訶子肉二錢

生苡仁二錢

服二帖後去黃耆。再服二帖。

汪男
三歲

初報痘點。形即繁重。表虛脈滑。心熱恣甚。謹防八九朝癰癢。且與辛涼解肌透毒。

苦桔梗五錢

生甘草錢半

銀花二錢

牛蒡子三錢

蘇薄荷三錢

杏仁泥二錢

全歸一錢

連翹二錢
連心

丹皮三錢

初七日

險痘一天。頭面粘連。點現癰闊。足涼。非純然毒重。亦非純然氣虛。且與活血鬆肌敗毒。大涼大溫。皆在難施之例。

鎊犀角五錢	牛蒡子一錢	青皮二錢	苦桔梗三錢
全歸錢半	銀花五錢	甘草二錢	南查炭三錢
薄荷八分	連翹三錢	猪尾膏 <small>冲三匙</small>	

初八日 險痘二天半。但唇腫。右顴腫。心脾之火甚也。足已溫。痘苗稍大者即頂陷。

犀角五錢	全歸二錢	銀花五錢	苦桔梗三錢
紅花八分	紫地丁五錢	甘草錢半	查炭錢半
連翹三錢	牛蒡子二錢	廣皮八分	猪尾膏 <small>三匙</small>

白茅根一兩

按白茅根秉燥金之體。感風木而花。內異於衆草。生發最速。其性喜潔。故能化毒開清。其味甘涼。故能走肺胃而不傷肺胃之陰。本草稱其主衄症。蓋言其所當然。而不言其所以然也。但此物性平和。不假以重權。不爲功。凡一切清竅病。用之最良。而痘症中護眼護喉。走清導血。分爲尤良也。

初九日 險痘三天半。兩眼兩顴肉腫。瘡不腫。心脾之火太甚也。血無不活。故今日不加血藥。

犀角五錢	連翹三錢	元參五錢	羚羊角五錢
苦桔梗六錢	銀花五錢	紫地丁五錢	甘草錢半
細生地三錢	牛蒡子五錢	白茅根一兩	穀精草三錢
白芷二錢			

初十日 重險痘四天半。額滯於顏。顏滯於身。此陽火有餘之象。雖不必大下。仍以敗毒為主。而提頂次之。

犀角五錢	銀花五錢	羚羊角五錢	紫地丁五錢
黃芩三錢	苦桔梗五錢	次生地五錢	牛蒡子二錢
元參二錢	甘草二錢	穀精草三錢	山連錢半
白茅根一兩			

十二茶杯水。煮成五杯。分十次服。

十一日 五天半。已有行漿之勢。不必提頂托漿。但喉沙聲啞。趁此猶係外感用事。

十二日

之時。仍用昨日方開提肺氣敗毒。減其蒸騰鍊毒之火。使歸於平和。即行此等湯火痘之漿法。所謂道無定體者此也。高明以爲何如。仍用昨日方一帖。限明日黎明服完。

六天半。面已有漿。四肢腰背皆空。五更大便兩次。痛快而溏。今晚已入氣血用事之關。須漸進補托。兼與清毒。

炙綿耆三錢

犀角三錢

白芷二錢

冬白朮二錢

白茅根六錢

黨參錢半

苦桔梗一錢

茯苓塊三錢

銀花三錢

廣皮炭一錢

日入後服。

十三日

七天半。頭面漿已七八。腰背不足。四肢尙空。今日正是氣血當令。已有癢態。必得扶其不及。多得一分漿。少得一分後患。此身小痘多之定法也。

生綿耆五錢

白芷二錢

廣皮炭錢半

黨參三錢

炙甘草錢半

紅花一錢

冬白朮三錢

茯苓塊三錢

廣木香一錢

十四日 晚足九天。於前方內去紅花。

十五日 十天漿足色蒼。形勢圓綻。四肢陸續上漿。皮膚捫之平和。不冷亦不過熱。脈洪數有力。合觀皆情理之正。其不食畏縮。皆痛象也。痘多漿亦多。鍊氣血而成漿。痛亦情理之正。斷非陷症。議補氣以勝痛。活絡以定痛法。似不歧於路矣。

生綿耆三錢

熟耆三錢

炙甘草三錢

人參五分

乳香八分

沒藥八分

茯苓塊三錢

冬朮三錢

廣木香一錢

廣皮一錢

老厚樸六分

白芷二錢

紅花四分

十六日 十一天。大勢已有成功之象。猶須防其泄瀉作癢。

防風二錢

洋參一錢

炒冬朮二錢

茯苓塊三錢

炙甘草一錢

廣皮一錢

廣木香一錢

焦白芍二錢

十七日 十二天。小便長。大便滯。暫與宣化腸胃。

茯苓塊

防風錢半

穀精草三錢

五穀蟲

老厚樸一錢

十九日 十四天。痘後肺液受傷。渴而咳。

白茅根

象貝

某男 風溫發熱三天。耳冷尻冷。已有微點。謹防天花。法宜辛涼解肌。芳香透絡。最忌三陽表藥。多汗致成癰癢。

苦桔梗

牛蒡子二錢 炒研

桑葉三錢

甘草

芥穗錢半

連翹三錢

薄荷

銀花三錢

白茅根三錢

當日晚大瀉水糞。加

黃芩三錢。瀉止。

日二十七

虛寒。痘二朝。甫二日。熱退其半。神氣安靜。大便溏泄。佈痘不多。亦屬勻稱。但痘形遍闊根鬆。色亦過淡。觀其皮色。脾經素有飲食傷損。議異功保元合法。

人參一錢

生於朮二錢

生綿耆三錢

雲苓塊三錢

廣皮二錢

炙甘草二錢

廣木香錢半

二十八日

仍用前方。

初七日

十二朝。痘雖稀少。漿行薄弱。腰下尙未結痂。乘此機會。再用保元以助餘漿。

人參一錢

雲苓塊三錢

綿耆三錢

苡仁三錢

炙甘草錢半

初八日

仍用前方一帖。

補案。辛巳年述癸卯初夏。余有漣水之遊。長女甫二齡。於四月十一日見點。至二十五日。已半月矣。余適回家。見其形勢鼓立者半。頂陷者半。根抱者半。散者半。毫無汁漿。本係謝寶靈兄調治。因請同看。伊立一方。余視之曰。此方如上得漿起。甘受重罰。此方如不起漿。亦受重罰。謝兄愕然曰。足下左右皆受重罰。何故。余曰。今且不必明言。明日來視漿色。伊去後。余仍用其方。照方製念帖。加燕窩十二兩。此味原大公雞一隻。重九斤。紫河車一具。此二味亦原方。並藥共十餘斤。先分九鍋煎。去渣後並一鍋煎。

女
二十日

自早至暮。不敢草率。成濃膏得兩碗許。令乃母飲半茶杯。小人飲半酒杯。二鼓時其母因乳脹。謂余曰。藥甚靈。余無乳者已數日。今忽蓬蓬。豈非藥力乎。余曰。可急令小孩吮之。彼曰。小孩不得寐者已數日。今方熟睡。可驚之乎。余曰。限期已緊。所以令汝服藥。爲以乳汁上漿也。今乳脹可急與之。因促之醒。痛吮一飽。少時又寐。漏下三鼓。清漿如露矣。未至四鼓。又令母女服藥如前。四鼓未罷。漿如蠟色。五鼓已後。又如茶色濃厚。如及時之漿。天明已十七朝矣。又延謝先生至。彼一視曰。奇哉。何因得此。余曰。用君原方。彼比曰。只添得燕窩一味。何神至此。余曰。余作日云。此方上得起漿。甘受重罰者。以先生七八朝即用此方。彼時氣血方壯。毫無漿汗。今已十五朝。氣血消耗。豈能上漿乎。余又謂此方不能上漿。亦受重罰者。以先生之方如錯。小女早不活矣。因令伊視方之背。伊見照方二十帖之文。又令視諸藥渣。因謝曰。余實不能。

十九朝痘後便澹而頻。久則脾腎兩傷。補瀉爲穩。

真雲苓 五錢

白

朮 三錢
土炒

肉果霜 三錢

半

夏 一錢

訶子肉三錢 生苡仁五錢

二十四日 實脾利水之中兼化清氣。

於朮^{三錢} 五穀蟲^{三錢} 雲苓塊^{五錢} 晚蠶砂^{三錢}
薏仁^{五錢} 蟬衣^{七枚} 地骨皮^{三錢}

初一日 三十一天痘後解毒腫潰。補托之中加以敗毒。

人參一錢 銀花^{三錢} 雲苓^{三錢} 黃耆^{三錢}
苡仁^{五錢} 於朮^{三錢} 炙甘草^{錢半} 五穀蟲^{三錢}

初四日 痘後餘毒腫潰。稍加銀花敗毒。大便即溏。議於前方去銀花。加肉果霜訶子肉。

人參一錢 五穀蟲^{二錢} 肉果霜^{錢半} 黃耆^{三錢}
訶子肉^{三錢} 白雲苓^{三錢} 炙甘草^{錢半} 於朮^{三錢}

木香一錢 薏仁^{五錢}

初七日 三十六朝。痘毒潰爛。應照潰瘍例。即用痘科門中之保元合異功法。
綿耆^{五錢} 於朮^{二錢} 廣皮^{一錢} 炙甘草^{二錢}

初八日

傷食暮熱嘔吐。痘後太飽之故。與止渴消食。熱自止。夜間不可吃粥

苡仁三錢 人參一錢 雲苓五錢

地骨皮三錢 苡仁三錢 雲苓三錢 炒神麴錢半

半夏二錢 炒廣皮一錢

男二十日

風木司天之年。又當風木司令之候。風木內含相火。時有痘疹。無論但受風溫。身熱而不發痘。或因風溫而竟發痘。或發斑疹。皆忌辛溫表藥。惟與幸涼解肌透絡最穩。此時醫所不知。蓋風淫所勝。治以辛涼。佐以苦甘。內經之正法也。

苦桔梗三錢 大力子錢半 鮮蘆根五錢 甘草一錢

桑葉三錢 薄荷入分 連翹三錢 芥穗一錢

銀花三錢

二帖。此方治初痘起。最能化多為少。涼絡而易出。見點亦服此。

二十一日申刻
險兼逆痘二天。痘色焰紅。唇赤舌赤。見點繁瑣。三五成羣。毒參陽位。勉與涼血敗毒。

苦桔梗三錢

地龍三錢

連翹三錢

人中黃三錢

桃仁三錢

生石膏八錢

銀花五錢

犀尖五錢

白茅根三錢

丹皮三錢

生軍三錢

紫地丁五錢

此案爲鈔錄者失去十四帖。大意以犀角地黃湯加連翹銀花茅根細生地等一味涼血收功。至十五朝猶用犀角。十六朝以辛涼清餘熱。一方服至二十一朝。

暑傷兩太陰。身熱而嘔。舌白滑。

趙姑

十二歲

六月二

十二日

黃芩炭二錢

杏仁三錢

白蔻仁一錢

半夏三錢

生苡仁三錢

雲苓皮四錢

連翹三錢

藿葉二錢

銀花三錢

痘三天。頂平根鬆。色暗。夾虛夾毒之痘。與活血提頂敗毒。扶到七天。方好補托。

二十三日

苦桔梗三錢

紅花二錢

銀花三錢

人中黃錢半

白芷三錢

查炭二錢

大力子二錢

防風三錢

二十四日

紫草茸一錢 全當歸二錢 連翹三錢 紫地丁二錢
痘四天。頂平根鬆色暗。便閉不食。昨用活血敗毒宣絡。今夜已見大便。熱退能食。頭面已有起脹之勢。前後心續出盈千。皆根泛頂平。稍大者頂即陷。應照虛寒例治。與宣氣活絡提頂。不得過用敗毒清裏。致令便溏內陷。

當歸土炒二錢

廣皮炭二錢

穿山甲炒一錢

頂紅花二錢

廣木香一錢

藤菇一錢

白芷三錢

炒銀花三錢

炙甘草五分

防風二錢

查炭二錢

二十五日

痘五天。頂平帶陷。根鬆色暗。昨日即照虛寒例治。而用溫煦芳香。今日口並不渴。而舌苔白厚。盛暑之際。尚兼足太陰之暑溼。痘七日以前。外感用事。必視其何邪在何臟腑而清之。以爲七日以後上漿之地。

當歸土炒

廣皮炭二錢

生苡仁三錢

廣木香一錢

藏紅花

銀花四錢

白蔻仁一錢

六一散三錢

白芷

防風

茯苓皮三錢

煮四小杯。分四次服。頭煎五杯水煎兩杯。二煎五杯水煎兩杯。

二十六日 痘六天。頂平多陷。根鬆色暗。頭面之色已華。前後心尙多陷而暗。身痛口

不渴。與活血提頂。令其易於上漿。

當歸土炒

乳香二錢

銀花五錢

上紅花二錢

沒藥二錢

公雞冠血每杯點三匙

白芷三錢

廣皮三錢

生綿耆五錢

山甲三錢

廣木香二錢

炙甘草三錢

公雞湯煎煮三杯。分三次服。

二十七日

二十八日

七天已有行漿之勢。平頂陷頂尙多。加補托以助之。痘八天。頭面行漿已有七成。臂次於手。足次於胸。順也。胸以下陷頂多。面色灰。仍須溫煦以助行漿之勢。

綿黃耆八錢

高麗參三錢

炙甘草錢半

當歸土炒

廣木香三錢

防風三錢

上紅花二錢

廣皮三錢

雲苓塊三錢

白芷三錢

二十九日

痘九天。正在行漿之際。便頻眼開。即是虛象。黏連之處。顏色即灰。非虛而何。急急補托。而兼溫煦為要。

炙綿耆一兩

廣皮三錢

炙甘草三錢

人參三錢

廣木香二錢

雲苓塊三錢

白芷三錢

炒於朮三錢

防風三錢

肉果霜三錢

七月初一日

十天雖已結痂。漿未十分滿足。尙有正行漿之處。仍用前方。再爲補托。明日收痂未遲。

初二日

十一天。痘已結痂。漿未十分滿足之故。皆因連日便頻。受暑積滯而成。痂積。先擬溫下其積。今視四肢鼓立。胸前全陷。並非正結。恐一進沉降。並四肢而亦陷矣。前方係必不可不用之藥。茲且暫停。勉與實脾利水以收痂。少加化積。俟十四日之後。痘勢收場。如積滯未化。再與下法。

雲苓塊五錢連皮

黃芩炭錢半

炒神麴三錢

生苡仁五錢

南茶炭二錢

黃皮炭三錢

焦白朮二錢

檳榔二錢

益智仁二錢

枯山連一錢薑炒

初三日

痘十二天。仍服前原方。

初四日

痘十三天。業已結痂。原可妥當收功。不意盛暑流行之際。食物不化。致成

欲便先痛。便後痛減。裏急後重之痢疾。法當溫下。假使畏縮不前。拖延日久。必無好音。莫如乘此邪氣初聚之時。急奪其邪。冀邪去正存。方可收拾一切未完也。

白芍三錢

檳榔三錢

生大黃五錢酒炒半黑

炒黃芩三錢

查炭三錢

熟附子二錢

炒山連二錢

神麴四錢

廣皮炭三錢

小枳實三錢

赤芍桂錢半

煮成三杯。先服一杯。候一二時。俟其再便。腹不痛。即勿服。腹仍痛。再服第二杯。三杯亦如之。

初五日

痘十四天。四肢結痂。十有其五。昨日服藥後。腹痛愈甚。便中糞多積少。日夜共七八次。今用前方減附子一錢。桂心二分。服後已刻至未刻。便紅積二次。腹中仍痛。糞色如赭。後二杯即加赤桂心八分。約服一半杯。腹痛即便。紅積仍有。糞色黃。夜半服第三杯。寅時連便二次。糞色仍赭。微有紅積。腹仍微痛。

初六日

痘十五天。膝下至足趾。痂尚未結全。已刻便一次。燥糞黃色兼赭色。溏糞

微帶紅積。腹不痛。午刻服第一杯。至亥刻便一次。糞色黃無積。丑刻便一次。無積糞黃。

生苡仁五錢

黃芩炭錢半

高麗參三錢

雲苓五錢
連皮

南查炭二錢

炒神麴三錢

炒白芍二錢

廣皮炭三錢

檳榔二錢

山連薑一錢
炒

赤桂心錢半

炙甘草一錢

初七日 痘十六天。痂已結齊。痢已痊。可不必服藥。目帶微腫。穀精草泡茶飲之。

穀精草四兩

桑葉三錢

連翹三錢

茶菊花三錢

青箱子三錢

初九日

痘漿未足。毒流膽絡。故青睛白翳。又感時令燥氣化火。故白睛起太陰睛症。考古治法。治以六味丸作湯。改茯苓為君。再加清膽絡之熱毒以退翳。

雲苓塊四錢

山藥錢半

青箱子二錢

澤瀉錢半

穀精草三錢

萸肉錢半

真大生地二錢

茶菊花二錢

丹皮二錢

桑葉二錢

初十日 仍照前方服。加

生甘草一錢五分

銀花五錢

連翹三錢

目內白翳稍退。煩燥常哭。因痘後血虛化燥故也。與甘麥大棗湯主之。

生甘草錢半

小麥七合

大棗五枚

煮粥服之。

十一日 目內白翳仍有。身上起大小瘡數十粒。復生細痘。在舊痂窩內。痘漿未足。

流毒成瘡故也。仍服初九日方。

十二日 目內白翳退。太陰睛瘡仍在。瘡未見消落。原方再作服。

十三日 目內太陰睛瘡仍在。續出之瘡痘未退。仍服原方。瘡貼紫草膏加爛草灰。

十四日 藥原方。

十五日 停藥。

十六日 目內太陰睛瘡稍退。仍有翳。身上瘡已落痂者復生。小瘡未落之處。復有

倒漿欲潰。總之流毒未清之故也。原方再服。目內翳以四退散治之。

痘已滿月。目內太陰睛瘡未盡。翳仍在。仍服原方。又服錢氏蟬退散。一日

十七至
二十三

日 二服。

蟬衣爲末。每服一錢。羊肝湯下。日二服。

四退散 主治目睛老翳。

人退 蛇退 蟬退 雞退即鳳衣 每藥一兩。加梅片一分。左眼右鼻

聞。右眼左鼻聞。每聞少許。兩月後全愈。

體堅痘少。原可不必服藥。但痘愈少。漿更不可不足。舌苔厚。中黃邊白。且

與清毒一帖。明日再與托漿一帖。

趙姑
乙酉六
月十五
日

苦桔梗一錢

人中黃八分

銀花三錢

荷葉邊一角

牛蒡子錢半

全歸錢半

連翹三錢

明日服保元法。煮兩小杯。分二次服。

十六日 於前方內加

黨參三錢

生綿耆四錢

炙甘草一錢半

白芷五錢

十七日 辛涼結痂。古之正法也。實脾利水。亦有溼者所宜施也。茲當暑月。舌苔厚

而白。溼也。身熱未盡退。熱也。二法可合用。

連翹三錢 雲苓塊連皮 銀花三錢 生苡仁三錢
蘆根三錢

噎

王

左尺獨大。腎液不充。腎陽不安其位。尺脈以大爲虛。經所謂陰衰於下者是也。右手三部俱弦。食入則痛。經所謂陽結於上者是也。有陰衰而累及陽結者。有陽結而累及陰衰者。此證形體長大。五官俱露。木火通明之象。凡木火太旺者。其陰必素虛。古所謂瘦人多火。又所謂瘦人之病。慮虛其陰。凡噎症治法。必究陰衰陽結。何者爲先。何者爲後。何者爲輕。何者爲重。此症既係陰虛爲本。陽結爲標。何得妄投大黃十劑之多。雖一時暫通陽結。其如陰虛而愈虛。何業醫者豈不知數下亡陰乎。且雲岐子九法。大半皆攻。喻嘉言痛論其非。醫者豈未見之耶。愚謂因怒停食。名之食膈。或可一時暫用。亦不得恃行數用。今議五汁飲果實之甘寒。牛乳血肉之變化。降胃陰以和陽結。治其標。大用專翕膏峻補肝腎之陰。以救陰衰治其本。

再能痛戒惱怒。善保太和。猶可望愈。

真大生地四斤

人參四斤

杭白芍四斤

清提麥冬四斤

阿膠四斤

蔡龜膠四斤

山萸肉二斤

鱉甲四斤

芡實二斤

沙苑蒺藜四斤

海參四斤

鮑魚四斤

猪脊髓一斤

羊腰子三對

雞子黃六個

雲苓塊四斤

烏骨雞一對

牡蠣四斤

蓮子四斤

桂圓肉二斤

白蜜四斤

取盡汁久火煎煉成膏。

李
五十四
歲

大凡噎症由於半百之年。陰衰陽結。古來紛紛議論。各疏所長。俱未定宗。大抵偏於陽結而陰衰者。宜通陽氣。如旋覆代赭湯。進退黃連湯之類。偏於陰衰而陽結者。重在陰衰。斷不可見一毫香燥。如丹溪之論是也。又有食膈宜下。痰膈宜導。血膈宜通。絡氣膈宜宣。肝嘔吐太過而傷胃液者。宜牛轉草復其液。老僧寡婦。強制太過。精氣結而成骨。橫處幽門。宜鵝血以化之。廚役受穢濁之氣傷肺。酒肉勝食而傷胃。宜化清氣。不可勝數。按此

症脈沈數有力而渴。面色蒼而兼紅。甫過五旬。鬚髮皆白。其為平日用心太過。重傷其陰。而又伏火無疑。用玉女煎法。

真大熟地六錢

煨石膏八錢

牛膝三錢

炙甘草三錢

麥冬六錢

白粳米一撮

知母二錢

旋覆花三錢新
絳紗包

每早服牛乳一茶盃。

張六十三歲

老年陽結。又因久飲怒鬱。肝旺尅土。氣上阻咽。致成噎食。按陽氣不虛不結。斷非破氣可療。議一面通補胃陽。一面鎮守肝陰法。

洋參二錢

茯苓塊四錢

桂枝六錢

代赭石錢一兩二
煨

半夏一兩

旋覆花包五錢

生薑六錢

七帖。

二十日

陽脈已起。恐過痼其液。議進陰藥。退陽藥。

洋參四錢

桂枝三錢

白芍六錢

旋覆花六錢

茯苓三錢

炙甘草三錢

代赭石煨一兩

半夏六錢

薑汁三小匙

二十五日

前日脈數。因退陽進陰。今日脈緩而痰多。仍須進陽。俾中焦得運。以復其健順之體。

洋參二錢

桂枝六錢

焦白芍三錢

半夏二錢

茯苓八錢

代赭石六錢

旋覆花六錢

生薑五片

二帖。

傳五十五歲

先因酒樓中飲酒。食燒小猪響皮。甫下咽。即有家人報知朋友凶信。隨即下樓尋車。車夫不知去向。因步行四五里。尋至其友救難未遇。又步行四里。又未遇。渴急飲冰凍烏梅湯三碗。然後買車返家。心下隱隱微痛。一月後痛有加。延醫調治。一年不效。次年五月飲水一口。胃中痛如刀割。乾飯不下咽。已月餘矣。閏五月初八。計一粒不下已十日。骨瘦如柴。面赤如赭。脈沈洪有力。胃中痛處高起如桃大。按之更痛。余曰。此食膈也。當下之。因用大承氣湯加牽牛。作三碗。一碗痛至少腹。三盃痛至肛門。大痛不可忍。又不得下。於是又作半劑。服一碗。外加蜜導法。始下如鴨蛋。黑而有毛。堅不可破。次日先吃爛麵半碗。又次日飲粥湯。三日食粥。五日吃乾飯矣。下

後所用者。五汁飲也。

楊四十六歲

先因微有痰飲咳嗽。誤補於前。誤下於後。津液受傷。又因肝鬱性急。致成噎食。不食而大便燥。六脈弦數。治在陰衰。

炙甘草三錢

大生地六錢

生阿膠化三錢

丹皮三錢

麥冬三錢

麻仁三錢

鬱金八分

服七帖而效。又於前方加

鱉甲四錢

枸杞子三錢

服十七八帖而大效。進食如常。惟餘

痰飲。後以外台茯苓散減廣皮枳實收全功。

嘔吐

舊有痰飲。或發嘔吐。仍係痰飲見證。醫者不識。乃用苦寒堅陰。無怪乎無可存之物矣。議食入則吐。是無火例。

金六十八歲
癸酉三月二十日

淡吳萸五錢

生苡仁六錢

乾薑五錢

薑汁每次沖

半夏八錢

廣皮三錢

二十三日

五杯水。煮取二杯。分二次服。渣再煮一杯。服一帖。前方業已見效。但脈遲緊。與通養胃陽。

淡吳萸三錢

生薑五片

苡仁三錢

人參錢半

茯苓二錢

半夏三錢

不拘帖。

恆氏二十七歲

初因大驚。肝氣厥逆。嘔吐頻仍。復因誤補。大嘔不止。嘔急避人以剪刀自刎。漸即米粒不下。體瘦如柴。奄奄一息。仍不時乾嘔。四肢如冰。脈弦如絲。而勁。與烏梅丸法。

川椒炭四錢

黃芩炭一錢

薑汁三匙

半夏四錢

雅連二錢
薑汁炒

烏梅肉五錢

遼參三錢

吳萸三錢

雲苓塊五錢

服二帖而進米飲。四帖而食粥。七帖全愈。後以兩和肝胃到底而大安。

反胃

周
六十五
歲

老年陽微濁聚。以致胸脾反胃。三焦之陽齊閉。難望有成。議先通胸上清

陽。

甲子十
月二十
五日

栝 薑二錢

薤 白三錢

半 夏五錢

白 蜜半酒

桂枝尖五錢

小枳實八分

川 樸一錢

茯 苓二錢

薑 汁三小

水八杯。煮取三杯。分三次服。

三十日

老年陽微濁聚。反胃胸痺。用開清陽法。業已見效。但嘔痰仍多。議食入則

吐爲無火例。用茱萸湯合大半夏湯。

淡吳萸八錢

洋 參三錢

生白蜜一酒

生 薑二錢

水八杯。煮取三杯。分三次服。渣再煮半盃服。

初三日

即於前方內加

茯苓塊五錢

初十日

即於前方去吳萸。加

薤白三錢

噦

王三十歲
癸亥六月十五日

六脈俱濡。右寸獨大。溼淫于中。肺氣貫鬱。因而作噦。與傷寒陽明足太陰之寒噦有間。以宣肺氣之痺為主。

廣皮二錢

生苡仁三錢

杏泥三錢

通草二錢

柿蒂三錢

竹茹三錢

飛滑石三錢

薑汁二小匙冲入

十七日

泄瀉胸悶。於前方加

茯苓三錢

藿梗二錢

十九日

脈之濡者已解。寸之大者已平。惟胃中有飲。隔拒上焦之氣。不得下通。故於其旺時而噦甚。今從陽明主治。

半夏六錢

飛滑石三錢

茯苓五錢

生苡仁

廣皮

柿蒂

二十二日

噦雖止而六脈俱數。右手更大。泄瀉色黑。舌黃。氣分溼熱可知。

茯苓皮	五錢	白通草	二錢	黃芩炭	一錢	澤瀉	三錢
滑石	三錢	生苡仁	三錢	白扁豆皮	三錢	川樸	一錢
連翹	二錢						

失音

朱
乙丑二
月初二
日

右脈洪數有力。金實無聲。麻杏石甘湯證也。奈已為醫發汗。麻黃未便再用。議清音湯加石杏。

苦桔梗	六錢	生甘草	二錢	牛夏	六錢	葦根	五錢
石膏	六錢	杏仁粉	五錢				

水五杯。煮兩杯。渣再煮一杯。三次服。

初三日

肺臟本熱。為外感所搏。實而無聲。究係麻杏石甘法為速。

生石膏	一兩	麻黃	五錢	炙甘草	三錢	杏仁	六錢
半夏	五錢						

初四日

右脈洪數已減其半。音亦漸開。仍用麻杏石甘加半夏一帖。

沈
二十歲
正月二十九日

麻黃三錢去節
半夏七錢

炙甘草三錢

杏仁霜七錢

生石膏一兩研末

甘瀾水八碗。煮三碗。分三次服。以後病減者減其治。

六脈弦細若絲。陽微極矣。咳嗽便澹。納食不旺。由上焦損及中焦。所以致損之由。初因遺精。繼因秋傷於溼。冬必咳嗽。外邪未清。驟然用補。使邪無出路。致咳嗽不已。古謂病有三虛一實者。先治其實。後治其虛。現在喉啞治實。先與提肺氣。治虛與諸虛不足之小建中湯。

苦桔梗四錢

杏仁二錢

雲苓五錢

生甘草二錢

生苡仁五錢

薑半夏四錢

煮兩杯。分二次服。

六脈弦細之極。陰陽俱損。急需用補。以外感未淨。喉音未清。暫與理肺二帖。後再診。

苦桔梗二錢

甜杏仁四錢

薑半夏三錢

生甘草二錢

茯苓四錢

冰糖四錢

鮮蘆根四錢

煎三小杯。分三次服。

酒客失音。與麻杏石甘湯。

朱四十五歲

麻黃五錢

生石膏四兩

炙甘草三錢

杏仁四錢

服一帖無汗。音不出。二帖微汗。音出不甚響。仍用前法。

麻黃三錢

生石膏三兩

炙甘草三錢

杏仁四錢

服五帖音大出。但脈滑耳。與清音湯。

草桔梗六錢

炙甘草二錢

薑半夏六錢

服五帖音清。脈滑痰飲不盡。與外臺茯苓飲法。減辛藥。

茯苓八錢

半夏五錢

麥冬五錢

沙參三錢

小枳實錢半

廣皮二錢

甘草錢半

七帖而安。

歌唱勞傷。肺火喉啞。

軟兒十五歲

洋參一兩

鮑魚四兩

早晚各取鮑魚片二錢。洋參五分。煎湯頓服。歌時取洋參鮑魚各一片。

又十六歲

貼牙後腮間。嚥其津液。以後不復啞矣。
飲酒過度。貪食水果。寒熱相搏。溼熱內壅。

苦桔梗

甘草

茯苓

蘇梗

半夏

神麵

蘆根

數帖而安。

水氣

蘭女十四歲

脈數。水氣由面腫至足心。經謂病始於上而盛於下者。先治其上。後治其下。議腰以上腫當發汗例。越婢加朮湯法。

麻黃

去節五錢

杏仁

泥五錢

炙甘草一錢

白朮

三錢

石膏

六錢

桂枝

三錢

水五杯。煮取兩杯。先服一杯。得汗即止。不汗再服。

麻黃

去節三錢

生石膏

八錢

杏仁

泥五錢

炙甘草二錢

桂枝

二錢

生薑

三片

大棗

二枚

桂枝八錢

夏薑三錢

老川樸三錢

廣皮二錢

水八碗。煮取三碗。再煮一碗。四次服。以小便利爲度。

初九日

腫脹胸痞。用半夏瀉心湯法。俟痞愈再服前方。

半夏

乾薑

山連

生薑

黃芩

二十六日

前因中焦停飲咳嗽。轉用溫藥。今雖飲咳見效。小便究未暢行。脈之沈部洪較有力。症本經中生熱。又有酒毒。仍涼利小便之苦辛淡法。

杏仁四錢

飛滑石六錢

雲苓皮五錢

白通草一錢

晚蠶砂三錢

黃柏炭二錢

桑皮三錢

生苡仁四錢

海金砂五錢

白蔻仁錢半

半夏二錢

二十八日

風水已愈其半。復感風寒。身熱頭痛雖減。身半以上復腫。口渴。浮脈數。仍與越婢加朮法。

麻黃五錢

杏仁五錢

生石膏末二兩

桂枝三錢

炙甘草二錢

蒼朮三錢

二十九日

煮三杯。先服一杯。得微汗即止。

風水汗後。脈洪數。渴而停水。腫水全消。尤宜涼開膀胱。

生石膏末二兩

飛滑石六錢

杏仁五錢

半夏三錢

雲苓皮五錢

枳實四錢

生苡仁三錢

晚蠶砂三錢

廣皮三錢

白通草一錢

白蔻仁二錢

益智仁三錢

猪苓三錢

海金沙五錢

初一日

改前方去石膏。

初三日

水腫未全消。脾陽不醒。食不能磨。糞後見紅。

竈心土二兩

小枳實二錢

南蒼朮三錢

生苡仁五錢

熟附子二錢

杏仁五錢

海金沙四錢

白通草一錢

茯苓炭一錢

飛滑石五錢

初五日

小便猶不甚長。胃中得熱物微噎。右脈滑數。

杏仁五錢

小枳實二錢

雲苓皮五錢

海金沙五錢

飛滑石五錢

苡仁三錢

草薢三錢

廣皮炭二錢

初七日 小便仍未通暢。右脈數大未退。仍宜涼肺以開膀胱。

川 樸二錢

木 通一錢

益智仁一錢

杏 仁五錢

桑 皮三錢

雲苓皮五錢

晚蠶砂三錢

苡 仁四錢

川 樸二錢

飛滑石六錢

大腹皮二錢

通 草一錢

海金砂六錢

白蔻仁錢半

初九日 腫未全消。又發痰飲。咳嗽。表通則小便長。右脈洪數。議照溢飲例。與大青龍湯。

麻 黃三錢

桂 枝四錢

雲 苓五錢

皮半塊細

杏 仁五錢

生石膏一兩

半 夏五錢

炙甘草三錢

生 薑三錢

大 棗二枚

十一日 咳減。小便數而欠。渴思涼飲。鼻衄。肺熱之故。

麻 黃三錢

小枳實三錢

生石膏四兩

炙甘草三錢

半 夏五錢

桂 枝五錢

杏 仁六錢

生 薑三片

雲苓皮三錢

大 棗二枚

十三日 腰以下腫已消。腰以上腫尚重。兼紐。與治上焦法。

麻黃三錢去節

白茅根三錢

生石膏四兩

杏仁五錢

半夏五錢

苡仁五錢

蘆根五錢

茯苓皮五錢

通草錢半

十五日 腫減咳增。脈洪數。紐未止。

麻黃三錢炙

蘆根五錢

杏仁八錢

白通草一錢

飛滑石六錢

生石膏四兩

苡仁三錢

白茅根三錢

旋覆花三錢

半夏三錢

十七日

咳雖減。脈仍滑數。腫未全消。

蘇葉三錢連梗

葶藶三錢炒

杏仁六錢

茯苓皮三錢

生石膏四兩

半夏五錢

飛滑石六錢

海金沙五錢

福二十四歲

初因愛飲冰凍黃酒。與冰糖冰果。內溼不行。又受外風。從頭面腫起。不能臥。晝夜坐被上。頭大如斗。六脈洪大。先以越婢湯發汗。腫漸消。繼以調理脾胃藥。服至一百四十三帖而愈。囑戒猪肉黃酒水果。伊雖不飲。而冰凍

水果不能戒也。一年後糞後便血如注。與金匱黃土湯。每劑黃土用一斤。附子用八錢。服至三十餘劑而血始止。後與溫補脾陽至九十帖而始壯。風水腫脹。

范十八歲

麻黃去六錢

生石膏四兩

杏仁五錢

桂枝三錢

生薑三錢

大棗二枚

炙甘草三錢

一帖而汗解。頭面腫消。次日與宣脾利水。五日全愈。戒其避風不聽。後八日復腫如故。仍與前法而愈。後受規戒。方不再發。腫從頭面起。

周十八歲

麻黃去六錢

杏仁五錢

炙甘草三錢

生石膏一兩

桂枝三錢

蒼朮三錢

服一帖分三次。汗出不至足。次日又服半劑。腫全消。後以理脾全愈。

寒溼

郭三十二

太陰中溼。病勢沈悶。最難速功。非極剛以變脾胃兩傷不可。

歲六月初二日

生茅朮四錢

半夏六錢

川樸四錢

生草果三錢

椒目三錢

桂枝五錢

小枳實三錢

生苡仁五錢

廣皮三錢

茯苓皮五錢

生薑一兩

煮三碗。分三次服。

十七帖。

二十九日 寒溼為病。誤用硝黃。致濁陰蟠踞。堅凝如石。苟非重剛。何以直透重圍。

安邊桂二錢

熟附子五錢

生草果二錢

川樸四錢

黑川椒炒四錢

茯苓皮五錢

猪苓三錢

澤瀉三錢

通草二錢

生苡仁五錢

廣皮三錢

乾薑四錢

小茴香三錢

煮四碗。四次服。共服十三帖而後脈轉。

痺

崑氏 風溼相搏。一身盡痛。既以誤汗傷表。又以誤下傷裏。渴思涼飲。面赤舌絳。

二十六歲

得飲反停。脅脹胸痛。皆不知病因而妄治之累。痺也。議木防己湯。兩開表裏之痺。

桂枝六錢

防己四錢

生石膏一兩

炙甘草三錢

杏仁四錢

蒼朮五錢

生香附三錢

四次服。

十二日

脅脹止而胸痛未愈。於前方加薤白廣皮。以通補胸上之清陽。

薤白三錢

廣皮三錢

十四日

痺症愈後。胃不和。土惡溼也。

半夏一兩

茯苓五錢

廣皮三錢

秫米二合

生薑三錢

水五碗。煮兩碗。渣再煮一碗。三次服。

十六日

痺後清陽不伸。右脅痠痛。

半夏六錢

廣皮二錢

青皮錢半

烏藥二錢

薤白三錢

桂枝二錢

吳萸一錢

鬱金二錢

煮兩杯。渣再煮一杯。三次服。

行痺。

吳十一歲

防己二錢

桂枝三錢

炙甘草一錢

杏仁三錢

茯苓皮二錢

生石膏五錢

片薑黃錢半

海桐皮錢半

牛膝錢半

生苡仁三錢

風溼。

張二十五歲

羌活三錢

桂枝二錢

杏仁三錢

炙甘草一錢

十一月十五日

苦桔梗三錢

生薑三片

陳皮二錢

半夏二錢

蘇葉三錢

十六日

風溼相搏。一身盡痛。汗之不解。用麻黃加朮法。

麻黃去節

杏仁五錢

蒼朮五錢

桂枝三錢

羌活錢半

炙甘草三錢

生薑三片

又

於前方內加

熟附子三錢

胡

十八歲
四月十日
九日

半帖而愈。

跗踵。右脈洪數。痰多咳嗽。口渴。莖中痛。與涼利小便法。

生石膏八錢

甘草梢錢半

半夏三錢

滑石六錢

苡仁五錢

雲苓皮五錢

海金沙五錢

四帖。

五月初六日

脈之洪數者減。去石膏二錢。加

廣皮三錢

杏仁三錢

十一日

溼熱傷氣。氣傷則小便短。汗多必渴。溼聚則跗踵。與猪苓湯去阿膠。加銀花以化溼熱。濕熱化則諸證皆愈。

猪苓四錢

雲苓皮五錢

銀花三錢

澤瀉三錢

滑石六錢

二十日

溼熱不攘。下注腿腫。小便不利。莖中痛。

草薢五錢

猪苓三錢

甘草梢錢半

雲苓皮五錢

澤瀉三錢

飛滑石六錢

苡仁三錢

木通二錢

晚蠶砂三錢

服至小便暢為度。

二十四日
七月初四日

脈洪數。小便反黃。加黃柏、滑石。莖痛止。去甘草。小便已長。腫未全消。脈弦滑。咳嗽多痰。

半夏六錢

生苡仁五錢

廣皮四錢

雲苓塊五錢

猪苓三錢

草薢五錢

澤瀉三錢

張二十歲
七月十九日

身熱頭痛。腰痛。肢痛。無汗。六脈弦細。兩目不明。食少。寒溼痺也。

熟附子三錢

川烏頭二錢

羌活二錢

桂枝五錢

澤瀉三錢

苡仁五錢

廣皮三錢

防己三錢

雲苓皮五錢

杏仁五錢

二帖。

五月初三日

服前方二帖。頭痛止。旋即誤服他人補陰之品。便澹腹脹。今日復診。因頭痛愈。用原方去羌活。治藥逆。加

厚樸三錢

已服三帖。

初八日 痺症已愈。頗能健步。便溏泄瀉皆止。目已復明。胃口較前加餐。因服一帖。脈稍數。寒溼有化熱之象。當與平藥。逐其化熱之餘邪而已。

雲苓皮 五錢

防己 二錢

滑石 六錢

桑枝 五錢

澤瀉 三錢

晚蠶砂 三錢

苡仁 五錢

杏仁 二錢

又感受暑溼。泄瀉。脈弦。腹脹。與五苓法。

桂枝 五錢

澤瀉 三錢

雲苓皮 五錢

蒼朮 三錢

大腹皮 三錢

廣木香 二錢

猪苓 四錢

廣皮 三錢

苡仁 五錢

煮三杯。三次服。

太陽寒痺。脈弦。背心板着而痛。

桂枝 五錢

雲苓皮 五錢

防己 三錢

川椒炭 三錢

川烏頭 三錢

白通草 一錢

生苡仁 五錢

服前藥已效。而背痛難除。加

趙氏 四十七歲 六月二十日 二十五日

附子二錢

七月初二日

脈已回陽。痛未止。每日服半帖。六日三帖。加

木通三錢

晚蠶砂四錢

初九日

脈仍小。陽未回。背仍痛。再服三帖。分六帖。

趙三十一歲

痺症夾伏。溼脹痛。且有肥氣。溼已化熱。故六脈洪滑。本寒標熱。先治其標。本當緩治。

五月初六日

生石膏四兩

防己四錢

半夏五錢

杏仁六錢

桂枝六錢

川樸五錢

廣皮四錢

初十日

尺脈洪數更甚。加

黃柏三錢

木通三錢

雲苓皮六錢

十二日

尺脈仍洪。腹痛欲便。便後肛門熱痛。原方再服二帖。

十六日

水停心下。漉漉有聲。暫與逐水。無暇治痺。

廣皮五錢

半夏六錢

枳實六錢

生薑五錢

甘瀾水八茶杯。煮成三小杯。三次服。

十九日 水響退。腹脹甚。仍服前方去黃柏。加大腹皮。
二十三日 痺少減。胃不開。其人本有肥氣。肥氣成於肝鬱。暫與兩和肝胃。

半 夏六錢 降香末三錢 廣皮三錢 益智仁二錢

青皮二錢 川樸三錢 香附三錢 雲苓塊五錢

六月初三日 右脈大而數。加黃芩二錢。去川樸。
初五日 諸症向安。脈亦調適。胃口亦開。以調理脾胃立法。

雲苓塊五錢 白蔻仁錢半 苡仁五錢 黃芩炭二錢

廣皮二錢 半夏五錢

二十日 誤服西瓜寒冷。未有不發停飲者。

公丁香八分 半夏五錢 益智仁錢半 乾薑三錢

白蔻仁一錢 廣皮三錢 雲苓五錢 小枳實三錢

寒痺。脈弦短澀而緊。由腿上連少腹。痛不可忍。甚至欲厥。兼有痰飲胃痛。

桂枝六錢 廣皮三錢 防己四錢 川烏頭三錢

川椒炭三錢 小茴香炒三錢 雲苓皮五錢 片薑黃三錢

錢三十四
歲五月二十九日

六月初一日

生苡仁五錢 海桐皮三錢

左脈稍長。仍然緊甚。再服二帖。

丸方 寒溼為病。

草 薢 四兩 小茴香 炒 四兩 川椒炭 三兩 苡 仁 八兩

蒼 朮 炒 六兩 雲苓皮 八兩 川棟子 三兩 熟附子 二兩

木 通 四兩

共為細末。神麴糊丸。小梧子大。每服三錢。薑湯下。

楊氏

二十六

歲

乙酉

正月初七

日

前曾崩帶。後得痿痺。病者自疑虛損。詢病情寒時輕熱時重。正所謂經熱則痺。絡熱則痰者也。再行經有紫有黑。經來時不惟腰腿大痛。少腹亦痛。經亦不調。或多或寡。日數亦然。此不但溼熱。且有瘀血。治溼熱用湯藥。治瘀血用丸藥。左脈浮取弦沈取洪。右脈浮取弦沈取洪。湯藥用諸痺湯。取太陰法。丸藥用化癥回生丹。

生石膏 二兩 桂 枝 四錢 通 草 一錢 杏 泥 五錢

雲苓皮 五錢 片薑黃 三錢 防 己 四錢 晚蠶砂 三錢

海桐皮三錢

苡仁五錢

煮三杯。三次服。

岳
四十六歲

暑溼痺症。誤以熟地等柔藥滑脾。致令泄瀉。臥牀不起。兩足蹇曲不伸。飲食少進。兼之疝痛。先以五苓散。加川椒、廣皮、木香。止其泄。繼以半夏、廣皮、良薑、益智、白蔻。開其胃。復以丁香、川椒、吳萸、雲苓、苡仁、薑黃。平其疝。又以防己、杏仁、桂枝、烏頭、苓皮、川椒。等伸其痺末。惟引痛風在筋也。重用。地龍、桂枝。引痛亦止。後補脾胃而愈。

王
四十六歲

寒溼爲痺。背痛不能轉側。晝夜不寐。二十餘日。兩腿拘攣。手不能握。口眼歪斜。煩躁不寧。畏風自汗。脈弦。舌苔白滑。面色昏暗。且黃。睛黃。大便閉。先以桂枝、杏仁、苡仁、羌活、廣皮、半夏、茯苓、防己、川椒、滑石。令得寐。繼以前方去川椒、羌活。加白通草、蠶砂、草薢。得大便。一連七八日均如黑蛋子。服至二十餘劑。身半以上稍輕。背足痛甚。於前方去半夏。加附子、片薑黃、地龍、海桐皮。又服十數帖。痛漸止。又去附子、地龍。又服十數帖。足漸伸。後服二妙丸。加雲苓、苡仁、草薢、白朮。等藥收功。

何二十六歲

手足拘攣。誤服桂附人參熟地等補陽。以致面赤。脈洪數。小便閉。身重不能轉側。手不能上至鬢。足蜷曲。絲毫不能移動。細詢病情。因大飲酒食肉。而然。所謂溼熱不攘。大筋軟短。小筋弛長。軟短為拘。弛長為痿者也。與極苦通小腸。淡滲利膀胱法。

龍膽草四錢

蘆薈三錢

胡黃連三錢

生石膏八兩

地龍三錢

白通草二錢

茯苓皮六錢

飛滑石一兩

穿山甲三錢

桑枝五錢

杏仁三錢

晚蠶砂四錢

防己五錢

前方服至七日後。小便紅黑而濁。臭不可當。半月後手漸動。足漸伸。一月後下牀扶桌椅能行。四十日後走至簷前。不能下階。又半月始下階。三月後能行四十里。後因痰飲。用理脾收功。此症始於三月二十三日。至八月二十二日停藥。

周四十二歲

兩腿紫絳而腫。上起細瘡如癩。已三年矣。兩腿足酸痛不能立。六脈弦細而緊。寶氏扁鵲新書。謂之蘇木腿。蓋寒溼着痺也。

附子八錢

烏頭六錢

苡仁一兩

桂枝一兩

雲苓皮一兩

煮四杯。分四次服。服三十餘帖而始策杖能行。後去烏附。用通經活絡滲溼而愈。

成五十四歲

腰間痠軟。兩腿無力。不能跪拜。間有腰痛。六脈洪大而滑。前醫無非補陰。故日重一日。此溼熱痿也。與諸痿獨取陽明法。

生石膏四錢

海桐皮二錢

晚蠶砂三錢

白通草二錢

生苡仁八錢

雲苓皮五錢

防己四錢

杏仁四錢

桑枝五錢

草薢五錢

飛滑石一兩

前後共服九十餘帖。病重時自加石膏一倍。後用二妙丸收功。肝鬱挾痰飲。腎水上凌心。心悸短氣。腹脹胸痺。六脈反沈洪。水極而似火也。與蠲痰飲伐邪兼降肝逆法。

薑夏八錢

降香末三錢

小枳實五錢

桂枝五錢

茯苓塊一兩

蘇子霜三錢

廣皮四錢

川椒炭三錢

趙四十五歲
乙酉正月十五日

生薑汁每杯三匙

旋覆花三錢

甘瀾水煮四杯。分早中晚夜四次服。戒生冷猪肉鹹菜。
四帖。

二十日

痰飲夾痺。腎水上凌。心驚悸短氣。腰脊痺痛。皆太陽所過之地。小便短而腹脹。肚臍突出。是內而藏腑。外而經絡。無不痺者。且開太陽之痺。脈洪大。與大青龍合木防已湯法。

桂枝五錢

半夏五錢

雲苓皮六錢

生石膏四兩

苡仁五錢

川樸三錢

防己四錢

廣皮三錢

枳實五錢

杏仁四錢

滑石六錢

白通草錢半

煮三杯。三次服。

二十一日

於前方內加

晚蠶砂三錢

飛滑石四錢

二十三日

外而經絡之痺。內而藏腑之痺。行痰開痺。俱不甚應。現在脈洪數。少腹脹。小便短濁而臭。先與開支河。使溼熱有出路。再商後法。

川草薺三錢

飛滑石 錢半

海金砂 五錢

雲苓皮 五錢

猪苓四錢

小茴香三錢

白通草 錢半

澤瀉三錢

二帖。

二十五日

加去陳莖法。

兩頭尖三錢

半夏五錢

二帖。

二十九日

痺症夾痰飲。六脈洪大。溼已化熱。屢利小便不應。非重用石膏宣肺熱不可。諸痺獨取太陰也。

生石膏 四兩

雲苓皮 五錢

白通草 一錢

杏仁 五錢

桂枝 五錢

滑石 二兩

羌活 一錢

黃柏 四錢

防己 五錢

苡仁 五錢

晚蠶砂 三錢

四帖。

二月初四日

痺症十年。誤補三年。以致層層固結。開之非易。石膏用至二斤有餘。脈象方小其半。現在少腹脹甚。而小便不暢。腰痛胸痛。邪無出路。必得小便暢

行。方有轉機。

老川樸五錢

木通六錢

防己五錢

杏仁六錢

枳實五錢

生石膏四兩

桂枝六錢

雲苓皮一兩

滑石四錢

小茴香三錢

以後脈大而小便不利。用此小便利。去滑石。

初五日

大用石膏。六脈已小。經謂脈小則病退。蓋脈爲病之帥。脈退不患病不退。經又謂脈病人不病者死。人病脈不病者生。現在病歸下焦血分。其人本有肝鬱。暫退下焦血分。

桂枝六錢

雲苓皮一兩

黃柏三錢

防己六錢

木通四錢

廣皮三錢

全歸三錢

小茴香六錢

小枳實五錢

海桐皮三錢

川椒炭三錢

初六日

脈復洪大。加

石膏三兩

滑石一兩

初七日

加

厚 樸三錢

薑 夏五錢

丸方 痺症夾痰飲。痧瘕。六脈洪大。用諸痺獨取太陰法。脈洪大者小。難經所謂人病脈不病者生。但脈雖平而瘕脹痺痛未除。議以爲藥散退瘕痺之所難退者。以久病在絡故也。再以丸藥緩通脈絡法。脈若復大。仍服前方數帖。見小卽止。

蠅螂蟲一兩

歸 鬚四兩

兩頭尖二兩

穿山甲三兩

降香末三錢

小茴香炒三兩

海桐皮三兩

乳 香一兩

片薑黃三兩

麝 香三錢

地 龍去泥一兩

川棟子炒三兩

共細末。酒水各半爲丸。每服二錢。日二三次。從此服蠅螂丸起兩月而止。

三月二十四日

痺症夾痰飲。脈本洪數。前用辛涼脈減。兼用通絡散。瘕丸散亦效。現在六脈中部仍洪。但不數耳。議暫用辛涼宣肺。

生石膏四兩

小枳實四錢

桂 枝八錢

杏 仁八錢

防 己六錢

廣 皮二錢

雲苓塊一兩

全 歸三錢

二十六日 診右脈更大。小便反短。用苦辛淡法。於前方內加
半 夏八錢 飛滑石二兩 海桐皮三錢

四月十六日 痺痛夾痰飲。
炒黃柏三錢

生石膏八錢 苡仁五錢 防己四錢 雲苓皮五錢
杏仁五錢 蠶砂三錢 桂枝五錢 白通草錢半
半夏五錢 廣皮三錢

煮三杯。三次服。

十七日 內而脅痛。外而腰痺痛。是氣血兼痺也。

桂枝尖五錢 歸鬚二錢 白薏仁錢半 杏仁五錢
雲苓皮三錢 片薑黃二錢 旋覆花包三錢 防己三錢
生苡仁三錢 小枳實四錢 半夏四錢 鬱金二錢
廣皮三錢

二十五日 痰飲踞於中焦。痺痛結於太陽。氣上冲胸。二便不利。

桂枝八錢

薑半夏五錢

通草錢半

雲苓塊二兩

防己六錢

杏仁八錢

枳實六錢

廣皮三錢

滑石六錢

煮四杯。四次服。

五月初三日

大凡腹脹之疾。不責之太陰。即責之厥陰。此症自正月以來。開太陽之藥。未有不泄太陰者。他症雖減其半。則尚未除。其故有三。一者病起肝鬱。二者肝主疏泄。誤補致壅。三者自正月以來。以右脈洪大之故。痺症甚重。治在肺經。經有諸痺。獨取太陰之明訓。茲右脈平而左脈大。不得着於前議。暫與泄厥陰之絡。久病在絡故也。

旋覆花包五錢

黃芩三錢

歸鬚三錢

老川樸五錢

杉皮三錢

半夏五錢

小枳實五錢

晚蠶砂三錢

廣皮三錢

鬱金三錢

蘇子霜三錢

降香末三錢

煮三杯。三次服。

二十三日

左脅痛脹。臥不着席。胸亦悶脹。氣短。肝脈絡胸之故。

六月初一日

新絳紗三錢

香附四錢

半夏五錢

旋覆花包三錢

歸鬚三錢

小枳實四錢

蘇子霜三錢

降香末三錢

鬱金三錢

廣皮三錢

川椒炭四錢

青皮三錢

煮三大杯。三次服。七帖。

痰飲肝鬱。脈弦細。氣上冲胸。

旋覆花四錢

枳實三錢

公丁香二錢

蘇子霜三錢

半夏六錢

片薑黃三錢

降香末三錢

鬱金三錢

青皮三錢

廣皮五錢

桂枝尖三錢

煮三杯。三次服。

初三日

痰飲上泛。咳嗽稀痰。兼發痺症。

桂枝六錢

防己六錢

杏仁五錢

川烏頭三錢

雲苓皮五錢

枳實四錢

廣皮五錢

桂心二錢

苡仁三錢

白通草二錢

滑石四錢

黃柏炒三錢

煮三杯。三次服。

初六日

小便不暢。下焦溼聚。於原方加滋腎丸法。

十一日

痺症未盡除。痰飲未全消。當盛暑流行之際。逐飲開痺。即所以防暑。

雲苓塊六錢

小枳實二錢

半夏六錢

防己三錢

生苡仁六錢

杏仁三錢

廣皮二錢

桂枝三錢

煮三杯。三次服。

十三日

暑泄。腹脹。舌黃。其人本有痰飲痺症。議五苓加減。

桂枝三錢

猪苓四錢

澤瀉四錢

雲苓皮五錢

滑石六錢

川樸三錢

杉皮三錢

木香錢半

半夏三錢

藿梗三錢

白蔻仁三錢

川椒炭二錢

真山連一錢

十五日

脈緩。服前方。

十六日

脈緩甚。服前方。

二十一日

久病在絡。其本病統俟丸藥立方。但逐痰飲。宣氣化溼。捍時令之暑溼而已。

六月二十七日

半夏六錢 雲苓塊五錢 生香附三錢 川樸二錢
廣皮三錢 杉皮三錢 大腹皮三錢 小枳實三錢

煮三杯。三次服。

服化癥回生丹起。每日一丸。
脈浮。筋骨酸痛。氣短。五心煩熱。新感暑溼之氣。加以辛涼。與三焦。

連翹三錢 苡仁五錢 銀花三錢 白蔻仁二錢

藿香葉三錢 杏仁三錢 廣皮三錢 小枳實三錢

煮三杯。三次服。

七月初二日

背痛甚。先與通太陽之痺。

桂枝六錢 枳實五錢 防己五錢 雲苓皮八錢

半夏五錢 杏仁三錢 川椒炭二錢

煮三杯。三次服。亥初令完。

初九日 近日陰雨連綿。背痛腹脹不減。二便不爽。非嘔則噦。脈小於前。與宣痺開

鬱兼去陳莖

桂枝八錢

茯苓八錢

白通草錢半

川樸五錢

公丁香三錢

防己六錢

杏仁六錢

晚蠶砂三錢

小茴香三錢

枳實五錢

白蔻仁三錢

煮四杯。四次服。

日二十一

寒溼發痺。脈緩甚。中有痰飲。

桂枝六錢

茯苓六錢

白通草錢半

防己五錢

苡仁四錢

薤白三錢

枳實三錢

杏仁四錢

熟附子二錢

川烏頭二錢

廣皮五錢

草薢五錢

片薑黃三錢

煮三杯。三次服。已服五帖。

日二十八

脈弦緊。痰飲痺症癥瘕。因燥氣而發。臟腑經絡俱痺。故肢冷而畏寒也。峻與通陽。

桂枝一兩

廣皮六錢

歸鬚二錢

防己五錢

小枳實四錢

杏仁五錢

半夏三錢

穿山甲一錢

澤瀉三錢

公丁香三錢

川椒炭五錢炒

片薑黃三錢

煮四杯。四次服。

十二月
初十日

自六月二十六日起。每日空心服化癥回生丹一九。七月二十九以後。每晚服天台烏藥散三分五分一錢二錢不等。至十月十二日。每兩烏藥散中加巴霜一分。每晚服三分五分不等。間有服至一錢者。十一月初一日以後。每晚間服奇經丸。痺痛。飲咳。脈弦細。

桂枝八錢

苡仁五錢

滑石四錢

川烏頭三錢

雲苓皮六錢

枳實三錢

川草薢五錢

杏仁四錢

防己五錢

川椒炭三錢

十二日

衝氣上動畏寒。脈沈細。與桂枝加桂湯法。直伐衝氣。

桂枝尖一兩二錢

紫石英六錢研

雲苓塊三兩

搖桂心八錢

小茴香五錢

煮成四杯。分四次服。

十三日

大寒節衝氣未止。脈反弦緊。於前方內加

當歸四錢

川芎三錢

服二帖。脈中陽氣生動。衝氣平。畏寒止。仍然早服化癥回生丹。晚服奇經丸三錢。

風淫

陶

三十歲
乙酉六月初二日

風淫末疾。兩手發軟。不能持物。脚亦有時而軟。脈弦數。治以辛涼。

薄荷錢半

桑葉三錢

全歸錢半

連翹三錢

麥冬三錢

丹皮三錢

銀花三錢

菊花三錢

細生地四錢

服八帖。

痰飲

周

內而暑淫。外而新涼。內外相搏。痰飲斯發。

四十歲
壬戌八月二十
五日

杏仁粉三錢

白通草三錢

廣皮二錢

生苡仁五錢

飛滑石三錢

小枳實二錢

半夏五錢

川樸三錢

生薑三片

桂枝木三錢

茯苓皮三錢

二十八日

支飲射肺。眩冒。小青龍去麻辛。

桂枝四錢

白芍三錢

焦於朮三錢

乾薑二錢

製五味一錢

生薑三片

半夏六錢

杏仁粉五錢

小枳實二錢

生苡仁五錢

炙甘草二錢

初一日
渴為痰飲欲去。不寐為胃仍未和。故以枳實橘皮湯逐不盡之痰飲。以半

夏湯和胃令得寐。

半夏一兩

杏仁粉三錢

廣皮三錢

桂枝三錢

生薑三片

生苡仁五錢

枳實二錢

秫米一合

得寐再診。

初六日
服半夏湯。既得寐矣。而反咳痰多。議桂枝乾薑五味茯苓湯。合葶藶大棗

泄肺湯逐飲。

桂枝五錢

茯苓塊六錢

苦葶藶三錢

半夏二錢

肥大棗四錢 去核

乾薑五錢

五味子三錢

甘瀾水五碗。煮取二碗。分二次服。再煮一碗服。

初八日 先以葶藶大棗泄肺湯。行業已攻動之飲。令其速去。

苦葶藶四錢

肥大棗五枚

服葶藶湯後。即以半夏湯和胃。

半夏一兩

生薑五片 大

小枳實四錢

洋

參二錢 生薑塊 同搗炒老黃

水八杯。煮取三杯。三次服。

逐去水後。用外臺茯苓飲。消痰氣。令能食。

茯苓塊六錢

半夏三錢

小枳實四錢

洋參二錢 薑汁 製黃色

生薑八錢

廣皮三錢

於朮六錢 炒

十五日 飲居脅下。則肝病。肝病則肝氣愈衰。故得後與氣則愈。先與行脅下之飲。

泄肝。即所以舒脾。俟脅痛止。再議補脾。

生香附三錢

廣皮二錢

旋覆花三錢 包

青皮錢半

二十日 蘇子霜三錢 降香末三錢 半夏四錢 枳實錢半
行脅絡之飲。業已見效。尙有不盡。仍用前法。

生香附三錢 歸鬚一錢 半夏三錢 廣皮一錢
蘇子霜錢半 降香末錢半 鬱金二錢 小枳實一錢

旋覆花包三錢
二帖。

二十二日 通補中陽。兼行脅下不盡之飲。

代赭石五錢 焦朮三錢 旋覆花包三錢 桂枝三錢
炙甘草三錢 茯苓五錢 生薑三片 半夏五錢

四帖。

十月初二日 通降脅下之痰飲。兼與兩和肝胃。

旋覆花三錢 小枳實二錢 乾薑錢半 蘇子霜三錢
桂枝尖二錢 廣皮二錢 生薑三片 半夏六錢

金氏 風寒挾痰飲爲病。自汗惡寒。喘滿短氣。渴不多飲。飲則嘔。夜咳甚。倚息不

二十六歲
癸亥二
月初十
日

得臥。小青龍去麻杏加枳實廣皮。行飲而降逆氣。

桂枝六錢

製五味錢半

炙甘草三錢

乾薑三錢

白朮四錢

半夏六錢

小枳實二錢

廣皮二錢

生薑三片

茯苓六錢

甘瀾水八杯。煮成三杯。三次服。

十一日 昨用小青龍。咳雖稍減。仍不得臥。今用葶藶大棗合法。

桂枝八錢

廣皮三錢

乾薑五錢

五味子二錢

半夏六錢

炙甘草三錢

白芍四錢

小枳實二錢

大棗去核五枚

苦葶藶三錢炒香研細

水八杯。煮取三杯。三次服。渣再煮一杯服。

十二日 用小青龍逐飲。兼利小便。使水有出路。

桂枝五錢

小枳實二錢

乾薑二錢

白通草錢半

杏仁五錢

製五味錢半

炙甘草一錢

白芍二錢

生苡仁五錢

半夏五錢

生薑三片

十三日

煮成兩杯。分二次服。渣再煮一杯服。
脈稍平。病起本渴。大服薑桂。渴反止者。飲居心下。格拒心火之渴也。仍以
蠲飲為主。微惡寒。兼和營衛。

桂枝六錢

茯苓塊三錢

杏仁四錢

半夏六錢

乾薑三錢

白芍三錢

炙甘草錢半

廣皮一錢

生薑三片

小枳實錢半

製五味錢半

大棗二錢
去核

煎法如前。

十四日

咳則脅痛。不惟支飲射肺。且有懸飲內痛之虞。兼逐脅下懸飲。

桂枝六錢

青皮二錢

乾薑四錢

廣皮二錢

杏仁泥四錢

鬱金三錢

生香附三錢

製五味錢半

旋覆花包三錢

小枳實錢半

半夏八錢

蘇子霜二錢

生薑五錢

三碗。三次服。渣再煎一碗服。

十五日

咳止大半。惟脅痛攻胸。肝胃不和之故。切戒惱怒。用通肝絡法。

半夏

蘇子三錢

乾薑三錢

桂枝尖三錢

降香末

歸鬚二錢

青皮二錢

旋覆花三錢

鬱金

生香附

頭煎二杯。二煎一杯。分三次服。

痰飲哮喘。咳嗽聲重。有汗。六脈弦細。有七月之孕。與小青龍去麻辛主之。

桂枝五錢

半夏五錢

乾薑三錢

白芍三錢

小枳實二錢

炙甘草一錢

五味一錢

廣皮錢半

甘瀾水五杯。煮成兩杯。二次服。渣再煮一杯服。

其人本渴。服桂薑熱藥當更渴。今渴反止者。飲也。惡寒未罷。仍用小青龍法。胸痺痛加薤白。按飲為陰邪。以誤服苦寒堅陰。不能速愈。

桂枝八錢

小枳實二錢

薤白三錢

乾薑五錢

製五味一錢

川樸三錢

半夏六錢

焦白芍四錢

廣皮二錢

炙甘草二錢

甘瀾水五杯。煮成兩杯。分二次服。渣再煮二杯服。

謝氏
二十五歲
癸亥二月二十
二日
二十二日

日二十三 胃不和則臥不安。亥子屬水。故更重。脹也痛也。皆陰病也。無非受苦寒藥之累。

桂枝八錢 半夏八錢 炙甘草一錢 白芍三錢

乾薑五錢 薤白三錢 生苡仁五錢 川樸三錢

杏仁三錢 苦桔梗三錢 五味子錢半 茯苓塊五錢

甘瀾水八杯。煮三杯。分三次服。渣再煮一杯服。

日二十四 寒飲誤服苦寒堅陰。大用辛溫三帖。今日甫能轉熱。右脈始大。左脈仍弦細。咳嗽反重者。是溫藥啓其封固也。再用溫藥兼滑痰。痰出自然鬆快。

桂枝五錢 生苡仁五錢 薤白三錢 杏仁三錢

乾薑三錢 茯苓五錢 括蕒二錢 小枳實二錢

半夏八錢 白芍三錢 川樸三錢 製五味錢半

甘瀾水八杯。煮取三杯。三次服。渣再煮一杯服。

日二十五 右脈已退。病勢少減。但寒熱汗多胸痺。恐成漏汗。則陽愈虛。飲更難愈。議桂枝湯加附子。去甘草。以助脹故也。合括蕒薤白湯意。通中上之清陽。護

表陽爲急。

桂枝六錢

大棗二枚
去核

川樸三錢

焦白芍四錢

熟附子二錢

小枳實錢半

生薑三片

薤白三錢

甘瀾水五杯。煮取兩杯。渣再煮一杯。三次服。其第一次卽啜稀粥半碗。令微汗佳。第二三次不必啜粥。

二十六日

昨日用桂枝湯加附子。再加薤白法。漏汗已止。表之寒熱已和。但咳甚。議與逐飲。

桂枝六錢

大棗五枚
去核

半夏五錢

茯苓塊六錢

生苡仁五錢

葶藶子二錢
研細炒

甘瀾水八杯。取三杯。分三次服。

脈雙弦而緊。寒也。不欲飲水。寒飲也。喉中癢。病從外感來也。痰清不黏。寒飲也。咳而嘔。胃陽衰而寒飲乘之。謂之胃咳也。背惡寒時欲厚衣向火。衛外之陽虛。而寒乘太陽經也。面色淡黃微青。唇色淡白。亦寒也。法當溫中陽而護表陽。未便以吐血之後。而用柔潤寒涼。小青龍去麻杏。加枳實。廣

僧四十二歲

徐二十六歲二月初十日

皮、杏仁、生薑湯主之。服此方十數帖而愈。酒客脈弦細而沉。喘滿短氣。脅連腰痛。有汗。舌白滑而厚。惡風寒。倚息不得臥。此係內水招外風爲病。小青龍去麻辛證也。

桂枝六錢 乾薑三錢 杏仁五錢 白芍四錢
生薑五片 半夏六錢 炙甘草一錢 製五味錢半

旋覆花包三錢

右關單弦飲癖。少陰獨盛。水臟盛而土氣衰也。至吞酸飯後吐痰不止。治在胃腎兩關。不能戒酒。不必服藥。真武法。

邵四十三歲癸亥七月二十三日

熟附子五錢 茯苓塊六錢 生苡仁六錢 細辛錢半
生薑五片 真山連錢半同吳 吳萸三錢

水八杯。煮成三杯。分三次服。四帖。

內飲用溫水臟法。已見大效。但藥太陽剛。不可再用。所謂一張一弛。文武之道。且議理陽明。以爲過峽文字。

半夏六錢 廣皮一錢 小枳實錢半 茯苓塊六錢

生苡仁六錢

白豆蔻一錢

生薑六錢

四帖。

八月初三日

用理陽明。亦復見效。惟吐酸仍然未止。按吞酸究屬肝病。議肝胃同治法。

半夏六錢

桂枝三錢

吳萸三錢

茯苓塊六錢

青皮六錢

生薑三錢

苡仁五錢

山連薑半

四帖。

某氏

內飲招外風為病。既喘且咳。議小青龍法。

桂枝三錢

麻黃一錢蜜炒

製五味一錢

白芍錢半

細辛八分

半夏三錢

炙甘草錢半

茯苓塊三錢

乾薑三錢

生苡仁五錢

痰飲喘咳。前用小青龍湯。業已見效。但非常服之品。脈遲緩。議外治脾法。

桂枝五錢

炙甘草二錢

生於朮三錢

製茅朮四錢

茯苓六錢

生苡仁五錢

益智仁錢半

半夏六錢

生薑五片

四帖。

皮氏

痰飲喘咳。左脈浮弦沈緊。自汗。勢甚凶危。議小青龍加杏仁厚樸。去麻辛。

四十八歲

桂枝六錢

白芍四錢

半夏六錢

炙甘草三錢

甲子十月二十

乾薑五錢

厚樸三錢

製五味二錢

杏仁霜五錢

八日

甘瀾水八杯。煮成三杯。分三次服。

二十九日

於前方內加

雲苓塊五錢

半夏五錢

三十日

服青龍已效。然其水尙洋溢。未能一時平復。

桂枝八錢

炙甘草三錢

五味子三錢

杏仁霜五錢

半夏二錢

乾薑五錢

雲苓八錢

白芍炒五錢

生薑五片

廣皮三錢

四帖。

甘瀾水八碗。煮取三碗。渣再煮一碗。日三夜一。分四次服。

初二日

以眩冒甚。於前方內加

於 朮六錢

初四日

脈現單弦。喘止咳減。眩冒未寧。再太陰屬土。既重且緩。萬不能一時速愈。且痰飲五年。豈三五日可了。

於 朮六錢

半 夏一兩

杏仁霜五錢

桂枝五錢

乾薑三錢

雲苓六錢

炙甘草三錢

五味子六錢

甘瀾水八碗。煮三碗。分三次服。

痰飲胸痺。兼有脅下懸飲。

杏泥三錢

薤白三錢

瓜蒌二錢

桂枝三錢

廣皮錢半

川樸二錢

小枳實三錢

旋覆花三錢

生香附三錢

半 夏五錢

水八杯。煮取三杯。三次服。三帖。

胸痺懸飲已愈。惟腸痺食不甘味。議和肝胃。兼開腸痺。

半 夏三錢

廣皮二錢

小枳實二錢

白通草二錢

初七日

福三十二歲乙丑三月初三日

邵
三十八歲
十一月十一日

十三日

煥氏
三十八歲
丙寅正月

杏仁八錢
生苡仁五錢
薑汁三匙

水五杯。煮取二杯。渣再煮一杯。分三次服。

脈弦細而沈。咳嗽。倚息不得臥。胸滿口渴。小青龍去麻辛法。

桂枝六錢
白芍四錢
炙甘草三錢
乾薑五錢

半夏一兩
五味子二錢
茯苓一兩
小枳實七錢

廣皮三錢

四次服。

服小青龍已效。但喉啞知渴。脈見微數。為痰飲欲去。轉用辛涼。開提肺氣法。

麻黃三錢
杏仁五錢
石膏八錢
生甘草三錢

苦桔梗三錢
半夏三錢
廣皮一錢

痰飲法當惡水。反喜水者。飲在肺也。喜水法當用甘潤。今反用溫燥者。以其為飲也。既喜水。曷以知其為飲。以得水不行。心悸短氣。喘滿眩冒。咳嗽痰多。嘔惡。諸飲證畢具也。既為飲證。何以反喜水。以水停心下。格拒心火。

不得下通於腎。反來上燦華蓋。又格拒腎中真水。不得上潮於喉。故溢乾而喜水以救之也。是之為反燥。反燥者。用辛能潤法。

半夏一兩 茯苓塊一兩 小枳實八錢 廣皮五錢

杏仁泥六錢 生薑一兩

甘瀾水八碗。煮成三碗。渣再煮一碗。分四次服。

嗽不欲飲。倚息不得臥。脅痛。自汗。不寐。脈弦緩。議小青龍去麻辛。加杏仁、苡仁。再重加半夏。

桂枝六錢 乾薑三錢 五味子錢半 炙甘草錢半

焦白芍三錢 半夏一兩 杏泥六錢 生苡仁一兩

甘瀾水八碗。煮取三碗。分三次服。

嘔涼水。於前方內加乾薑廣皮以消痰氣。

乾薑二錢 廣皮三錢

金匱謂桂枝乾薑為熱藥。服之當遂渴。今反不渴者。飲也。茲證不惟不渴。反嘔涼水不止。其為寒飲無疑。既真知其飲。雖重用薑桂何懼乎。世人之

二月初一日

二十七日

顏四十二歲 丙寅正月二十四日

不能立方者。皆未真知病情也。畏而不敢服者。亦未真知病情也。

桂枝八錢

乾薑七錢

五味子錢半

半夏二錢

焦白芍四錢

帶皮苓四錢

炙甘草三錢

生薑五片

小枳實三錢

廣皮三錢

甘瀾水八杯。煮取三杯。渣再煮一杯。分四次服。

飲家眩冒。用白朮澤瀉湯法。脈洪滑而沈。

白朮一兩

澤瀉二兩

半夏一兩

茯苓塊一兩

小枳實三錢

甘瀾水八碗。煮取三碗。渣再煮一碗。分四次服。一帖服三日。

於前方內加竹茹六錢。薑汁每杯沖三小匙。

脈沈微數。

於朮一兩

澤瀉二兩

半夏一兩

茯苓塊一兩

竹茹一兩

丸方

崑山四十二歲正月二十六日

二十七日二月初十日

半夏八兩 天麻八兩 澤瀉八兩 白朮六兩

雲苓六兩

共爲細末。神麴薑汁糊丸。梧子大。每服三錢。日再服。重則三服。

痰飲脈洪數。咳嗽。倚息不得臥。有汗。胸痺。

桂枝五錢 石膏八錢 杏仁五錢 炙甘草三錢

半夏六錢 枳實五錢 老川樸三錢 廣皮二錢

陶氏 三十六歲 二月二十五日 某

懸飲者。水在肝也。非下不可。但初次診視。且用輕法。

半夏一兩 蘇子霜三錢 青皮三錢 降香末三錢

旋覆花四錢 廣皮三錢 生香附五錢

佟氏 七十五歲 脈沈細而不調。喘滿短氣。心悸氣上阻胸。咳嗽倚息不得臥。乃中焦痰飲。下焦濁飲爲患。年老全賴陽氣生活。茲陰氣陰邪上僭如此。何以克當。勉與通陽降濁法。

半夏二兩 茯苓六錢 旋覆花四錢 秫米一合

小枳實一兩 乾薑六錢 廣皮六錢

十七日 懸飲內痛腸鳴。非下不可。以老年久虛。且不敢下。止有降逆而已。

半	夏二兩	桂	枝五錢	生	薑一兩	廣	皮五錢
椒	目四錢	薤	白五錢	小枳實	一兩	旋覆花	三錢
秫	米五錢						

十八日 年近八旬。五飲俱備。兼之下焦濁飲。隨肝上逆。逼迫心火。不得下降。以致胸滿而瀆瀆然無奈。兩用通陽降逆。絲毫不應。蓋年老真陽太虛。一刻難生難長。故陰霾一時難退也。於前方內加香開一法。

半	夏一兩	生	薑一兩	栝	薑三錢	降	香三錢
小枳實	一兩	乾	薑五錢	桂	枝六錢	薤	白三錢
沉	香二錢 <small>研細沖</small>	廣	皮五錢	茯	苓一兩 <small>連皮</small>		

又

五飲而兼濁陰上攻。昨用苓桂。重伐腎邪。大辛以開中陽。雖見小效。大勢陰太甚而陽太衰。恐即時難以復解也。勉與齊通三焦之陽法。

桂	枝六錢	茯	苓一兩	生	薑一兩	老川樸	三錢
公丁香	三錢	肉	桂二錢 <small>研細沖</small>	乾	薑五錢	小枳實	六錢

薤白四錢 黑沉香三錢 半夏六錢 廣皮四錢

二十日 仍宗前法而小變之。

桂枝六錢 乾薑五錢 半夏八錢 小枳實五錢

廣皮四錢 老川樸三錢 肉桂三錢 生薑一兩

薤白三錢 雲苓一兩 川椒炒五錢

二十三日 膀胱已開。今日可無伐腎邪。心下氣阻不能寐。仍然議中焦。降逆氣。令得

寐。

半夏二兩 廣皮五錢 生薑汁冲半杯 秫米一合

旋覆花五錢 小枳實八錢 代赭石八錢

二十四日 昨用降逆和胃。業已見效。但逆氣雖降。仍然有時上阻。陰霾太重。肝氣厥

逆也。

半夏一兩 小枳實六錢 帶皮苓一兩 旋覆花四錢

代赭石八錢 廣皮四錢 薑汁冲半杯

陳 病由瘧邪傷胃。土虛邪實。六脈俱結。且有塊痰。寒滯經脈隧道。病有三虛

四十三歲正月二十五日

一實者。先治其實。後治其虛。

杏仁泥一兩

廣皮三錢

小枳實四錢

雲苓五錢

薑半夏六錢

蘇子霜二錢

甘瀾水八碗。煮成三碗。分早中晚三次服。二帖。

二十八日

脊痛痺也。右腿偏軟。痿也。咳嗽而喘。支飲射肺也。日久不愈。皆誤補用熟地等壅塞隧道之故。脈洪。

生石膏三兩研末

杏泥五錢

桂枝五錢

片薑黃三錢

薑半夏五錢

防己四錢

廣皮炭三錢

茯苓皮五錢

苡仁五錢

煮四碗。分四次服。二帖後退石膏一兩。加赤茯苓一兩。再兩帖後加生

石膏一兩。以左乳旁有結核。痛加青橘葉三錢。

痺夾痰飲。與開痺蠲飲法。現在痺解而飲未除。脈之洪者減。病減者減其治。

二月初九日

薑半夏五錢

桂枝五錢

小枳實三錢

茯苓連皮

防己三錢 生苡仁五錢 青橘葉三錢 廣皮三錢

初八日 加小枳實二錢 廣皮二錢 滑石六錢

初八日 加生石膏一兩

十一日 肝鬱夾痰飲。咳嗽痰多。吐瘀血。

旋覆花包三錢 薑半夏六錢 廣皮炭二錢 瓜蒌霜二錢

青皮二錢 蘇子霜三錢 降香末三錢 歸鬚二錢

桃仁泥二錢 青橘葉三錢 廣皮三錢

丸方

痰飲夾肝鬱。吐出瘀血後。以兩和肝胃為主。

帶皮苓八兩 薑半夏十兩 益智仁四兩 鬱金一兩

廣皮五錢 香附六兩 生苡仁八兩 澤瀉八兩

共為極細末。神麴水法丸小梧子大。每服三錢。日三服。白開水下。

暑溼行令。脈弦細。胃不開。渴而小便短。用渴者與猪苓湯法。

六月初五日

猪苓五錢 雲苓四錢 薑半夏四錢 澤瀉五錢

飛滑石 六錢 益智仁 錢半 廣皮 三錢

煮三杯。三次服。胃開即止。

初六日 痰飲之質。冒暑欲嘔。六脈俱弦。雖渴甚。難用寒涼。與局方消暑丸法。

薑半夏 八錢 雲苓 八錢 藿梗 三錢 廣皮 三錢

生甘草 三錢 薑汁 每杯沖三小匙

煮三杯。三次服。

初八日 病減者減其製減。

半夏 四錢 雲苓 四錢

十二日 腰以下腫。當利小便。渴而小便短。議渴者與猪苓湯例。

猪苓 八錢 澤瀉 八錢 滑石 二錢 雲苓皮 六錢

半夏 六錢

煮三杯。三次服。以渴減腫消為度。

十四日 脈沈細。胃不開。減猪苓三錢 澤瀉三錢 飛滑石 六錢加

藿梗 三錢 廣皮 三錢 益智仁 三錢

十六日 暑溼病退。小便已去。陽氣不振。與通補陽氣。

桂枝三錢

半夏三錢

白蔻仁研一錢

雲苓五錢

茅朮炭二錢

廣皮二錢

炙甘草二錢

生苡仁五錢

煮三杯。三次服。

十七日 頭脹胸悶。脈緩氣歉。暑必夾溼也。

藿香三錢半梗半葉

蔻仁二錢

半夏三錢

雲苓皮五錢

廣皮三錢

苡仁五錢

杏仁三錢

十九日 小便濁。加

猪苓四錢

澤瀉四錢

二十四日 暑月頭脹微痛。與清上焦。

藿香葉三錢

薄荷一錢

荷葉邊一張去蒂

二十五日 六脈陽微。暑溼之餘。小便白濁。與分利法。

草薢五錢

澤瀉三錢

桂枝三錢

雲苓皮五錢

蒼朮三錢

益智仁三錢

猪苓三錢

苡仁五錢

七月十九日

瘥三杯。三次服。以便清為度。
溼熱為病。與苦辛淡法。

雲苓皮五錢

半夏五錢

滑石六錢

猪苓三錢

木通三錢

澤瀉三錢

苡仁五錢

桂枝三錢

杏仁三錢

煮三杯。三次服。

二十二日

溼熱為病。與苦辛淡法。小便已長。胃不開。與闔陽。

半夏六錢

益智仁三錢

廣皮三錢

雲苓皮五錢

苡仁五錢

生薑二錢

二十五日

加白蔻仁三錢

枳實三錢

九月二十一日

痰飲喘咳。脈雙弦。與小青龍法。

桂枝三錢

杏仁四錢

小枳實三錢

白芍二錢

薑半夏五錢

五味子二錢

炙甘草一錢

廣皮三錢

乾薑二錢

二十四日

痰飲脅動而喘渴。是謂懸飲。懸飲者。水在肝也。脈弦數。水在肝者。外風未淨也。

薑半夏六錢

杏仁三錢

旋覆花三錢

桂枝尖三錢

生薑汁三匙冲小

黃芩炭錢半

香附三錢

葶藶子二錢

青蒿三錢

小枳實四錢

廣皮二錢

二十五日

身熱退。去青蒿芩炭葶藶加

杏仁三錢

共服五帖。

二十七日

痰飲脅痛而喘咳。是謂懸飲。水在肝也。脈弦數。

薑半夏六錢

香附三錢

杏仁三錢

桂枝尖三錢

廣皮二錢

薑汁三匙

旋覆花三錢

蘇子霜三錢

小枳實三錢

降香末三錢

二十九日

病減者減其治。去半夏三錢。枳實一錢。降香末一錢。桂枝一錢。連前共服五帖收功。

錢
十七歲
四月二
十七日

春初前曾不寐。與胃不和之靈樞半夏湯。服至二十帖始得寐。茲胃仍不甚和。猶有不寐之弊。納食不旺。再與和胃。

半 夏六錢

廣皮炭 錢半

雲苓塊 四錢

苡 仁五錢

益智仁 一錢

白蔻仁 連皮 一錢

薑 汁 三小匙 沖

煮二杯。二次服。

備用方。膽移熱於腦。則成鼻淵。蒼耳子散主之。

蒼耳子 炒 一兩

黃芩炭 二錢

辛 夷 一兩

桑 葉 六錢

連 翹 八錢 心

銀 花 八錢

茶 菊 六錢

苦桔梗 五錢

薄 荷 二錢

甘 草 三錢

共為極細末。每服二錢。兩前茶調。日二次。

胃不和。數與和胃。已得寐。進食。夜眠必流口水者。經謂胃熱則蟲動。蟲動則廉泉開。廉泉開則液自出。與辛涼和胃法。

半 夏六錢

生苡仁 五錢

白蔻皮 錢半

生石膏 八錢

杏 仁 三錢

帶皮苓 六錢

薑 汁 三小匙 沖

初六日

煮三杯。三次服。四帖。
口水減。牙痛脈如故。再服四帖。

十一日

再服四帖。

十六日

風淫所勝。治以辛涼。佐以苦甘。

苦桔梗二錢

連翹二錢

甘草一錢

銀花三錢

桑葉二錢

香豆豉三錢

荊芥穗八分

杏仁二錢

十八日

煮兩杯。分二次服。熱退為度。二帖熱退。
胃熱。夜間口中液自出。與和胃陰法。

生石膏六錢

麥冬三錢

半夏五錢

白蔻仁錢半

雲苓五錢

二十二日

諸症皆減。去石膏。加

二十八日

麥冬二錢

胃中向有飲聚。不寐。服半夏湯已愈。後因痰涎自出。與涼陽明亦減。餘飲未除。與外臺茯苓飲意。

吳五十七歲

五月初十日二十六日

雲苓五錢

枳實錢半

生薑三片

洋參二錢

廣皮錢半

大棗二錢去核

麥冬四錢連心

半夏三錢

六脈洪數。右寸獨大。酒客痰多。肺熱之至。

生石膏

防己三錢

杏仁五錢

苡仁

半夏五錢

雲苓皮五錢

加廣皮三錢。至五月二十日。共服二十服。

酒客體形壯盛而陽痿。為溫中生熱。非精血之虛。其象顯然。與諸痿獨取

陽明法。

半夏五錢

黃柏五錢

生石膏三兩

苡仁八錢

木通三錢

雲苓皮八錢

防己四錢

六月十二日

去黃柏二錢。木通三錢。以喉嗆太久。今可兼清肺氣。加

苦梗三錢

甘草一錢

滑石六錢

二十日

脈洪數。右大於左。喉啞痰飲。戒油膩。

生石膏四兩

半夏六錢

蘇葉錢半

蘇梗錢半

七月二十一日

苦桔梗三錢 杏 仁五錢 炙甘草一錢
生石膏三錢 生甘草一錢 半 夏六錢 茯苓皮六錢
杏 仁四錢 苦桔梗四錢

八月初四日

右寸脈獨大。金實無聲。已效而未全愈。照前方再服三劑。前後共服三十餘帖。計石膏三百數十兩。

嚴三十九歲五月初二日

六脈弦細短澹。吐血三年不愈。兼有痰飲咳嗽。五更出汗。經謂陽絡傷則血上溢。要知絡之所以傷者。有寒有熱。並非人之有絡。只許陽火傷之。不許寒水傷之也。今人見血投涼。見血補陰。爲醫士一大痼疾。醫士之疾不愈。安望病家之病愈哉。此症陽欲亡矣。已難救治。勉照脈症立方。

半 夏六錢 乾薑炭三錢 五味子二錢 雲 苓五錢

小枳實二錢 桂枝木三錢 廣皮炭三錢 焦白芍三錢

初六日

據云飲食已增。午後五心煩熱如故。脈和緩。諸病必究。眠食得穀者昌。方無可轉。至午後之熱。方即甘溫除大熱法也。因脈稍和緩。去乾薑炭。前後共服過十帖。汗斂食增。血亦不吐。頭中發空。得甜食則咳減。中氣虛

十三日

二十一日

也。加甘草三錢以補中氣。再服四帖。以其脈仍緊也。前後共服十四帖。諸症向安。惟脈之弦緊如故。咳甚則欲嘔。於原方去五味。減甘草。再服四帖。諸症皆漸減。痰亦漸厚。心悸甚。加

枳實一錢

四帖。

二十五日

脈弦細如故。咳嗽日減。夜甚。陽微。陰盛可知。午後身熱已減。惟食後反覺嘈雜。胸中有水狀。少時即平。於原方加

乾薑一錢

枳實二錢

三十日

汗停嗽減。五心煩熱亦減。脈弦數。夜間咳甚。服熱藥反不渴。飲尚重也。病痰飲者。冬夏難治。

桂枝三錢

半夏六錢

枳實五錢

白芍三錢

雲苓塊五錢

苡仁五錢

炙甘草一錢

乾薑一錢

五味子錢半

廣皮炭三錢

六月初四日

前方已服四帖。脈弦緊不數。仍不知渴。於前方加

甘草錢半

乾薑二錢

再服三帖。

初八日 脈弦緊如故。噎咳如故。舌苔白滑。加桂枝二錢。再加乾薑二錢。

十二日 脈之短濇退而弦細如故。痰飲仍重。再加桂枝二錢。乾薑二錢。雲苓三錢。以化飲。

十七日 夜咳已止。是其佳處。咳來日減。亦是最好。左脈沉細。右脈弦緊。飲未盡除。至遍身骨痛。久病之故。古人云勞者溫之。甘溫調營衛而復胃氣。氣旺進食。久久自愈。病減者減其治。

桂枝三錢

半夏五錢

枳實五錢

炙甘草二錢

乾薑三錢

廣皮三錢

五味子錢半

燭飲丸。痰飲久聚。未能一時猝去。業已見效。與丸藥緩化可也。戒生冷惱怒。

桂枝半斤

廣皮十二

益智仁四兩

乾薑六兩

小枳實四兩

蒼朮炭六兩

半夏一斤

炙甘草六兩

雲苓廿四

陳五十一歲五月初十日

神麴法丸。梧子大。每日三服。每服三錢。飲甚時服。小青龍湯。人尙未老。陽痿多年。眩冒昏迷。胸中如傷。油膩狀。飲水多則胃不快。此伏飲眩冒狀也。先與白朮澤瀉湯逐其飲。再以緩治溼熱之陽痿。豈有六脈俱弦細而恣用熟地。久服六味之理哉。

於朮二兩 澤瀉二兩

煮三杯。分三次服。

十三日

已效而未盡除。再服原方。服十數帖而愈。

李四十八歲五月初一日

其人向有痰飲。至冬季水旺之時必發。後因伏暑成痢。痢後便澹。竟夜不寐者多日。寒熱飢飽。皆不自知。大便不通。按暑必夾溼。况素有痰飲。飲即溼水之所化。醫者毫不識病。以致如此。久臥牀褥而不得起。議不食不饑。不便不寐。九竅不和。皆屬胃病。例與靈樞半夏湯。令得寐再商。

薑半夏二兩 秫米二合

急流水八杯。煮三杯。三次服。得寐爲度。

十一日 諸竅不和。六脈純陰。皆痰陰爲膩補藥所閉。昨用半夏湯。已得寐而未熟。再服前方三帖。續用小青龍去表藥。加廣皮、枳實。以和其飲。蓋現在面色光亮。水主明也。六脈有陰無陽。飲爲陰邪故也。左脈弦甚。經謂單弦。飲癖也。有一症必有一症之色脈。何醫者盲無所知。不知伊一生所學何事。寧不愧死。

桂枝五錢

薑半夏六錢

白芍三錢

五味子二錢

炙甘草三錢

小枳實五錢

乾薑二錢

廣皮三錢

甘瀾水八碗。煮成三杯。三次服。

十八日 胃之所以不和者。土惡溼而陽困也。昨日純剛大燥。以復胃陽。今診脈象較前生動。胃陽已有生動之機。但小便白濁。溫氣尙未暢行。胃終不得和也。與開太陽闔陽明法。

半夏二兩

猪苓六錢

滑石三錢

秫朮一合

澤瀉六錢

白通草一錢

廣皮三錢

桂枝四錢

雲苓皮六錢

五月初三日

急流水十一碗。分二次煮成四碗。分四次服。
去滑石、通草加

川椒三錢炒去汗

脈弦痰飲喘咳。與小青龍去麻辛。加廣皮、枳實。

高五十二歲

桂枝五錢

薑半夏六錢

白芍三錢

廣皮三錢

乙酉五月十六日

炙甘草三錢

小枳實五錢

乾薑二錢

五味子二錢

煮三杯。分三次服。二帖。

十八日

已見小效。汗多加

淨麻黃根三錢

又三帖。

病減者減其製。去

桂枝

枳

實各二錢

二十四日

服前藥汗少。惟喜嚏。周身酸痛。於原方減乾薑一錢。加

杏仁

防己

各三錢

董

五十四

歲

五月二十七日

脈沈細弦弱。咳嗽夜甚。久而不愈。飲也。最忌補陰。補陰必死。以飲為陰邪。脈為陰脈也。經曰無實。

桂枝六錢

廣皮三錢

白芍四錢

半夏五錢

炙甘草一錢

五味子一錢

乾薑三錢

小枳實二錢

四帖。

加雲苓三錢

小枳實二錢

六月初一日

十七日

其人本有痰飲喘咳。服小青龍。胃口已開。連日午後頗有寒熱。正當暑溼流行之際。恐成瘧疾。且與宣通三焦。

杏仁三錢

半夏四錢

雲苓皮五錢

白蔻仁錢半

枳實三錢

苡仁五錢

廣皮三錢

藿梗三錢

青蒿二錢

二帖。

十九日

二十二日

寒熱已止。脈微弱。去蔻仁。青蒿。加桂枝。乾薑。以治其咳。咳減寒熱止。胃開。嗽未盡除。脈尚細小。效不更方。服至不咳為度。

周二十二年正月初七日

六脈弦緊。右脈沈取洪大。先從腰以上腫例。舌白滑喘而咳無汗。從溢飲例之大青龍湯。去甘藥。為其重而滯也。

麻黃六錢

細辛二錢

生薑三錢

杏仁五錢去皮尖

生石膏末一錢

炙甘草二錢

桂枝五錢

大棗二枚去核

煮成三杯。先服一杯。覆被令微汗佳。得汗即止。後服。不汗再服第二杯。

如上法。

十一日 溢飲。脈緊無汗。喘咳。浮腫。昨用大青龍汗出。腫消。喘咳減。與開太陽闔陽明法。

半夏五錢

蒼朮炭二錢

桂枝錢半

廣皮三錢

猪苓三錢

茯苓塊五錢

苡仁五錢

澤瀉三錢

飛滑石五錢

煮三杯。分三次服。已服十數帖。後加

益智仁二錢

蓮子五錢

陳 懸飲脈弦。左脅不快。為水在肝法。當用十棗湯。近八旬之老人。難任藥力。

七十六歲

與兩和肝胃可也。

正月初十日

半夏五錢

青皮三錢

旋覆花包三錢

廣皮三錢

香附五錢

小枳實三錢

淡吳萸三錢

煮三杯。分三次服。已服十數帖。

二十三日

脈結加

杏仁六錢

三帖。

覺羅

六十二歲

壬戌正月十三日

酒客痰飲哮喘。脈弦緊數。急與小青龍去麻辛。加枳實橘皮湯不應。右脅痛甚。此懸飲也。故與治支飲之小青龍不應。應與十棗湯。以十棗太峻。降用控涎丹。

甘遂五錢

大戟五錢

白芥子五錢

神麴糊丸梧子大。先服十三丸。不知。漸加至二十一丸。以得快便下黑

綠水為度。三服而水下喘止。繼以和胃收功。

伏暑夾痰飲。與三仁湯重加半夏。廣皮屢效而熱不退。痰不除。右脈微結。

汪室女

十七歲

錢三十二歲
甲子八月初十日

趙四十六歲
正月三十日

中有塊痰。堵塞隧道。因延郊芷谷兄鍼中泉穴。紫血出後。繼咳老痰二口。以後用藥無不見效。半月後伏暑痰飲皆愈矣。

咳嗽胃中停水。與小青龍去麻辛。重加枳實。廣皮五帖。已愈八九。因回母家。爲父祝壽。大開酒肉。其父亦時醫也。性喜用人參。愛其女。遂用六君子湯。服關東參數十帖。將近一年。胃中積水脹而且痛。又延其父治之。所用之藥。大抵不出守補中焦之外。治愈脹而愈痛。以致胸高不可以俯。夜坐不可以臥。已數日不食。其翁見勢已急。力辭其父。延余治之。余視其目欲努出。面色青黃。胸大脹痛不可忍。六脈弦急七八至之多。余曰。勢急矣。斷非緩藥所能救。因服巴霜三分。下黑水將近一桶。勢稍平。以和脾胃藥調之。三四日後漸平。胃大開。於是吃羊肉餃三十二枚。胃中大痛一晝夜。又用巴霜一分五釐。下後痛止。嚴禁魚肉。一月而安。太陽痺則腰脊痛。或左或右。風勝則引也。或喘或不喘者。中焦流飲。上泛則喘。不泛則不喘也。切戒猪肉生冷。與一切補藥。周年可愈。六脈洪大已極。石膏用少。萬不見效。命且難保。

生石膏六兩

雲苓皮五錢

白通草一錢

桂枝五錢

半夏五錢

黃柏炭二錢

杏仁五錢

小枳實二錢

生苡仁五錢

防己四錢

煮三杯。三次服。

四帖。

二月初二日

於前方加

猪苓三錢

滑石一兩

小枳實三錢

四帖。

初七日

於前方去黃柏炭。加

半夏五錢

桑枝三錢

石膏四兩

二十七日

減石膏止留一兩。

二十八日

石膏仍用四兩。因拜掃停藥六天。

二十九日

右脈洪大已減。石膏只用一兩。

三月一日

石膏每日用二兩。

十一日

石膏每日用一兩。因感燥氣。停藥五天。

十二日 石膏每日用二兩。共服九帖。
十三日 石膏每日用三兩。停藥十天。

十四日 自淮安復至紹興。又診得洪大之脈。較前已減七八。然較之平脈。仍大而

有力。現在小便赤濁。陰痿牙縫臭味復出。痺痛雖止。陽明太陽二經溼熱

未淨。太陰化氣未復。

四月初一至初五日 生石膏四兩 杏仁四錢 雲苓皮五錢 苡仁五錢
十五日 晚蠶砂三錢 海金沙五錢 滑石六錢 木通三錢

四帖。

十九日 脈漸退。減石膏至二兩。加

薑夏五錢 廣皮三錢

二十至廿二日 每日用石膏一兩。

廿三至廿六日 每日用石膏二兩。

廿七至三十日 小便不利。

杏泥四錢 雲苓皮五錢 生苡仁五錢 海金沙五錢

木 通 三錢

飛滑石 六錢

薑半夏 五錢

陳皮 三錢

生石膏 四兩

四帖。

感風寒。服桂枝湯。

五月初一日

仍服前二十七日方。三帖。

內飲招外風為病。

桂枝 四錢

廣皮 三錢

杏仁 三錢

白芍 二錢

枳實 五錢

半夏 五錢

炙甘草 錢半

乾薑 一錢

防己 三錢

煮三杯。先服一杯。即啜稀熱粥一碗。覆被令微汗即解。得汗後餘藥不

必啜粥。四帖。

十一日

前因風寒夾飲之故。用小青龍法。現在風寒解而飲未除。脈復洪大。仍與大青龍與木防己湯合法。兼治飲與痺也。

桂枝 六錢

杏仁 四錢

防己 四錢

半夏 六錢

廣皮三錢

飛滑石六錢

雲苓皮六錢

木通三錢

小枳實三錢

生石膏六兩

八帖。

十四日

其人本有痺症痰飲。現在盛暑發泄。暑溼傷氣。故四肢酸軟少氣。口中膠膩欲嘔。與局方消暑丸意。

雲苓塊連皮一兩

炙甘草三錢

薑夏六錢

鮮荷葉去蒂一張

薑汁每杯三匙

煮三杯。三次服。

三帖。三帖至二十

二十四日

仍服十一日方。至六月初七日止。共服十一帖。

六月初八日

停藥。

十八日

氣急欲喘。新感暑溼之故。於原方加

廣皮二錢

枳實二錢

五帖。

二十二日

桂枝四錢

杏仁四錢

防己四錢

半夏六錢

廣皮三錢

枳實三錢

滑石六錢

雲苓皮六錢

木通三錢

生石膏六兩

四帖。

二十七日

於原方減石膏三兩。加滑石六錢。共成一兩二錢。木通二錢。共成五錢。

四帖。

六月二十九日

渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。

蒼朮三錢

桂枝三錢

藿香三錢

雲苓皮六錢

半夏五錢

猪苓四錢

澤瀉四錢

薑汁每杯三匙

三帖。

七月初二日

飲食有難化之象。於原方去蒼朮。加

廣皮炭四錢

炒神麴三錢

益智仁二錢

小枳實三錢

通胃腑。醒脾陽。

二帖。

初七日 右脈洪數。六腑不和。食後惡心。二便不爽。暑溼所干之故。議通宣三焦。

生石膏三兩

廣皮三錢

滑石六錢

黃芩炭三錢

生薑三錢

益智仁三錢

薑半夏五錢

白蔻仁錢半

枳實三錢

茯苓皮六錢

生苡仁五錢

二帖。

初九日

加益智仁、枳實。

服一帖。

中焦停飲。晚食倒飽。是脾陽不伸之故。一以理脾陽立法。

薑半夏五錢

廣皮三錢

川椒炭八分

煨草果五分

雲苓皮五錢

益智仁錢半

生苡仁五錢

白蔻仁錢半

小枳實二錢

煮三杯。三次服。二帖。

十七日

停飲兼痺。脈洪。向用石膏。無不見效。數日前因食後倒飽。脈不大。石膏已用近三十斤之多。轉用溫醒脾陽方法。絲毫不應。水之蓄聚如故。跗踵不

消。胃反不開。右脈復洪。大有力。小便短。思天下無肺者無溺。肺寒者溺短。熱者溺亦短。仍用石膏涼肺胃。

生石膏 四兩

廣皮 五錢

杏仁 六錢

半夏 五錢

枳實 五錢

雲苓皮 五錢

桂枝 三錢

防己 四錢

苡仁 五錢

四帖。

廿一日 加雲苓皮五錢。共成一兩。杉木皮五錢。減石膏二兩。

廿二至廿四日 石膏用四兩。

廿五至廿八日 石膏用二兩。

共服八帖。

二十九日

飲聚不行。小便已清。少時即便臭濁。六腑之不退可知。大藥已用不少。而猶然如是。病機之頑鈍。又可知矣。議暫用重劑。餘有原案。

生石膏 四兩

枳實 五錢

杏仁 八錢

飛滑石 一兩 先煎

防己 三錢

半夏 八錢

雲苓皮 八錢

廣皮 四錢

八月初 海金砂八錢

初一日 加石膏二兩。

初七日 又加石膏二兩。

初十日 減廣皮四錢。枳實二錢。

以上共服七帖。

九月初 服之洪大不減。加

石 膏二兩

至二十七日。共服二十帖。

服石膏至五十斤之多。而脈猶浮洪。千古未有如是之頑病。皆誤下傷正於前。誤補留邪於後之累。今日去補陽明藥。蓋陽明之脈大也。

生石膏八兩

杏仁一兩

雲苓皮一兩

飛滑石二兩

防己五錢

小枳實五錢

木通三錢

煮四杯。四次服。專以苦淡行水。服一二帖再商。

初九日 生石膏四兩。共成十二兩。

九帖。

十三日

脈洪滑。痰飲未除。晨起微喘。足跗腫未消盡。餘有原案。

生石膏八兩

雲苓皮六錢

杏仁四錢

滑石一兩

葶藶子三錢

木通四錢

生苡仁六錢

半夏六錢

十五日

氣已不急。去葶藶。右脈仍浮洪。加石膏一倍。成一觔。

三帖。

十六日

氣急者得葶藶而止。右脈之洪大者。得石膏一觔大減。病減者減其製。但仍滑數。加行痰飲。

生石膏六兩

枳實三錢

杏仁四錢

雲苓皮五錢

半夏一兩

香附五錢

廣皮四錢

旋覆花包四錢

二帖。

十八日

脈漸小減。

石膏二兩

二帖。

二十日 脈洪數。加石膏八兩。成十二兩。

二帖。

二十二日 脈減。減石膏六兩。加

葶一錢 麤五分

二帖。

共服二帖。

二十三日 至二十五日 脈之洪大者。得石膏一觔大減。病減者減其製。脈復洪大有力。再酌加其製。

生石膏 兩十二

枳實 五錢

杏仁 四錢

雲苓皮 五錢

半夏 一兩

香附 五錢

廣皮 四錢

旋覆花 四錢

小便短。加

滑石 一兩

停藥三日。

十月初一日 氣喘於原方加石膏四兩。共成一觔。杏仁四錢。共成八錢。廣皮二錢。共成

六錢加

桂枝六錢

生薑四錢

五帖。

初二日服妙應丸二分六釐。大棗三枚。煎湯下。清晨服後。約二刻先從左脅作響。墜痛至少腹。便下綠水膠痰碗許。

初三日服妙應丸二分六釐。大棗二枚煎湯下。便痰水如前。湯藥未服。妙應丸方。金匱謂凡病至其年月日時復發者。當下之。此症痰飲兼痺。自正月服藥至十月。石膏將近百觔之多。雖無不見效。究未拔除病根。左脅間漉漉有聲。不時嘔咳。此水在肝也。金匱謂水在肝。十棗湯主之。又謂偏弦飲澀。又謂咳家之脈弦爲有水。十棗湯主之。又謂咳家一百日。至一歲不死者。十棗湯主之。合而觀之。此症當用十棗無疑。但十棗太峻。南人膽怯。未敢驟用。降用妙應丸續續下之。庶無差忒也。

製甘遂五錢

白芥子五錢

製大戟五錢

神麴爲丸。小梧子大。從三十九丸明起。得下痰水即止。停數日水不盡再

服。以盡爲度。初四至初七。共服五帖。

初八日

石膏一斤

飛滑石一兩

蘇子霜二錢

旋覆花四錢

雲苓皮六錢

廣皮三錢

小枳實五錢

半夏一兩

杏仁八錢

三帖。

十一日

服妙應丸三分。

十二日

脈仍洪大有力。

生石膏八兩

杏仁四錢

半夏六錢

雲苓皮六錢

廣皮三錢

香附三錢

旋覆花四錢

苡仁六錢

一帖。

十三日

杏仁八錢

半夏一兩

廣皮四錢

雲苓皮五錢

小枳實五錢

香附三錢

旋覆花四錢

滑石一兩

蘇子霜二錢

桂枝六錢

生石膏一斤

去香附。加蘇子霜。

廿二至廿九日

五帖。

十一月初四日

服妙應丸三分四釐。服之即下痰水。
服妙應丸三分八釐。下痰水如前。
右脈洪數。本有飲聚。小便不長。

生石膏一斤

苡仁六錢

雲苓皮六錢

小枳實四錢

半夏六錢

杏仁六錢

飛滑石一兩

白通草二錢

蠶砂三錢

煮三杯。三次服。

初六日

服妙應丸三分八釐。下痰水如前。

十二日

於前方加

廣皮三錢

石膏八兩

十三日

加枳實二錢

旋覆花四錢

補十一日

於前方加

鬱金三錢

十四日 加蘇子霜四錢

共服五帖。

十五日 服妙應丸六分。自服丸藥。每次皆下痰水。惟此次未下。以服藥後即食粥故也。

二十三日 服妙應丸六分。大便仍行痰水。
十一月十七日 痰飲喘咳。右脈洪。左關獨浮。與建金制木法。

生石膏八兩

青皮三錢

杏仁六錢

旋覆花四錢

蘇子霜三錢

香附四錢

半夏六錢

十八至二十六。共服五帖。

二十七日 洪大之脈已退。惟兩關獨浮。右大於左而兼實。木陷入土。與兩和肝胃。兼開膀胱。小便短而水易停故也。

半夏六錢

蘇子霜三錢

香附三錢

白芍酒炒四錢

旋覆花三錢

滑石一兩

青皮二錢

雲苓皮六錢

廣皮三錢

十二月
初一日

數日不服石膏。右脈復洪數。左關之獨浮者。亦未十分清淨。與金木同治法。

生石膏六兩

半夏六錢

杏仁六錢

滑石一兩

香附四錢

旋覆花四錢

雲苓皮六錢

枳實六錢

以後凡右脈大者。服此小即停止。

初三日

服妙應丸六分。下痰水如前。

仍服初一日原方。

二帖。

初五日

於初一日方內加桂枝五錢。廣皮四錢。至初九日止。以畏寒故也。

初十日

服妙應丸八分。下痰水如前。

十一日

於前方去桂枝。廣皮。脈不肯小故也。服至十五日止。

十六日

服妙應丸一錢。

丙戌正月十四日

金匱謂心下堅大如盤。水飲所作。枳朮丸主之。茲雖不堅大而水停不去。病情相合。再脈洪大。洪大甚則喘發。最宜服石膏。杏仁。但石膏不可入丸。

陳四十六歲

方。議用橘半枳朮丸。脈小時用開水下。脈大時暫用石膏湯送下。喘發加杏仁。脈復小。不用石膏。

鵝眼小枳實 一斤 茅山蒼朮 炒 半斤 廣皮炭 六兩

薑半夏 十兩

神麴湯法。丸梧子大。每服三錢。日三服。夏日間服消暑丸亦可。病由瘧邪傷胃。土虛則水泛。以致喘而肢軟。正虛邪實。六脈俱結。且有塊痰。塞滯經脈隧道。病有三虛一實者。先治其實。後治其虛。

杏泥 廣皮 三錢 枳實 四錢 雲苓

薑半夏 六錢 蘇子霜 二錢

甘瀾水八碗。煮成三碗。分早中晚服。二帖。

初六日 脊病痺也。右腿偏軟。痿也。咳嗽而喘。支飲射肺也。日久不愈。皆誤用熟地等補塞隧道之故。脈洪。

生石膏末 一兩 杏泥 五錢 桂枝 五錢 防己 四錢

片薑黃 三錢 薑半夏 五錢 廣皮炭 三錢 茯苓皮 五錢

苡仁五錢

煮四碗四次服。二帖退石膏一兩。加赤苓一兩。再二帖後加石膏一兩。青橘葉五錢。

二月初二日

痺夾痰飲。與開痺蠲飲法。現在痺解而飲未除。脈之洪大者減。病減者減其製。

薑半夏五錢

桂枝五錢

防己三錢

廣皮三錢

茯苓塊六錢

苡仁五錢

小枳實三錢

青橘葉三錢

煮三杯。三次服。

初八日 加小枳實二錢

廣皮二錢

滑石六錢

初九日 加生石膏一兩

十一日 肝鬱夾痰飲。咳嗽痰多。吐痰。

旋覆花三錢

薑半夏六錢

青皮二錢

廣皮炭二錢

瓜蒌仁二錢

蘇子霜三錢

降香末三錢

歸橫鬚二錢

桃仁泥二錢

青橘葉三錢

煮三杯。三次服。

丸方 痰飲夾肝鬱。吐出瘀血後。以兩和肝胃為主。

帶皮苓八兩

薑半夏十兩

香附六兩

廣鬱金二兩

廣皮五兩

益智四兩

生苡仁八兩

澤瀉八兩

共爲極細末。神麴水爲丸。梧子大。日三服。每服三錢。開水下。

暑溼行令。脈弦細。胃不開。渴而小便短。用渴者與猪苓湯法。

二月初五日

猪苓五錢

雲苓塊四錢

澤瀉五錢

半夏四錢

滑石六錢

廣皮三錢

益智仁錢半

煮三杯。三次服。胃開卽止。

初六日

痰飲之質。冒暑欲嘔。六脈俱弦。雖渴甚。難用寒涼。與局方消暑丸法。

薑半夏八錢

雲苓塊八錢

藿梗二錢

廣皮三錢

生甘草二錢

生薑汁每杯沖三小匙

煮三杯。三次服。

初八日

病減者減其製。減

半夏四錢 雲苓四錢

十二日 腰以下腫。當利小便。渴而小便短。謹渴者與猪苓湯例。

猪苓八錢 澤瀉八錢 飛滑石二錢 雲苓皮六錢

薑半夏四錢

煮三杯。三次服。以渴減腫消爲度。

十四日 脈沈細。胃不開。減猪苓三錢 澤瀉三錢 滑石六錢加

薑梗三錢 廣皮三錢 益智仁三錢

十六日 暑溼病退。小便已長。陽氣不振。與通補陽氣。

桂枝三錢 薑半夏三錢 茅朮二錢 白蔻仁研一錢

雲苓塊五錢 生苡仁五錢 廣皮二錢 炙甘草二錢

煮三杯。三次服。

十七日 頭脹胸悶。脈緩氣歉。暑必夾溼也。

半葉藿梗三錢 白蔻仁錢半 薑半夏三錢 雲苓皮五錢

廣皮三錢 苡仁五錢 杏仁三錢

煮三杯。三次服。

十九日 小便濁加

猪苓四錢 澤瀉四錢

二十四日 暑月頭脹微痛。與清上焦。

藿香三錢 薄荷一錢 鮮荷葉一張
去蒂

煮三杯。三次服。

二十五日 六脈陽微。暑溼之餘。小便白濁。與分利法。

川草薢五錢 澤瀉三錢 雲苓皮五錢 桂枝三錢

蒼朮三錢 益智仁三錢 猪苓三錢 生苡仁五錢

煮三杯。三次服。以小便清為度。

七月十九日 溼熱為病。與苦辛淡法。

雲苓皮五錢 薑半夏五錢 飛滑石六錢 猪苓三錢

木通三錢 澤瀉三錢 苡仁五錢 桂枝三錢

杏仁三錢

煮三杯。三次服。

二十二日 溼熱為病。與苦辛淡法。小便已長。胃不甚開。與闔陽明。

薑半夏六錢

益智仁三錢

廣皮三錢

雲苓皮五錢

苡仁五錢

生薑三錢

加白蔻仁三錢

枳實三錢

二十五日 九月二十一日

痰飲喘咳脈弦。與小青龍法。

桂枝三錢

杏仁四錢

小枳實三錢

白芍二錢

薑半夏五錢

五味子二錢

炙甘草一錢

廣皮三錢

乾薑二錢

煮三杯。三次服。三帖。

二十四日 痰飲脅痛而喘咳。是謂懸飲。懸飲者。水在肝也。脈弦數。身熱者。外風未淨也。

薑半夏六錢

杏仁三錢

旋覆花三錢

桂枝三錢

香附三錢

廣皮二錢

小枳實一錢

薑汁二匙

黃芩炭錢半

青蒿三錢

苦葶藶二錢

服法如前。一帖。

二十五日

身熱退。去青蒿黃芩炭葶藶。加

杏仁三錢

二帖。

二十七日

痰飲脅痛而喘咳。是謂懸飲。懸飲者。水在肝也。脈弦數。

薑半夏六錢

香附三錢

杏泥三錢

桂枝尖三錢

廣皮二錢

薑汁三匙

旋覆花三錢

蘇子霜三錢

降香末三錢

小枳實三錢

服法如前。

十九日

病減者減其製。去

半夏三錢

枳實一錢

蘇子霜一錢

降香一錢

桂枝一錢

五帖而愈。

十一月
初六日

痰飲。脈沈弦。有微喘之意。與小青龍去麻辛。

桂枝四錢

乾薑二錢

雲苓塊三錢

白芍三錢

五味子錢半

炙甘草二錢

廣皮三錢

薑半夏五錢

小枳實三錢

服法如前。三帖而愈。

十二月
初七日

內飲招外風為病。喘咳。脈弦緩。雖頭痛惡寒。能大食。只有風而無寒。用小
青龍去麻黃。減細辛。兼用桂枝湯啜稀粥令微汗法。

桂枝一兩

白芍四錢

五味子二錢

細辛五分

炙甘草三錢

乾薑三錢

薑半夏五錢

加廣皮四錢

枳實四錢

生薑三錢

大棗二枚
去核

煮三杯。先服一杯。即啜稀粥一碗。覆被令微汗佳。不可使汗淋漓。得汗

服第二杯。不必啜粥。覆被如不汗。再啜粥。覆被如前。汗後避風要緊。

初十日

脈不浮。外感已解。但弦細而畏冷。中陽虛也。去細辛。

加桂枝四錢

乾薑二錢

小枳實二錢

十三日 於前方加

廣皮二錢

十三日 脈雙弦。咳而嘔。胃咳也。

薑半夏八錢

雲苓塊一兩

生薑五錢

廣皮三錢

小枳實三錢

煮三杯。三次服。

正月十六日

脈沈弦而緩。飲居右脅。嘔痰由肋痛外至脊背惡寒。由厥陰內犯陽明。外犯太陽也。與逐脅下之飲法。

蘇子霜三錢

香附三錢

桂枝尖三錢

旋覆花三錢

廣皮三錢

小枳實二錢

降香末三錢

青皮二錢

生薑五錢

薑半夏五錢

乾薑二錢

吳鞠通醫案 卷四 痰飲

一四六

吳鞠通醫案

卷五

肺癰

王氏
五十六
歲
癸亥三
月初八
日

初起喉痺。爲快利藥所傷。致成肺癰。胸中痛。口中燥。喉痺仍未痊。不食不寐。痰氣腥臭。已有成膿之象。脈短而數。寒熱且移。熱於大腸而泄瀉。難愈之證。勉與急急開提肺氣。議千金葦莖湯與甘桔合法。

桔梗二兩

甘草一兩

桃仁五錢

冬瓜仁五錢

苡仁一兩

鮮葦根四兩

水八碗。煮三碗。二煎再煎一碗。分四次服。

堂伯兄

飲火酒。坐熱炕。晝夜不寐。喜出汗。誤服枇杷葉麻黃等利肺藥。致傷津液。遂成肺癰。臭不可當。日吐膿二升許。用千金葦莖湯合甘桔湯。

蘆根八兩

苡仁二兩

桃仁兩半

冬瓜仁兩半

桔 梗 三兩

生甘草 一兩

煎成兩大茶碗。晝夜服過碗半。膿去十之七八。盡劑膿去八九。又服半劑。毫無臭氣。調理脾胃收功。

朱詠
齋
五十餘
歲

以己卯年二月初受風。與桂枝湯一帖。風解。膽怯不敢去厚衣。因而汗多。初四五日又受風溫。口渴思涼。脈洪數。先與辛涼輕劑不解。脈又大。汗更多。口更渴。身更熱。因與辛寒重劑石膏等一帖。身涼渴止。脈靜。仍膽怯不去厚衣。初十日當大差。坐夜起五更。衣更厚。途間不敢去皮衣。以致重亡津液而成肺癰。與葶苈湯二三兩一帖。服至五七日不應。膿成臭極。加苦薤葶子五錢。膿始退。未能十分淨盡。後十日又發。膿又成。吐如綠豆汁。濃臭。每吐一碗餘。又於前方加薤葶三錢。服二帖方平復。以補胃逐痰飲收功。再其人色白體肥。夙有痰飲。未病之前。前秋冬兩季。以在上書房行走。早起恐寒。誤服俗傳藥酒方。本不嗜酒。每早強飲數小杯。次年患此恙之由也。

喉痺

劉三十二歲

脈弦而長。木氣太旺。與君火結而成喉痺。

荊芥穗二錢

薄荷二錢

元參八錢

銀花六錢

牛蒡子五錢

連翹五錢

馬勃二錢

人中黃二錢

共為粗末。分八包。每一包蘆根湯煎。一時一服。

酒客脈弦數。與苦藥清酒中之溼。即於前方內加

桔梗四錢

射干四錢

黃芩四錢

兒茶三錢

煎法如前。

靈

乙丑六月二十日

舌苔邊白中濁。喉腫而痛。頭暈身熱。脈數。癘氣所干。切戒穀食。急開關竅。用時時輕揚法。

桔梗八錢

人中黃三錢

薄荷三錢

荊芥穗三錢

元參一兩

牛蒡子八錢

黃芩三錢

黃連三錢

馬勃二錢

板藍根三錢

僵蠶三錢

連翹八錢

銀花八錢

鮮荷葉半張
去蒂

共為粗末。分八包。一時許服一包。蘆根湯煎。

日二十七 舌濁甚。邪之傳化甚緩。於前方內加

黃 芩 二錢 黃 連 二錢

日二十八 溼熱厲氣相搏。以成喉痺。舌苔重濁色暗。必得溼氣宣化。而後熱可以解。蓋無形之邪熱。每借有形之穢濁。以為依附故也。因前法而小變之。

桔 梗 八錢 人中黃 二錢 黃 芩 五錢 黃 連 五錢

馬 勃 五錢 牛蒡子 五錢 殭 蠶 三錢 連 翹 八錢

銀 花 八錢 通 草 三錢 荊 芥 二錢 杏 仁 五錢

薄 荷 三錢 滑 石 一兩 犀 角 三錢

共為粗末。分十包。一時許服一包。每服鮮荷葉邊二錢。蘆根三錢。同煎。去渣服。

日二十九 喉痛雖止。舌濁未除。脈仍微數。則其中之溼可知。按靈樞經五臟溫病。以

舌苔專屬之肺。故藥方一以宣通肺氣為主。蓋氣化則溼化。而火亦無依矣。

桔 梗 三錢 人中黃 八分 連 翹 二錢 銀 花 二錢

王二十歲
壬午四月十一日

王氏三十八歲
乙酉五月初二日

初八日
滿氏三十五歲

黃連錢半

黃芩二錢

馬勃八分

通草一錢

杏仁泥一錢

滑石三錢

蘆根一枝

荷葉半張

今晚一帖。明早一帖。

溫毒身熱喉痺滴水不能下咽。已二日矣。與代賑普濟散二十包。先煎一包。銜入口內。仰面浸漬喉瘡。一刻許有稀涎滿口。即控出吐之。再嚙再浸。如上法。嚙至半日。喉即開。得下咽。於是每一包藥煎一碗。咽一半。浸吐一半。三日得快便。喉全消。身熱亦退。育陰而愈。六脈沉弦而細。純陰之象。喉痛足痺宜溫。

川椒炭三錢

防己三錢

桂枝三錢

肉桂二錢

茯苓皮五錢

薑黃二錢

草薢五錢

苡仁五錢

四帖。

喉痛止去肉桂痰不活加半夏五錢

面色青黃。呼吸定息。脈再至而弦緊。食減。經不行。腹中有塊二三枚。長三四寸。肝厥無五日不發。喉痛十數年不休。向來所服之方。非寒涼。即婦科

地芍藥等。以致歷年沉困不休。病勢日重。十二年不孕矣。與苦辛熱法。急回真陽。或者可救。

肉桂錢半 良薑二錢 川椒二錢 廣皮二錢

吳萸錢半 半夏三錢

前方服二帖。喉痛減其大半。厥未發。食少進。腹痛減。與前方加

人參錢半 茯苓三錢

前方服四帖。脈三至。喉痛止。食大進。腹痛亦減。仍服前方。去良薑。並減剛藥分量。

前方服七帖。六脈將進至四至。服通補奇經丸一料。半年後受孕。

瘧

但寒不熱。似乎牝瘧。然渴甚。脈數。皮膚捫之亦熱。乃伏暑內發。新涼外加。熱未透出之故。仍用苦辛寒法。加以升提。

杏仁泥三錢 天花粉二錢 薏仁 滑石

吳二十五年
癸亥七月十六日

厚樸二錢 青蒿一錢 苡仁 藿香
鬱金二錢 黃芩一錢 知母

三杯。分三次服。三帖。

但寒不熱之瘧。昨用升提。已出陽分。渴甚。脈洪數甚。熱反多。昨云熱邪深伏。未曾透出。不得作真牝瘧者。非虛語也。用苦辛寒重劑。

杏仁粉五錢 滑石三錢 生石膏八錢 知母一錢

薏仁三錢 藿梗三錢 厚樸三錢 黃芩二錢

鬱金三錢 甘草一錢

伊氏 二十二歲 正月初七日
妊娠七月。每日午後。先寒後熱。熱至戌時。微汗而解。已近十日。此上年伏暑成瘧。由春初升發之氣而發。病在少陽。與小柴胡法。

柴胡五錢 黃芩三錢 炙甘草二錢 半夏四錢

人參二錢 生薑三錢 大棗二枚

一帖。寒熱減。二帖。減大半。第三日用前方三分之一。全愈。

朱 體厚本有小腸寒溼。糞後便血。舌苔灰白而厚。中黑。嘔惡不食。但寒不熱。

三十三歲

此脾溼瘧也。與劫法。

八月二十五日

生蒼朮五錢

生草果三錢

檳榔三錢

生苡仁五錢

杏仁三錢

茯苓五錢

熟附子一錢

黃芩炭二錢

二十八日

前方服三帖而病勢漸減。舌苔化黃。減其製。又三帖而寒來甚微。一以理脾為主。

於朮三錢

蔻仁二錢

益智仁二錢

廣皮三錢

半夏三錢

黃芩炭二錢

苡仁五錢

服七帖而胃開。

佟氏四十歲

少陰三瘧。二年不愈。寒多熱少。脈弦細。陽微。損及入脈。通補奇經丸四兩。服完全愈。

蕭三十三歲

少陰三瘧。久而不愈。六脈弦緊。形寒嗜臥。發時口不知味。不渴。腎氣上泛。面目黧黑。與扶陽湯法。

鹿茸三錢

桂枝三錢

人參一錢

熟附子二錢

蜀漆二錢

當歸三錢

鄭

五十五

歲

四月十

九日

四帖愈。後調脾胃。

脈雙弦。伏暑成瘧。間二日一至。舌苔白滑。熱多寒少。十月之久不止。邪入已深極難速出。且與通宣三焦。使邪有出路。勿得驟補。

杏仁泥 四錢

茯苓皮 五錢

藿 梗 三錢

蔻 仁 二錢

知 母 三錢

半 夏 三錢

苡 仁 五錢

黃 芩 二錢

青 蒿 一錢

服四帖。

二十六日

加青蒿一錢

服四帖。

初四日

脈緊汗多加

桂枝三錢

服二帖。

初六日

脈已活動。色已華。寒大減。熱亦少減。共計已減其半。汗至足底。時已早至八刻。議去青蒿。加黃芩一錢。舌苔雖減而仍白。餘藥如故。再服四帖。

十四日 三瘧與宣三焦。右脈稍大。熱多汗多。舌苔之白滑雖薄。而未盡化。溼中生

熱。不能驟補。與兩清溼熱。

杏仁泥三錢 知母二錢 通草錢半 蔻仁二錢

黃芩二錢 苡仁四錢 黃連一錢 茯苓皮三錢

半夏三錢

十九日 加廣皮炭三錢 霍梗三錢

服四帖。

二十二日 病減者減其製。每日服前方半帖。六日服三帖。

二十九日 病又減。去黃連。加益智仁三錢。以其脈大而尙緊也。仍係六日服三帖。

六月初五日 餘邪未盡。仍六日服三帖。

三瘧與宣化三焦。十退其九。白苔尙未盡退。今日診脈。弦中兼緩。氣來至

緩。是陽氣未充。議於前方退苦寒。進辛溫。

杏仁三錢 益智仁三錢 桂枝三錢 蔻仁三錢

黃芩炭三錢 半夏五錢 茯苓五錢 藿梗三錢

二十二日

四帖。

左脈弦緊。右大而緩。舌白未化。瘧雖止而餘溼未消。此方仍服。去

薤仁一錢

黃芩一錢

益智仁一錢

服八帖。

七月初二日

四瘧已止。胃已開。脈已回陽。與平補中焦。

半夏三錢

薤仁錢半

炙甘草二錢

廣皮炭三錢

生苡仁三錢

茯苓五錢

生薑三片

於朮三錢

大棗二個

服七帖後。可加人參二錢。服至收功。

丸方 瘧後六脈俱弦微數。與脾腎雙補法。

何首烏四兩

茯苓六兩

枸杞子四兩

五味子二兩

沙苑子三兩

山藥四兩

於朮四兩

薤仁五錢

蓮實六兩

人參四錢

蜜丸如桐子大。每服三二錢。開水送下。逢節以人參五分。煎湯送。

高

十六歲

乙酉六月十六日

間三瘧。脈弦。暑邪深入矣。

杏仁三錢

青蒿三錢

茯苓皮三錢

薏仁一錢

半夏三錢

柴胡一錢

藿香葉三錢

黃芩三錢

知母二錢

苡仁三錢

炙甘草一錢

滑石五錢

生薑三片

大棗二個

十八日

診脈數熱重加

知母二錢

二十八日

瘧止熱退。去知母、柴胡、青蒿、薑棗。改

藿梗二錢

減

滑石二錢

初五日

餘邪已輕。再服數帖。

朱三十八歲

但寒不熱。舌苔白滑而厚三四日。灰黑而滑五六日。黑滑可畏。脈沉弦而緊。太陰溼瘧。與牝瘧相參。但牝瘧表寒重。此則偏於在裏之寒溼重也。初起三日。用桂枝、草果、蒼朮、黃芩、茯苓、苡仁、廣皮、猪苓、澤瀉。三四日加附子。五六日又加草果、蒼朮分量。再加生薑。舌苔始微化黃。惡寒漸減。服至十

姚二十五歲

乙酉七月二十

五日

八月初三日

錢二十歲
乙酉十月初二日

二三日。舌苔惡寒始退。愈後峻補脾腎兩陽。然後收功。久瘧不愈。寒多。舌苔白滑。溼氣重也。宜宣通三焦。微偏於溫。

杏仁五錢

青蒿二錢

廣皮二錢

薏仁三錢

半夏五錢

苡仁五錢

草果錢半

黃芩錢半

茯苓皮五錢

生薑二片

前方服六帖。瘧已止。照原方去

草果 青蒿 加

滑石六錢

益智仁三錢

三瘧兼痺。舌苔白滑。終日一飲。熱時不渴。胸痞。此偏於伏暑中之溼多者也。惟日已久。又加誤補下行。邪已深入為難治。勉與宣通經絡三焦。導邪外出。毋使久羈。

桂枝三錢

防己四錢

杏仁五錢

青蒿三錢

半夏三錢

黃芩三錢

茯苓五錢

薏仁二錢

廣皮三錢

煨草果八分

片薑黃二錢

十五日

閱來札知汗多而寒熱減。舌白滑苔退。食後不飽悶。是伏邪已有活動之

機。但陰瘧發於戌亥時。不見日光。雖屢用升提。使邪外出法。毫不見早。大可慮也。勉與原方內加草果分量。去茯苓、薤仁。再加急走之蜀漆。活血絡之當歸。

桂枝三錢

柴胡三錢

半夏三錢

青蒿一錢

防己三錢

杏仁四錢

黃芩炭三錢

廣皮炭三錢

草果二錢

薑黃二錢

蜀漆三錢

當歸三錢

生苡仁五錢

十二月

閱來札知寒熱遞減而未盡除。停飲痺痛太甚。議減治瘧之品。加宣飲與痺之藥。然大有病退正衰之慮。飲與痺皆喜通不喜守。大忌呆補。奈何。

桂枝五錢

減三四帖後手背痛不減。加至八錢。或一兩。

廣皮五錢

防己四錢

青蒿二錢

柴胡三錢

寒熱如再減。二藥亦須減。

山甲片一錢

蜀漆二錢

寒熱則去之。

生苡仁五錢

人參一錢

生薑三錢

半夏六錢

茯苓皮五錢

煨草果二錢

片薑黃三錢

初十日

煎四大茶杯。分四次服。七日必須來信。

以後忽寒忽熱。已非呆於寒熱者可比。十五日寒大減。十八日寒熱又減。二十日申酉時似發非發。俱屬佳處。但手背之痛。左甚於右。伏邪甚深。腹左之塊。即係瘰母一類。不過脅腹之別耳。合觀寒多熱少。當與補陽議於原方內減柴胡青蒿。加桂枝。其人參似非高麗參可比。蓋人生世上不可留後悔也。其瘰母每日空心服化癥回生丹一丸。開水送下。蓋化癥丹中。原有鼈甲煎丸在內也。即久病在絡。亦須用之。又天士先生云。三時熱病。病久不解者。每借芳香以爲搜逐之用。此證猶在畏途。不可隨便飲瞰也。於前方內減

青蒿錢半

柴胡錢半

加

桂枝一錢

伏暑自上年八月而來。邪已深入。三日一作。寒多熱少。亦宜通宣三焦爲要法。

青蒿三錢

薤仁一錢

蜀漆一錢

桂枝三錢

杏仁二錢

黃芩錢半

苡仁三錢

柴胡錢半

楊二十四
歲
丙戌二
月十一
日

服一帖而寒退。熱反多。此陰邪已化熱。去柴胡桂枝。重用通宣三焦。加廣皮半夏以和脾胃。

傷寒

五十八歲
癸酉二月初一日

太陽中風。尚未十分清解。兼之溼痺髀痛。

桂枝四錢

厚樸二錢

蠶砂三錢

杏仁三錢

防己三錢

茯苓皮五錢

薑黃二錢

炙甘草錢半

廣皮錢半

二帖。

初二日

行經絡而和脾胃。則風痺自止。

桂枝八錢

白芍四錢

半夏五錢

防己六錢

炙甘草三錢

生白朮五錢

生薑五片

大棗二個

初五日

水八杯。煮三杯。分三次服。頭一次啜稀粥。令微汗佳。二三次不必食粥。左脈沈緊。即於前方加

熟附子五錢

初六日 脈洪大而數。經絡痛雖解而未盡除。痺也。小便白而濁。溼也。

桂枝三錢

澤瀉三錢

黃柏炭一錢

通草三錢

杏仁五錢

滑石五錢

苡仁五錢

茯苓皮五錢

猪苓三錢

初九日

昨服開肺與大腸痺法。溼滯已下。小便亦清。但大便與瘕中微有血跡。證從寒溼化熱而來。未便即用柔藥以清血分。今日且與宣行腑陽。右脈仍見數大。可加苦藥。如明日血分未清。再清血分未遲。

杏仁泥三錢

黃柏炭一錢

黃芩炭二錢

陳皮錢半

苡仁五錢

半夏三錢

滑石五錢

厚樸二錢

細蘇梗一錢

頭煎兩杯。二煎一杯。分三次服。

初八日

舌苔仍有新白。衣被稍薄則畏寒。身熱已退。陽虛溼氣未盡無疑。

桂枝三錢

苡仁五錢

白芍二錢

陳皮錢半

半夏五錢 生茅朮二錢 杏仁三錢 厚樸二錢

全當歸錢半

煎服均如前法。二帖。

初十日 諸證向安。惟營氣與衛不和。寐不實。寐後自覺身涼。以調和營衛為主。

桂枝三錢 苡仁五錢 大棗二個 白芍三錢

陳皮錢半 炙甘草二錢 半夏六錢 生薑三片

茯苓三錢

六帖。

十六日 營衛已和。即於前方內加

膠飴三錢 白芍二錢
成五錢

七帖而安。

太陽中風漏汗。桂枝加附子湯主之。

唐氏
三十八歲

桂枝六錢 熟附子三錢 炙甘草三錢 焦白芍四錢

生薑三片 大棗三個

煮三杯。分三次服。

十七日

中風漏汗。兼之腎水上凌心。心悸腹痛。昨用桂枝加附子湯。諸症悉退。今左脈沈緩。右脈滑。表雖清而濁陰未退。議苓桂伐腎邪。歸茴溫衝脈。吳萸半夏生薑兩和肝胃。白芍以收陰氣。合桂枝而調營衛。加黃芩以清風化之熱。合諸藥爲苦辛通法。此外感之餘。兼有下焦裏證之治法也。

桂枝四錢

全當歸三錢

小茴香三錢二錢同炒

半夏四錢

吳萸三錢

青皮錢半

焦白芍二錢

茯苓五錢

黃芩炭一錢

生薑三片

甘瀾水煎成三杯。分三次服。

十九日

脈緩濁陰久居。兼有滯物續下。用藥仍不外苦辛通法。稍加推蕩之品。因其勢而利導之。大意通補陽明之陽。正所以驅濁陰之陰。若其人陽明本旺。胃陰自能下降。六腑通調。濁陰何以能聚。再胃旺自能坐鎮中州。濁陰何以能越胃而上攻心下。反覆推求。病情自見。

淡吳萸三錢

小茴香三錢同炒黑

桂枝尖四錢

厚樸三錢

川棟子二錢

黃芩炭一錢

小枳實錢半

烏藥二錢

青皮錢半

廣木香一錢

焦白芍二錢

陳皮一錢

茯苓三錢

二十二日

凡痛脹滯下。必用苦辛通法。兼護陽明。固不待言。前法業已見效。細詢病已十餘年。以半產後得之。誤用壅補成之。按久病在絡。再痛脹偏左下。至少腹板着。其中必有瘀滯。非純用湯藥所能成功。蓋湯者盪也。滌盪腸胃和通百脈。固其所長。至於細雕密鏤。緩行橫絡。是其所短。非兼用化癥回生丹。緩通不可。且陽劑過重。有癥散為蠱之虞。不得不思患預防也。

桂枝尖一錢

烏藥錢半

厚樸一錢

全當歸炒黑錢

半夏五錢

地榆炭一錢

小茴香炒二錢

川棟子二錢

黃芩炭一錢

白芍炒二錢

黃連八分

廣皮炭八分

兩頭尖二錢

廣木香八分

桃仁錢半

紅花七分

鬱金一錢

降香末二錢

甘瀾水煎。前後四杯。日三夜一。分四次服。四帖。

昔李東垣有方用藥至三十餘味者。張仲聖鼈甲煎丸。亦有三十幾味。後人學問不到。妄生議論。不知治經治以急。急則用少而分量多。治絡治以緩。緩則用多而分量少。治新則用急。治舊則用緩。治急可用獨。治舊必用衆。獨則無推諉而一力成功。衆則分功而互相調劑。此又用藥多寡之權衡也。

兼服化癥回生丹一粒。

日二十七

宣絡法兼兩和肝胃。

全當歸三錢

製香附二錢

小茴香炒三錢

半夏三錢

川芎五分

青皮炒八分

丹皮炒三錢

沙苑子三錢

白芍六錢

日二十八

寐仍不實。於前方內加

半夏二錢

生苡仁六錢

服三帖。

初二日

案仍前。

全 歸三錢

製香附 錢半

乾薑炭 五分

小茴香 三錢

降香末 二錢

高良薑 二分

青 皮 八分

廣皮炭 八分

烏 藥 二錢

半 夏 五錢

桃仁泥 錢半

三帖。

初五日

絡瘀多年。腹痛脹攻胃。食後臍脹。今搜去絡中瘀滯。飢甚則如刀刮竹。絡氣虛也。與通補絡法。

歸 身 三錢

龍眼肉 三錢

白 芍 六錢

杞 子 三錢

丹 皮 三錢

小茴香 一錢

丹 參 三錢

九帖全愈。

頭項強痛而惡寒。脈緩有汗。太陽中風。主以桂枝湯。

桂 枝 三錢

白 芍 二錢

炙甘草 二錢

生 薑 三錢

大 棗 二個

水五杯。煮二杯。第一杯服後。即食稀熱粥。令微汗佳。有汗二杯。不必食粥。無汗仍然。

吳氏
二十三歲
二月二十一日

二十四日 不解。於前方內加

羌活五錢

二十五日 服前方已。脈靜身涼。不肯避風。因而復中。脈緊無汗。用麻黃湯法。

麻黃三錢
去節

羌活三錢

桂枝三錢

白芍三錢

炙甘草二錢

生薑三片

大棗二個

煮二杯。分二次服。

二十六日 服前藥不知身重疼痛。其人肥而陽氣本虛。平素面色淡黃。舌白溼氣又

重。非加助陽勝溼之品不可。於前方內加

麻黃五錢
成八錢

桂枝二錢
成五錢

炙甘草一錢
成三錢

杏仁三錢

白朮五錢

熟附子三錢

水五碗。先煮麻黃去上沫。入諸藥取兩碗。分二次服。服一碗而汗出愈。

頭痛惡寒。脈緊。言蹇。肢冷。舌色淡。太陽中風。雖係季春。天氣早間陰晦。雨

氣甚寒。以桂枝二麻黃一法。

麻黃三錢
去節

桂枝六錢

炙甘草三錢

杏仁五錢

唐五十九歲三月十六日

生薑六片 大棗二個

煮三杯。得微汗。止後服。不汗再服。不汗促役其間。

十八日 原方倍麻黃。減桂枝。加

附子三錢

二帖。

十八日 原方再服一帖。

十九日 諸證悉減。藥當暫停以消息之。

二十日 中風表解後。言寒減。食則汗頭行痛。舌白滑。脈微緊。宜桂枝加附子湯。除

風實表護陽。

桂枝六錢

白芍四錢

炙甘草二錢

附子三錢

生薑五片

大棗二個

水五杯。煮二碗。分二次服。渣再煮一碗服。

表解後復中惡寒胸結。舌苔厚而白。脈遲緊裏急。

桂枝六錢

蒼朮三錢

附子四錢

乾薑三錢

二十一日

苡仁五錢
茯苓五錢
厚樸三錢
枳實二錢

陳皮二錢

日二帖。

二十二
於前方內加

炙甘草二錢

生薑二兩

去茯苓減苡仁

日二帖。

二十三
諸證悉衰。當減其製。照前日方。日一帖。
二十四
中風表解後。餘邪入裏。舌黃身熱胸痞。議瀉心湯瀉其痞。

乾薑五錢

生薑五錢

黃芩五錢

黃連二錢

半夏六錢

頭煎二杯。二煎一杯。分三次服。

先寒後熱。脅痛腰痛。少陽證也。議從少陽領邪外出太陽法。

柴胡六錢

黃芩三錢

黨參三錢

桂枝四錢

半夏錢半

炙甘草三錢

羌活錢半

生薑三片

寒熱後。寒退熱存。脅脹。

半夏五錢

炙甘草錢半

陳皮炭錢半

生薑三錢

黃芩四錢

香附三錢

鬱金二錢

大棗二個

張二十五日

今年風木司天。現在寒水客氣。故時近初夏。猶有太陽中風之症。按太陽中風。係傷寒門中第一關。最忌誤下。時人不讀唐晉以上之書。故不識症之所由來。仲景謂太陽至五六日。太陽證不罷者。仍從太陽驅出。宜桂枝湯。現在頭與身仍微痛。既身熱而又仍惡風寒。的是太陽未罷。理宜用桂枝湯。但其人素有溼熱。不喜甘。又有微欬。議於桂枝湯內去甘藥。加辛燥。服如桂枝湯法。

桂枝六錢

陳皮三錢

白芍四錢

半夏四錢

杏仁三錢

二十六日

太陽中風。誤下胸痞。四五日。太陽症未罷。昨用太陽證仍在例之桂枝法。今日惡寒已罷。頭目已清。惟胸痞特甚。不渴。舌白而壯熱。泄瀉稀水頻仍。仲景法云。病發於陽而誤下成胸痞者。瀉心湯主之。今用其法。再經謂脈

不動數者爲不傳經也。昨日已動數太甚。斷無不傳之理。可畏在此。

乾薑五錢 茯苓五錢 半夏五錢 生薑三片

黃連三錢

日二十七 太陽中風誤下。前日先與解外。昨日太陽證罷。卽瀉胸痞。今日胸痞解。惟

自利不渴。舌灰白。脈沉數。經謂自利不渴者。屬太陰也。太陰宜溫。但理中之甘草人參。恐不合拍。議用其法而不用其方。

乾薑五錢 半夏六錢 蒼朮炭四錢 生薑四錢

陳皮炭二錢 茯苓連皮一兩

日二十八 太陽中風。先與解外。外解已。卽與瀉誤下之胸痞。痞解而現自利不渴之

太陰證。今日口不渴而利止。是由陰出陽也。脈亦頓小其半。古云脈小則病退。但仍沈數。身猶熱而氣粗不寐。陷下之餘邪不淨。仲景傷寒論謂真陰已虛。陽邪尙盛之不寐。用阿膠雞子黃湯。按此湯重用苓連。議用甘草瀉心法。

甘草三錢 黃芩四錢 半夏五錢 黃連三錢

二十九日

生薑三錢 大棗二個 茯苓三錢
脈沉數。陰經熱陽經不熱。是陷下之餘邪在裏也。氣不伸而噦。噦者傷寒門中之大忌也。皆誤下之故。議少用丁香柿蒂湯法。加苓連以徹裏熱。疏逆氣。

公丁香二錢 黃芩三錢 柿蒂九個 黃連一錢

陳皮二錢 薑汁三匙

初一日

誤下成胸痞自利。兩用瀉心。胸痞自利俱止。但陷下之邪。與受傷之胃氣。搏而成噦。昨用丁香柿蒂湯去人參加苓連。方雖易。仍不外仲聖苦辛通降之法。病者畏而不服。今日噦不止而左脈加進。勉與仲聖噦門中之橘皮竹茹湯。其力量降前方數等矣。所以如此用者。病多一日。則氣虛一日。仲聖於小柴胡湯中即用人參。况誤下中虛者乎。

陳皮六錢 生薑五錢 炙甘草四錢 竹茹五錢

大棗四枚 半夏三錢 人參二錢如無以洋參代

十七日

誤下中虛。氣逆成噦。昨與金匱橘皮竹茹湯。今日噦減過半。古謂效不更

方。仍用前法。但微喘而舌苔白。仲聖謂喘家加厚樸杏子佳。議於前方內。
加

十九日

誤下之陷證。噦而喘。昨連與橘皮竹茹湯。一面補中。一面宣邪。茲已邪潰。諸惡候如失。脈亦漸平。但其中氣受傷不淺。議與小建中湯加橘皮半夏。小小建立中氣。調和營衛。兼宣胃陽。令能進食安眠。

厚樸二錢 杏仁三錢 柿蒂三錢
白芍六錢 生薑三片 半夏四錢 桂枝四錢
大棗二枚 陳皮一錢 炙甘草三錢 飴糖一兩去渣後化攪勻再上火二三沸
煮三杯。三次服。

病解後微有飲欬。議與小建中去飴糖。加

半夏 陳皮 茯苓 苡仁
蔻仁 杏仁

初六日

病後兩服建中。胃陽已復。脾陽不醒。何以知之。安眠進食。是胃陽起。舌起白滑苔。小便短。大便不解。脈乍數。是脾陽未醒。而上蒸於肺也。議與宣利

三焦法。以醒脾陽。

杏仁五錢 半夏五錢 茯苓五錢 陳皮三錢

苡仁五錢 枳實三錢 通草一錢 益智仁一錢

初八日 大小便已利。脈仍洪數。舌白滑苔未除。仍宜苦辛淡法。轉運脾陽。宣行溼熱。

杏仁三錢 蒼朮炭三錢 薏仁錢半 黃芩炭二錢

陳皮錢半 黃柏炭三錢 茯苓皮五錢 半夏五錢

苡仁五錢

十一日 脈仍沈數。舌苔反白滑。仍宜建中行溼以除伏邪。溼最傷氣。非溼去氣不得健。與急劫溼法。

薏仁錢半 黃芩炭二錢 杏仁三錢 陳皮錢半

黃柏炭二錢 半夏五錢 益智仁二錢 苡仁五錢

煨草果四錢 製蒼朮四錢 茯苓皮五錢

煮三杯。周十二時服完。

吳五十六歲十一月十二日

內熱外寒。兼發痰飲。喉啞。咳嗽。痰多。頭痛。惡寒。脈浮。與麻杏石甘湯。

麻黃五錢去節

半夏一兩

生石膏六兩

桔梗六錢

杏仁八錢

陳皮四錢

炙甘草四錢

煮四杯。先服一杯。得汗。止後服。不汗再服。汗後勿見風。

十四日

肺脈獨浮。去

麻黃三錢

十七日

脈浮。喉啞。咳嗽。痰多。

麻黃三錢

杏仁六錢

陳皮三錢

生石膏四兩

桔梗五錢

半夏六錢

炙甘草二錢

二十三日

脈浮。喉啞。咳嗽。痰多。內飲招外風為病。與大青龍法。

麻黃五錢

杏仁八錢

陳皮五錢

生石膏四兩

炙甘草三錢

半夏八錢

桔梗五錢

生薑三錢

大棗二錢

頭煎三杯。先服一杯。得汗。止後服。不汗再服。

二十四日
二十七日

病減者減其製。減麻黃二錢。去陳皮薑棗。加木通。小便短故也。
喉復啞。脈洪數。小便已長。前方去木通加

石膏二兩

頭痛。脈浮。弦不甚緊。無汗。與杏蘇法。

趙十三歲
十一月二十九日

杏仁二錢

羌活一錢

生薑三片

蘇葉三錢

甘草錢半

大棗二枚

防風二錢

桔梗三錢

煮兩杯。先服一杯。覆被令微汗。不可使汗淋漓。得汗止後服。不汗再服。第二杯。再不汗再作服。以得汗為度。汗後避風。只可啜稀粥。戒一切葷腥。

中燥

吳五十七歲
乙酉四月十九日

感受燥金之象。腹痛。泄瀉。嘔吐。現在泄瀉雖止。而嘔不能食。腹痛仍然。舌苔白滑。肉色刮白。宜急溫之。兼與行太陰之溼。

川椒炭三錢

茯苓五錢

陳皮三錢

高良薑二錢

苡仁五錢

公丁香一錢

吳萸二錢

益智仁二錢

半夏五錢

二帖。

二十二日

背仍痛。原方加

高良薑一錢

吳萸一錢

桂枝五錢

再服四帖。

二十七日

已效。陰氣未退。再服三帖。分四日服完。

五月初三日

痛減。嘔與泄瀉俱止。減川椒萸薑之半。再服六帖。

十三日

陰未化。陽自不復。且心下堅大如盤。脈如故。前方再服。

姚四十八歲

燥金感後。所傷者陽氣。何得以大劑熱地補陰。久久補之。陽氣困頓。無怪

乎不能食而嘔矣。六脈弦緊。豈不知脈雙弦者寒乎。

乙酉四月二十一日

川椒炭三錢

陳皮三錢

半夏五錢

乾薑二錢

茯苓五錢

公丁香八分

生薑三錢

苡仁五錢

初二日

加桂枝三錢

乾薑一錢

減川椒之半。

十一日 嘔痛皆止。飲食已加。惟肢軟無力。陽氣太虛。加甘草合前辛藥。為辛甘補

陽方法。

二十一日 復感燥氣。嘔而欲瀉。於前方內去甘藥。加分量自愈。六脈弦細如絲。陽微之極。

川椒炭三錢

陳皮三錢

吳萸三錢

乾薑三錢

茯苓五錢

半夏五錢

桂枝五錢

公丁香錢半

生薑五錢

二十七日

諸症皆效。脈稍有神。於原方內去吳萸丁香之剛燥。加苡仁之平淡。陽明從中治也。

李

四十六

歲

乙酉

四月

十六日

胃痛脅痛。或嘔酸水。多年不愈。現在六脈弦緊。皆起初感燥金之氣。金來克木。木受病。未有不克土者。土受病之由來。則自金克木始也。此等由外感而延及內傷者。自唐以後無聞焉。議變胃而受胃變法。即用火以克金也。又久病在絡法。

公丁香一錢

茯苓五錢

枳實四錢

川椒炭三錢

苡仁五錢 生薑五錢 半夏五錢 陳皮三錢
四帖。

二十三日 復診仍用原方四帖。

五月初二日 現在胃痛脅痛吐酸之證不發。其六脈弦緊不變。是胸中絕少太和之氣。議轉方用溫平。剛燥不可以久任也。

桂枝四錢 茯苓五錢 生薑三錢 陳皮三錢

大棗二枚 炙甘草二錢 半夏五錢 乾薑二錢

苡仁五錢 白芍四錢

服之如無弊。可多服。

十一日 診脈已回陽。去乾薑。減桂枝之半。

二十四日 復診脈仍緊。原方加

益智仁二錢

服三帖愈。

余 胃痛脅痛。脈雙弦。午後更甚者。陽邪自旺於陰分也。

五十二歲五月初二日

川椒炭三錢 陳皮三錢 公丁香錢半 降香末三錢
香附三錢 查炭二錢 吳萸二錢 青皮二錢
青橘葉三錢 半夏五錢 苡仁五錢

接服霹靂散。
十七日 復診病稍減。脈仍緊。去

查炭 橘葉 及 川椒炭一錢 加

枳實三錢

二十四日 脈之緊者稍和。腹痛已止。唯頭暈不寐。且與和胃令寐。再商後法。

半夏一兩 苡仁一兩 茯苓五錢 枳實三錢

煮三杯。分三次服。以得寐為度。如服二帖後仍不寐。可加半夏至二兩。再服一帖。

譚

四十七歲五月初二日

感受金涼。胸痺頭痛。脈弦細而緊。

薤白三錢 川椒炭三錢 厚樸二錢 桂枝三錢
陳皮三錢 高良薑二錢 半夏三錢 苡仁五錢

生薑五片 大棗二個

二帖。

十八日 燥氣雖化。六脈俱弦。舌苔白滑。用陽明從中治法。與苦辛淡法。最忌酸甘。

半夏四錢 苡仁五錢 香附三錢 茯苓四錢

乾薑錢半 益智仁二錢 陳皮三錢 薏仁錢半

川椒炭二錢

二十一日 脈仍弦緊。熱藥難退。欬嗽減。效不更方。右脅微痛。加

香附三錢

二十三日 右脅微痛。脈弦緊如故。加

蘇子霜三錢 降香末三錢 旋覆花三錢

二十六日 脅痛咳嗽皆止。痰尚多。脈弦未和。於前方內去 香附 蘇子霜

降香 旋覆花 加

桂枝四錢 乾薑二錢半 以充其陽氣。行痰飲。和弦脈。

霹靂散方

主治中燥吐瀉腹痛。甚則四肢厥逆轉筋。骹痛肢麻。起臥不安。煩燥不寧。再甚則六脈全無。陰毒發斑。疔癰等症。並一切凝寒痼冷積聚。寒輕者不可多服。寒重者不可少服。以愈爲度。非實在純受燥溼寒三氣陰邪者不可服。

桂枝六兩

公丁香二兩

草果二兩

川椒炭五兩

水菖蒲二兩

青木香四兩

吳萸四兩

防己三兩

檳榔二兩

降香末五兩

附子三兩

小茴香四兩

薤白四兩

苡仁五兩

五靈脂二兩

高良薑三兩

萆澄茄五兩

細辛二兩

烏藥三兩

乾薑三兩

雄黃五錢

右藥共爲細末。開水和服。大人每服三錢。病重者五錢。小兒減半。病甚重者連服數次。以痛止厥回。或瀉止筋不轉爲度。方論按內經有五疫之稱。五行偏勝之極。皆可致疫。雖癘氣之至。多見火證。而燥金寒溼之疫。亦復時有。著風火暑三者爲陽邪。與穢濁異。

趙

氣相參。則爲溫厲。溼燥寒三者爲陰邪。與穢濁異氣相參。則爲寒厲。現在見證多有肢麻轉筋手足厥逆吐瀉腹痛脅肋疼痛。甚至反惡熱而大渴思涼者。經謂霧傷於上。溼傷於下。此症乃燥金寒溼之氣。直犯筋經。由大絡別絡內傷三陰臟真。所以轉筋入腹卽死也。既吐且瀉者。陰陽逆亂也。諸痛者。燥金寒水之氣所搏也。其渴思涼飲者。少陰篇謂自利而渴者。屬少陰。虛則飲水求救也。其頭面赤者。陰邪上逼。陽不能降。所謂戴陽也。其周身惡熱喜涼者。陰邪盤踞於內。陽氣無附欲散也。陰病反見陽證。所謂水極似火。其受陰邪尤重也。諸陽證畢現。然必當臍痛甚拒按者。方爲陽中見純陰。乃爲真陰之證。此處斷不可誤。故立方會三陰經剛燥溫熱之品。急溫臟真。保住陽氣。又重用芳香。急驅穢濁。一面由臟真而別絡大絡外出筋經。經絡以達皮毛。一面由臟絡腑絡以通六腑。外達九竅。俾濁穢陰邪一齊立解。大抵皆扶陽抑陰。所謂麗照當空。羣陰退避也。

感受燥金之氣。腹痛甚。大嘔不止。中有蓄水。誤食水果。

三十八歲
七月二十四日

公丁香三錢

半夏一兩

茯苓皮五錢

生薑一兩

川椒炭六錢

烏梅肉三錢

吳萸四錢

陳皮五錢

高良薑四錢

枳實三錢

水五碗。煎二碗。渣再煎一碗。另以生薑一兩。煎湯一碗。候藥稍涼。先服薑湯一口。接服湯藥一口。少停半刻。俟不吐再服第二口。如上法。以嘔止痛定爲度。

二十五日

燥氣腹痛雖止。當臍仍堅。按之微痛。舌苔微黃而滑。周身筋骨痛。脈緩。陽明之上中見太陰。當與陽明從中治例。

桂枝六錢

川椒炭二錢

生薑三錢

白芍三錢

公丁香一錢

防己三錢

苡仁五錢

茯苓六錢

半夏五錢

煮三杯。分三次服。服此身痛止。

二十六日

脈小於前。身痛已止。六脈未和。舌黃滑苔。

半夏五錢

生薑三錢

薤仁錢半

茯苓五錢

陳皮三錢 厚樸錢半 苡仁五錢 大腹皮三錢

川椒炭錢半

二十八日 腹脹如故不寐。加

半 夏一兩

初一日 太陽痺。

桂枝六錢 茯苓皮五錢 茅朮炭三錢 防己四錢

通草一錢 片薑黃三錢 杏仁五錢 苡仁五錢

滑石六錢 蠶砂三錢

初六日 腹脹停飲。前方內去朮之守。加苦辛之通。又去滑石。

大腹皮三錢 厚樸三錢 枳實三錢 陳皮三錢

初十日 六脈俱弦。胃口不開。腹脹肢倦。宜通六腑。即勞者溫之之法也。

桂枝六錢 大腹皮三錢 川椒炭三錢 陳皮五錢

益智仁三錢 半 夏五錢 枳實二錢 茯苓五錢

厚樸二錢

服五帖而愈。

張女
十五歲

燥金之氣。直中入裏。六脈全無。殭臥如死。四肢逆冷。已過肘膝。骸痛轉筋。與通脈四逆湯加川椒吳萸丁香一大劑。厥回脈出一晝夜。次日以食粥太早。復中如前。脈復厥。體又死去矣。仍用前方。重加溫藥一劑。厥回其半。又二帖而無活。後以補陽收功。

顧
五十歲

人參

川椒

吳萸

丁香

一帖而效。三帖脈漸復。重與補陽而愈。

楊
室女
五十歲

脅痛。心煩懊懣。拘急肢冷。脈弦細而緊。欲坐不得坐。欲立不得立。欲臥不得臥。隨坐即欲立。剛立又欲坐。坐又不安。一刻較一刻脈漸小。立刻要脫。與霹靂散不住灌之。計二時。服散約計四兩而稍定。後與兩和脾胃而全安。

鄭
二十六歲

先是三月初九日。得太陽中風。與桂枝湯已愈。十二日晚已臥。下身有微汗。因廚房不戒於火。只穿小汗褂一件。未着襪。出外救火。火熄復臥。覺身

多
十六歲

微熱惡寒。腹中脹痛。脈弦數。與桂枝柴胡各半湯。汗出稍輕。究不能解。以後外雖化熱。面赤汗多如溫病狀。以當臍之痛未休。舌白不燥。斷不敢用辛涼。而辛溫之藥。或進或退。十日不解。至二十四日反重用溫熱。佐以黃連三錢。次日表證裏證。一齊俱解如失。後與調理脾胃兩陽而安。燥淫表裏俱病。面赤身熱。舌黃燥渴。六脈洪數而緊。大便閉。小便短。通體全似火證。只有當臍痛拒按。此爲陽中之陰。乃爲真陰。與苦熱芳香一劑而熱退。減輕分量。三帖而病全失矣。

痙 太陽所至

溫
癸亥二
月二十
九日

六十日之幼孩。痙已二十餘日。現在脈不數。額上涼汗。並無外感可知。乃雜藥亂投。致傷脾胃。故乳食有不化之形。恐成柔痙。俗所謂慢脾風。議護中焦。乃實土制風法。又肝苦急。急食甘以緩之義也。

明天麻三錢

乾薑二錢

茯苓五錢

廣木香五分

炙甘草三錢

生苡仁五錢

焦於朮錢半

煨肉果一錢

煨薑一片

甘瀾水五茶杯。煎成兩茶杯。小兒服十之一二。乳母服十之八九。渣再煎一茶杯。服如前。

三月初一日

赤子不赤而刮白兼青。脈遲涼汗。舌苔白滑而厚。食物不化。洞泄者必中寒。按症必因於溼。古所謂柔症是也。議從中治。經謂有者求之。無者求之。此症全無風火之象。純然虛寒。乳中之溼不化。土愈虛則肝中內風愈動。若不崇土而惟肝是求。恐日見窮蹙矣。

人參四分

廣皮炭三分

廣木香五分

生於朮一錢

焦白芍一錢

煨肉果五分

炙甘草一錢

明天麻三錢

生苡仁一錢

初二日

風溼相搏。有汗為柔症。形若反弓者。病在太陽。俯視目珠向下者。病在陽明。以陽明為目下綱也。今久病為雜藥困傷脾胃。大便泄。乳食不化。為溼多風少。症時俯時多。為病在陽明。故此症以脾胃為主。議補中益氣法。溼溼下行。內用風藥。領邪外出。

初三日

寒溼柔痙。昨用升陽益氣法。從陽明提出太陽。茲精神倍昔。顏色生動。舌上白濁化淨。大便已實。甚為可喜。但痙家有灸瘡者難治。

人參	三分	桂枝	二分	茯苓塊	三錢	白朮	一錢
葛根	二分	山藥	一錢	炙甘草	五分	生苡仁	錢半
焦白芍	一錢						

人參	三分	茯苓塊	一錢	嫩桂枝	三分	生於朮	一錢
----	----	-----	----	-----	----	-----	----

焦杭白芍	一錢	葛根	二分	廣皮炭	二分	蓮子	三粒去心不
------	----	----	----	-----	----	----	-------

生苡仁	一錢	炙甘草	五分
-----	----	-----	----

初四日

痙家自汗。有灸瘡者難治。刻下且住脾胃。從脾胃中立以條連四肢。是久痙一定之至理。若鏤治其痙。是速之也。

人參	三分	廣皮	三分	桂枝	二分	茯苓塊	一錢
----	----	----	----	----	----	-----	----

焦於朮	八分	煨肉果	三分	生苡仁	一錢	炙甘草	八分
-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

訶子肉	五分	茅朮炭	六分
-----	----	-----	----

初五日

痙家為苦寒所傷。脾陽下陷。又有多瘡。其痙萬萬不能即愈。議護中陽。勿

致虛脫為要。非深讀錢仲陽、陳文仲、薛立齋、葉天士之書者。不知此恙。

人參四分

訶子肉煨六分

白芍二錢

於朮炒一錢

桂枝三分

廣木香四分

茯苓一錢

煨肉果六分

廣皮炭三錢

炙甘草八分

苡仁錢半

濃煎。

初七日

脈仍不數。大便猶溏。但舌苔微黃。神氣漸復。不似前虛寒太甚之象。宜退剛藥。少進柔藥。醫經謂上守神。粗守形。兵法謂見可而進。知難而退。此之謂也。

人參三分

麥冬米炒一錢

茯苓一錢

整蓮子一錢

於朮炒一錢

白芍炒一錢

炙甘草七分

陳皮水炒黑

初九日

諸證漸退。神氣亦佳。但舌上復起重濁之白苔。乳溼之過。暫停參藥。且用疏補法。

生苡仁錢半

整蓮子一錢

麥冬帶心一錢

厚樸五分

茯苓一錢

焦神麴八分

木香四分

廣皮炭五分

張

十三歲

乙酉六

月初三

日

脈沈細而弱。舌苔白滑。幼童體厚。純然溼邪致瘥。一年有餘。

蒼朮炭三錢

雲苓皮五錢

川椒炭三分

白蔻仁一錢

生苡仁六錢

廣皮三錢

桂枝三錢

四帖。

初八日

瘥症發來漸稀。效不更方。

八帖。

十六日

脈至沈至細至緩。舌白滑甚。溼氣太重。故效而不愈。於前方中加劫溼而通補脾陽之草果。調和營衛之桂枝、白芍、甘草。

五帖。

二十一日

瘥症脈沈細。舌白滑。與溼淡法。發來漸稀。未得除根。於前方內去剛燥。加化痰。

桂枝四錢

苡仁五錢

半夏六錢

白芍三錢

益智子二錢

炙甘草一錢

廣皮三錢

雲苓五錢

薑汁三匙

二十五日 服前方四帖已效。舌苔仍然白滑。六脈陽微。照前方再服四帖。
二十九日 前方已服四帖。諸症皆安。惟痰尚多。再四帖。
七月初九日 前方又服九帖。瘰癧只發一次甚輕。已不嘔吐。痰尚多。脈甚小。照前方再服。

癰瘰 少陽所至

陳十五歲
乙丑六月二十日

病久陰傷已極。骨瘦如柴。又加卒然中暑。中熱氣。舌絳芒刺。唇乾液涸。無怪乎瘰癧神昏。十指蠕動。危險之至。以脈尚浮弦而扎。勉與一面大隊填陰。兼鹹以止厥法。先與紫雪丹二錢。涼水和服。共服六錢。

白芍五錢

細生地三錢

犀角五錢

羚羊角三錢

麻仁二錢

炙甘草二錢

阿膠三錢

生龍甲五錢

牡蠣五錢

濃煎。緩緩服。

二十八日

神識未清。間有譫語。

七月初一日

炙甘草六錢 麥冬入心錢 直大生地八錢 生鼈甲五錢
阿膠三錢 麻仁三錢 犀角五錢 生白芍五錢
邪少虛多。用復脈已當。但舌上黑苔未化。宿糞未見。兼加潤法。

生白芍六錢 炙甘草四錢 麥冬六錢 直大生地八錢

阿膠三錢 麻仁五錢 犀角五錢 生鼈甲六錢

元參二兩

煮成三杯。分三次服。

初五日

服前藥五帖。見宿糞碗許。黑苔已化。但神識尙未十分清楚。用三加復脈加犀角。即於三甲復脈湯內加

犀角四錢

初八日

神識仍未清楚。湯藥照前。間服牛黃丸三丸。燥氣化火。壯熱。舌黃。脈數。癰瘰而厥。法宜清涼解肌。切忌發表。

陳

三歲

九月十日

六日

薄荷二錢 羚羊角三錢 杏仁四錢 連翹六錢

銀花八錢 丹皮三錢 生甘草二錢 牛蒡子三錢

十七日

共為粗末。分五包。一時許服一包。蘆根湯煎。去渣服。燥氣化火。身壯熱渴甚。於前方內加煅石膏、炒知母、麥冬。去牛蒡、薄荷、丹皮、羚羊。

煅石膏 五錢

炒知母 錢半

麥冬 二錢

細生地 二錢

銀花 二錢

連翹 二錢

苦桔梗 一錢

生甘草 八分

杏仁 一錢

黃芩 一錢

岳八個月
六月十八日

未及歲之兒。瘟毒頭腫。癰瘰而厥。壯熱氣促。脈極數大。恐真陰不勝陽邪。先以普濟消毒飲宣毒外出。必去升麻、柴胡之直升少陽陽明者。加犀角、羚羊、瀉心、膽之熱。

連翹 六錢

大力子 六錢

薄荷 二錢

人中黃 二錢

苦桔梗 三錢

芥穗 二錢

元參 五錢

馬勃 三錢

天蟲 三錢

銀花 六錢

鮮荷葉 一張

鮮蘆根 一兩煎湯代水

共為細末。分八包。一時許服一包。

吳三歲六月初九日尹十五歲

犀角四錢 羚羊角四錢另包不必研

於前藥每包加五分同煎。

辰刻以跌撲驚後癰瘰。至戌正始醒。醒後身大熱。口渴。脈數。舌無苔。用復脈湯六帖。熱退脈靜。又服二帖而安。

羚羊角 連翹 生甘草 桑葉

薄荷 苦桔梗 茶菊 銀花

勾藤 丹皮

五帖全愈。

痘後餘邪入少陽陽明二絡。但唇口與眼皮癰瘰。致飲食不能收合。每從口張時隨落出。四肢不掣。與清二經之絡法。

苦桔梗 丹皮 連翹連心 生甘草

細生地 銀花 桑葉 麥冬心不去

鉤藤 刺蒺藜 茶菊

先服湯藥數帖。後以三十帖作散。每日早晚中三次。各服二錢。服至半年方愈。

食積

金男
四歲

幼孩手心熱。舌苔厚濁。嘔吐。食積也。法當和胃而醒脾。宜降不宜升。

藿梗二錢 焦麴錢半 白豆蔻三錢 半夏二錢

雞內金一錢 廣皮炭一錢 苡仁二錢 厚樸錢半

煨薑片二小

十三日

熱退脈平。以調理脾胃為主。

白朮二錢 廣皮炭六分 白扁豆一錢 茯苓塊三錢

神麴一錢 半夏一錢 厚樸六分 山藥一錢

二十三日

泄久脾虛。將成滯下。

厚樸二錢 生苡仁三錢 廣皮炭錢半 焦神麴二錢

雲苓塊二錢 益智仁五分 廣木香八分 雞內金二錢

陶二歲
乙酉七
月初二
日

黃芩炭八分 焦白芍一錢
幼童手心熱甚。舌微黃。身微熱。體瘦。神不足。防成疳疾。與疏補中焦。兼之消食。

生苡仁三錢

厚樸八分

焦神麴二錢

廣皮炭一錢

雞內金一錢

雲苓塊三錢

益智仁七分

煮二小杯。分三次服。三帖而愈。

疳疾已久。若不急講調理飲食。則不可為矣。用藥以疎補中焦立法。

孫九歲
丁亥七
月二十
五日

茯苓連皮

雞內金炒二錢

廣木香一錢

益智仁錢半

厚樸二錢

查炭錢半

半夏三錢

橘皮炭二錢

脈大浮取弦數。脾虛食滯。疳疾將成。大便頻仍。面腫腹大。與溫宣中焦法。

益智仁錢半

黃芩炭錢半

橘皮二錢

茯苓皮三錢

神麴炒三錢

半夏三錢

苡仁四錢

蔻仁一錢

二十八
日

大便後見血。乃小腸寒溼。加黃土湯法。

於前方內。去蔻仁。加蒼朮炭三錢

熟附子二錢

中黃土四兩

再服三帖。

癸泄

章男

十一月

六月十三日

泄久傷脾。恐成柔症。俗所謂慢脾風。議疏補中焦。

茯苓塊三錢

厚樸一錢

煨肉果一錢

苡仁三錢

扁豆二錢

蓮子三錢連皮去心

廣皮炭八分

芡實錢半連皮

木香五分

十四日

仍用通補而進之。

人參五分

厚樸八分

煨肉果一錢

茯苓塊二錢

廣皮炭八分

木香七分

苡仁二錢

藿梗八分

焦神麴八分

白扁豆三錢炒

半夏二錢

小茴香一錢

十六日

疏補中焦。業已見效。仍不能外此法。

人參五分

厚樸八分

半夏二錢

木香八分

茯苓三錢

煨肉果錢半

苡仁三錢炒

扁豆三錢炒

十七日 神氣聲音稍健。皮熱亦覺平和。大有起色。但積虛旦晚可充。

人參五錢 蓮子二錢 肉果霜錢半 茯苓三錢
半夏二錢 木香八分 白扁豆炒二錢 廣皮錢半
山藥錢半

十八日 舌有黃苔。小便色黃。微有積。皆脾虛不運之故。且暫停參藥。加宣絡法。

茯苓三錢 厚樸一錢 煨肉果一錢 半夏炒二錢
雞內金一錢 白蔻仁二錢 蓮子去心二錢 木香七分
生苡仁三錢 生於朮一錢 廣皮炭八分

十九日 大便秘有不化形。思乳食。為血肉有情。應於疏補之中。加消血肉積者。

雞內金炒一錢 查炭一錢 廣皮炭一錢 茯苓塊三錢
煨肉果一錢 范麩炭八分 木香七分 川樸錢半

白蔻仁三分 生苡仁三錢

二十日 脾虛火衰。則食物有不化之形。肝腎與衝脈伏寒。怒甚則疝痛。

小茴香二錢

生苡米三錢

木香一錢

黑查炭錢半

煨肉果錢半

製茅朮一錢

茯苓一錢

廣皮炭八分

白蔻仁五分

青皮六分

烏藥八分

二十二日 補下通中。

小茴香錢半炒黑

生苡仁錢半

人參三分

查炭八分

煨肉果一錢

茯苓三錢

製茅朮八分

白蔻仁五分

木香六分

張男
八個月

泄瀉四五日。暑邪深入下焦。頭熱如火。手冷如冰。謂之暑厥。羸瘦難堪。脈遲緊。未必得愈。姑立方以救之。先與紫雪丹五分。三次服。

猪苓二錢

製蒼朮一錢

澤瀉一錢

茯苓二錢

桂枝木一錢

廣皮炭七分

白扁豆一錢

木香七分

略有轉機。然終可畏也。

猪苓二錢

白扁豆錢半炒

澤瀉錢半

半夏錢半

生苡仁三錢

廣木香八分

茅朮炭一錢

厚樸六分

孟
十五歲
八月初
八日

廣皮炭五分

伏暑泄瀉。加以停食。欲瀉腹痛。瀉後痛減。防成滯下。與五苓散加消食。服細弦而緩。

桂枝三錢

雲苓皮五錢

查炭二錢

蒼朮炭三錢

神麴四錢

小枳實二錢

猪苓三錢

廣皮炭四錢

川椒炭二錢

澤瀉三錢

一月後復診。病已大愈。善後方與調和脾胃。

咳嗽

咳而嘔。胃咳也。痰涎壅塞。喘滿氣短。

半夏三錢

小枳實一錢

陳皮一錢

杏仁二錢

蘇梗二錢

生苡仁三錢

生薑二錢

茯苓三錢

即於前方內加

苦葶藶子錢半

半夏二錢

蘇子二錢

郭男
八歲
癸亥七
月十一
日

二十日

去蘇梗再服二帖。
小兒脾虛溼重胃咳。

薑半夏六錢

焦 麴二錢

小枳實錢半

杏 泥三錢

旋覆花三錢
絹包

蘇子霜錢半

茯苓三錢

生白扁豆三錢

生苡仁五錢

生薑汁每次沖

即於前方內加

廣 皮二錢

杏 仁二錢

蘇子霜錢半

去 神 麴

十帖。

吳三歲
八歲

文四歲

周女十歲

劉

三幼孩連咳數十聲不止。八歲者且衄。與千金葶藶湯。加苦葶藶子三錢。有二帖愈者。有三四帖愈者。第三四帖減葶藶之半。衄者加白茅根五錢。幼孩噎咳數十日不止。百藥不效。用千金葶藶湯。加苦葶藶二帖而愈。春風噎咳。醫用麻黃向外發法。又用訶子白果百合向內收。以致噎不可解。吐出者皆血沫。用金沸草湯三帖而愈。三月間春溫。噎咳見吐。現在六脈弦細。五更丑寅卯時。單聲咳嗽甚。謂之

十七歲
乙酉五月二十
四日

木扣今。鳴風本生於木也。議辛甘化風。甘涼柔木。

苦桔梗三錢

連翹三錢

銀花二錢

甘草二錢

薄荷一錢

鮮蘆根三錢

桑葉三錢

麥冬三錢

細生地三錢

茶菊三錢

天冬一錢

二十八日
六月初二日

咳嗽減。食加。脈猶洪數。左大於右。效不更方。再服四五帖。木扣金鳴。與柔肝清肺已效。左脈洪數已減。與前方去氣分辛藥。加甘潤

沙參三錢

玉竹三錢

麥冬三錢

冰糖三錢

李女
四歲已丑二月
初十日

風溫夾痰飲喘咳。肚熱太甚。勢甚危急。勉與宣肺絡。清肺熱法。

生石膏二錢

杏仁五錢

黃芩三錢

苦葶藶三錢

蘆根五錢

十二日

風溫夾痰飲喘咳。

生石膏二兩

杏仁四錢

冬瓜仁三錢

蘆根五錢

茯苓皮三錢

苦葶藶錢半

煮三小杯。分三次服。服二帖。燒熱退。

六脈弦勁。有陰無陽。但嗽無痰。且清上焦氣分。

吳二十歲
甲子四月二十四日

桑葉三錢 生扁豆三錢 玉竹三錢 冰糖三錢
麥冬三錢 沙參三錢 杏仁三錢 連翹錢半
茶菊三錢

四帖。

二十六日

於前方內。去連翹。加

丹皮二錢 地骨皮三錢

陳四十歲
丙戌正月十三日

咳嗽起於前年九月。夏傷於溼。伏暑遇新涼而發之咳。症本不大。後因誤補封固。邪已難出。又用桑皮末用地骨引邪入腎。按腎為封藏之臟。誤入者永難再出矣。身熱得補藥汗解。而足心之熱總不解。是其確證也。現在咳而嘔。六脈弦細而數。陰陽兩虛也。勉照胃咳方法。先能得穀。建立中焦。假如胃旺。或有生機。常吐血一二口。中有瘀滯。亦係久病絡傷。季脅作痛。肝經部分應加宣絡降氣。

薑半夏六錢

蘇子霜錢半

桃仁三錢

雲苓可入錢嘔不止
至兩許

陳十六歲

降香末二錢

廣皮炭三錢

薑汁每杯沖三小匙

煮三杯。分三次服。此症揚湯止沸而已。斷難釜底抽薪。

少年而體質本弱。六脈弦細而軟。五更咳嗽。時而吐血。應照陽虛夾飲吐血論治。又勞者溫之治法。與小建中湯加茯苓半夏。

白芍六錢

薑半夏三錢

生薑片三大

桂枝四錢

雲苓五錢

膠飴化入

炙甘草三錢

大棗去核二枚

多服為妙。

某十三歲

五更空咳。木叩金鳴。本用柔藥柔肝。茲兩脅痛。中有怒鬱瘀滯。法當活絡。

新絳紗三錢

蘇子霜二錢

廣皮二錢

旋覆花三錢

降香末二錢

薑半夏五錢

歸鬚三錢

鬱金二錢

青皮錢半

香附三錢

頭痛

趙氏六脈弦而遲。沉部有。浮部無。巔頂痛甚。下連太陽。陽虛內風眩動之故。

五十五歲
乙丑三月十八日

初十日

桂枝六錢 白芍三錢 生耆六錢 炙甘草三錢
川芎一錢 全當歸二錢 生薑五錢 大棗三枚
膠飴五錢化入
辛甘爲陽一法也。辛甘化風二法也。兼補肝經之正三法也。服二帖。陽虛頭痛愈後用耆建中。

李

白芍六錢 桂枝四錢 生薑三片 生耆五錢
炙甘草三錢 大棗二枚去核 膠飴五錢化入
少陽頭痛。本有損一目之弊。無奈盲醫不識。混用辛溫。反助少陽之火。甚至有用附子雄烈者。無奈乎醫者盲。致令病者亦盲矣。况此病由於伏暑發瘧。瘧久不愈。抑鬱而起。肝之鬱勃難伸。肝愈鬱而膽愈熱矣。現在仍然少陽頭痛未罷。議仍從少陽膽絡論治。

桑葉三錢 茶菊三錢 羚羊角三錢 青箱子二錢
鈎藤二錢 丹皮三錢 麥冬五錢連心 麻仁三錢
桔梗三錢 生甘草錢半 刺蒺藜五錢 苦丁茶一錢

陳三十五歲
乙丑十二月二十日

少陽風動。又襲外風為病。頭偏左痛。左脈浮弦而數。大於右脈一倍。最有損一目之弊。議急清膽絡之熱。用辛甘化風方法。

羚羊角三錢
茶菊三錢
桑葉三錢
苦桔梗三錢
生甘草一錢
丹皮五錢
青箱子二錢
薄荷二錢

刺蒺藜二錢
鈎藤二錢

水五杯。煮取兩杯。分二次服。渣再煎一杯服。日二帖。

二十五日

於前方內加

木賊錢半
麩仁三錢
減薄荷錢四

頭痛眼蒙甚

十一月初八日

日三帖。少輕。日二帖。於前方內加

麩仁
麥冬
白茅根

章四十三歲

衄血之因。由於熱行清道。法當以清輕之品。清清道之熱。無奈所用皆重藥。至頭偏左痛。乃少陽膽絡之熱。最有損一目之患。豈熟地桂附鹿茸所可用。悖謬極矣。無怪乎深痼難拔也。勉與清少陽膽絡法。當用羚羊角散。

以無羚羊故不用。

苦桔梗一兩

苦丁茶三錢

連

翹八錢

甘

草四錢

鉤 藤六錢

銀 花八錢

桑 葉一兩

丹

皮八錢

薄 荷二錢

茶 菊五兩

白 蒺藜一錢

共為細末。每服二錢。日三次。每服白扁豆花湯調。外以豆漿一擔。熬至碗許。攤貼馬刀患處。以化淨為度。必須鹽滷點之。做豆腐水。並非可吃之豆腐漿。

附有一人。素有肝鬱痰火。項間致成馬刀。外用蒲黃夏布貼患處。內服元參貝母牡蠣為丸。百日收功。

二十七日
五月初二日
復診症小效。脈尚仍舊。照前清少陽膽絡方。再服二三帖。俟大效後再議。此時無扁豆花為引。改用鮮荷葉邊煎湯為引亦可。少陽絡熱。誤用峻補陽氣。以致頭目左半麻木發癢。耳後癰腫。發為馬刀。現在六脈沈洪而數。頭目中風火相扇。前用羚羊角散法。雖見小效。而不能大愈。議加一煎方。暫清腦戶之風熱。其散方仍用勿停。

苦桔梗

側柏葉炭

荷葉邊一枚

辛夷

生苓

黑山梔五錢

去之大

蒼耳子炒

桑葉

連翹連心

茶菊

六月初三日

細閱病狀。由少陽移於陽明。加

生石膏一兩

知母三錢

葛根三分

十二日

偏頭痛係少陽膽絡病。醫者誤認為虛。而用鹿茸等峻補其陽。以致將少陽之熱移於陽明部分。項腫牙痛。半邊頭臉腫痛。目白睛血赤。且閉不得開。如溫毒狀。舌苔紅黃。六脈沈數有力。議與代賑普濟散。急急兩清少陽陽明之熱毒。

十六日

代賑普濟散十包。每包五錢。用鮮蘆根煎湯。水二杯。煮成一杯。去渣先服半杯。其下半杯噙化。得涎涎即吐之。一時許再煎一包。服如上法。舌黃更甚。脈猶數。腫未全消。目白睛赤縷。自下而上。其名曰倒垂簾。治在陽明。不比自上而下者。治在太陽也。代賑普濟散。每日服五包。嚥下大半。漱吐小半。每包生石膏三錢。煎成一

十八日

小碗服二日。外以不去心麥冬一兩。分二次煎。代茶。今日偏頭痛甚。且清少陽之絡。其消腫之普濟散加石膏。午前服一包。餘時服此方。三次三杯。

羚羊角一錢

丹皮一錢

銀花一錢

犀角八分

茶菊一錢

刺蒺藜六分

凌霄花一錢

鈎藤六分

苦桔梗八分

桑葉一錢

連翹一錢

生甘草四分

兩杯半水煎一杯。頓服之。日三帖。

二十日

大便結。加元參二錢。糖則去之。

二十三日

經謂脈有獨大獨小。獨浮獨沈。斯病之所在也。茲左關獨大獨浮。膽陽太旺。清膽絡之藥。已服過數十帖之多。而膽脈尙如是之旺。絡藥清輕上浮。服至何日是了。議膽無出路。借小腸以爲出路。小腸火腑。非苦不通。暫與極苦下奪法。然此等藥可暫而不可久。恐化燥也。

洋蘆薈二錢

龍膽草三錢

胡黃連二錢

真雅連二錢

麥冬五錢
不去心

丹皮五錢

秋石一錢

二十六日

前方服二帖。左關獨大獨浮之脈已平。續服羚羊角散一天。代賑普濟散一天。目之赤縷大退。其耳後之馬刀堅硬未消。仍服代賑普濟散。日四五次。

七月初一日

脈沈數。馬刀之堅結未消。少陽陽明經脈受毒之處。猶然牽拉板滯。議外面改用水仙膏敷患處。每日早服羚羊角散一帖。已午後服代賑普濟散四包。

初九日

服前藥喉嚨較前清亮。舌苔之黃濁去其大半。脈漸小仍數。裏症日輕。是大佳處。外症以水仙膏拔出黃瘡少許。毒氣仍未化透。仍須急急再敷。務期拔盡方妙。至於見功遲緩。乃前此誤用峻補之累。速速解此重圍。非旦晚可了。只好寧耐性情。寬限令其自化。太緊恐致過剛則折之虞。前羚羊角散。每日午前服一帖。午後服代賑散四包。分四次。再以二三包煎湯漱口。以護牙齒。

十七日

數日大便不爽。左脈關部復浮。瘡口痛甚。再用極苦以瀉小腸。加芳香活絡定痛。

洋蘆薈二錢

乳香三錢

生大黃酒炒黑

真川連二錢

沒藥二錢

歸尾三錢

龍膽草三錢

秋石三錢

胡黃連三錢

銀花五錢

煮三小杯。分三次服。得快大便。一次即止。

十八日

馬刀雖潰。少陽陽明之熱毒未除。兩手關脈獨浮。氣大旺。於清少陽陽明絡熱之中。兼疏肝鬱。軟堅化痰。

苦桔梗三錢

桑葉三錢

海藻二錢

銀花三錢

丹皮五錢

凌霄花三錢

連翹三錢

生香附三錢

夏枯草三錢

茶菊三錢

二十五日

馬刀以誤補太重而成。為日已久。一時未能化淨。以畏疼停止水仙膏之故。舌上白苔浮面微黃。其毒尚重。現在胃口稍減。木來尅土之故。於前方加宣肝鬱。

苦桔梗二錢

桑葉三錢

香附二錢

銀花三錢

丹皮炭三錢

連翹三錢

鬱金二錢

茶菊三錢

二十八日

仍以代賑普濟散。漱口勿嚥。

肝鬱誤補。結成馬刀。目幾壞。現在馬刀已平其半。目亦漸愈。脈之數者已平。惟左關獨浮。其性甚急。肝鬱總未能降。胃不甚開。胸中飯後覺痞。舌白滑微黃。皆木旺尅土之故。敗毒清熱之涼劑。暫時停止。且與兩和肝胃。

新絳紗三錢

薑半夏三錢

歸 鬚二錢

旋覆花包三錢

廣皮炭二錢

降香末錢半

蘇子霜錢半

丹 皮三錢

鬱 金二錢

八月初九日

少陽相火。誤補成馬刀。原應用涼絡。奈連日白苔太重。胃不和。暫與和胃。現在舌苔雖化。納食不旺而嘔。未可用涼。恐傷胃也。於前方減其治。

新絳紗三錢

丹 皮三錢

生薑汁三匙

旋覆花包三錢

鬱 金二錢

黃芩炭二錢

半 夏五錢

仍用普濟散漱口。

初六日

於前方內去黃芩加

香 附三錢

廣皮炭二錢

初八日 膽移熱於腦下。爲鼻淵。則鼻塞不通。甚則衄血。議清腦戶之熱。以開鼻塞。兼宣少陽絡氣。外有馬刀故也。

蒼耳子炒四錢

連翹二錢

桑葉三錢

辛夷炒去毛四錢

銀花二錢

茶菊三錢

十二日 加旋覆花三錢

鬱金二錢

疏肝鬱加

薑半夏二錢

止嘔。

十六日 馬刀已出大膿。左脅肝鬱作痛。痛則大便。日下六七次。其色間黃間黑。時

欲嘔。有大瘕泄之象。與兩和肝胃。

旋覆花包三錢

薑半夏四錢

薑汁三匙

絳紗三錢

真降香末三錢

香附三錢

歸鬚二錢

黃芩炒二錢

鬱金二錢

焦白芍三錢

廣皮炭三錢

十九日

外症未除。內又受伏暑成痢。舌白苔黃滑。小便不暢。大便五七次。有黑有白。便又不多。非積滯而何。不惟此也。時而嘔水與痰。胃又不和。內外夾攻。何以克當。勉與四苓合芩芍法。

二十四日

病由膽而入肝。客邪已退。所見皆肝膽病。外而經絡。內而臟腑。無所不病。初診時即云深痼難拔。皆誤用大熱純陽之累。所謂雖有善者。亦無如之何矣。再勉與瀉小腸以瀉膽火法。

猪苓三錢

廣皮三錢炒

木香二錢

澤瀉三錢

白芍三錢炒

降香末二錢

雲苓皮五錢

黃芩二錢炒

紅麴二錢

薑半夏五錢

真雅連錢半 薑汁炒

真雅連錢半

連翹三錢

烏梅三錢 去核

龍膽草三錢

黃芩三錢 炒

半夏三錢

桑葉三錢

竹茹三錢

二十六日

脈少大而數。加

茶菊三錢

雲苓皮三錢

銀花三錢

二十九日

脈仍數。肝膽俱病。不能純治一邊。

苦桔梗三錢

麥冬五錢 連心

雅連五錢

銀花三錢

連翹三錢

烏梅三錢

桑葉三錢

半夏三錢

九月十二日

雲苓三錢 茶菊三錢

前方服十一帖。胃口大開。舌苔化盡。肝氣亦漸和。惟馬刀核未消盡。鼻猶塞。唇猶強。變紐為舕。脈弦數。大便黑。又於原方內去護土之剛藥。加入腦戶之絡藥。蓋由風熱蟠聚於腦戶。故鼻塞而紐或舕。誤補而邪不得出也。

苦桔梗三錢 蒼耳子炒三錢 烏梅三錢 人中黃錢半

辛夷三錢 茶菊三錢 連翹心三錢 黃芩二錢

麥冬五錢 銀花三錢 真雅連一錢 桑葉三錢

龍膽草一錢

十九日

閱來札。前方服七帖。肺胃之火太甚。議於原方加生石膏一兩。杏仁二錢。開天氣以通鼻竅。清陽明以定牙痛。如二三帖不效。酌加石膏。漸至二兩。再敷水仙膏以消核之未盡。

二十八日

右脈洪大而數。渴欲飲水。牙牀腫甚。陽明熱也。於前方內加石膏一兩。共二兩。銀花五錢。共八錢。桑葉二錢。共五錢。如服三五帖後。腫不消。加石膏至四兩。

富氏 二十五歲
何氏 四十歲

顛頂一點痛。畏燈光日光如虎。脈弦細微數。此厥陰頭痛也。與定風珠三劑而愈。
陽虛頭痛。背惡寒。脈弦緊甚。與黃耆建中。加附子三帖而痛減。脈稍和。又每日服半帖。四日而愈。

胃痛

伊氏 三十歲
甲子十月二十七日

脈弦急。脅脹攻心痛。痛極欲嘔。甫十五日而經水暴至甚多。幾不能起。不欲食。少腹墜脹而痛。此怒鬱傷肝。暴注血海。肝厥犯胃也。議胞宮陽明同治法。蓋金匱謂胞宮累及陽明。治在胞宮。陽明累及胞宮。治在陽明。茲因肝病下注胞宮。橫穿土位。兩傷者兩救之。仍以厥陰為主。雖變金匱之法。而實法金匱之法者也。

製香附三錢

烏藥二錢

半夏五錢

艾炭三錢

鬱金二錢

黃芩炭一錢

小茴炭二錢

血餘炭三錢

青皮八分

五靈脂錢半

二十九日

五杯水。煎兩杯。分二次服。二帖大效。
金匱謂胞宮累及陽明。則治在胞宮。陽明累及胞宮。則治在陽明。茲肝厥既克陽明。又累胞宮。必以厥陰為主。而陽明胞宮兩護之。

製香附三錢

淡吳萸二錢

半夏五錢

草薢二錢

川棟子三錢

艾炭錢半

小茴香炒黑三錢

烏藥二錢

黑梔子三錢

桂枝三錢

杜仲炭二錢

水五杯。煎取兩杯。分二次服。

伊氏

二十一歲

十一月二十九日

脈雙弦而細。肝厥犯胃。以開朗心地要緊。無使久而成患也。

半夏六錢

青皮錢半

生薑片三大

廣皮錢半

淡吳萸二錢

烏藥二錢

川椒炒黑二錢

鬱金二錢

川棟子皮二錢

降香末三錢

水五杯。煮取兩杯。二次服。三帖。

王氏

二十六歲

肝厥犯胃。濁陰上攻。萬不能出通陽泄濁法外。但分輕重耳。前三方之所。以不大效者。病重藥輕故也。茲重用之。

十一月初四日

川椒炭五錢
夏五錢
烏藥三錢
小枳實三錢
川樸三錢
雲連一錢

兩頭尖者不用
降香末三錢

甘瀾水八碗。煮取三碗。分六次。二帖。

初六日

重剛劫濁陰。業已見效。當小其製。

川椒炭三錢
夏三錢
烏藥二錢
半夏三錢

小枳實三錢
青皮二錢
廣皮錢半
厚樸二錢

甘瀾水八碗。煮取二碗。分二次服。二帖。

車

脈沉弦而緊。嘔而不渴。肢逆且麻。濁陰上攻厥陰。尅陽明所致。急宜溫之。

烏藥三錢
半夏五錢
淡吳萸五錢
川椒炭三錢

川樸三錢
乾薑三錢
革撥二錢
小枳實三錢

青皮二錢

頭煎二杯。二煎一杯。分三次服。

脾胃

許四十七歲
癸亥二月二十日

脈弦而緊。弦則木旺。緊則為寒。木旺則土衰。中寒則陽不運。故吞酸噯氣。不寐不食。不飢不便。九竅不和。皆屬胃病。濁陰蟠踞中焦。格拒心火。不得下達。則心熱如火。議苦辛通法。

小枳實三錢

淡吳萸三錢

半夏一兩

真雲連二錢

生苡仁五錢

廣皮二錢

厚樸三錢

生薑片六錢

二十四日

甘瀾水八碗。煎成三碗。分三次服。渣再煎一碗服。六脈陽微。濁陰蟠踞。不食不飢。不便利。用和陽明兼驅濁陰法。今腹大痛。已歸下焦。十餘日不大便。肝病不能疏泄。用驅濁陰通陰絡法。又苦辛通法。兼以濁攻濁法。

淡吳萸三錢

小枳實二錢

川棟子三錢

小茴香三錢

雄鼠糞三錢

廣皮錢半

烏藥一錢

良薑二錢

川樸三錢

檳榔二錢

二十七日

以得通大便為度。服以濁攻濁法。大便已通。但欲便先痛。便後痛減。責之絡中宿積未能通。

某

清。臍上且有動氣。又非湯藥所能速攻。攻急恐有瘥散為蠱之餘。議化癥回生丹。緩攻為妙。脈沈緊為裏寒。木旺土衰。濁陰上攻。腹拘急時痛。脅脹。腰痛。宜苦辛通法。兼醒脾陽。

某

白蔻仁一錢 官桂一錢 川樸二錢 半夏三錢
生苡仁三錢 華撥一錢 藿梗三錢 木香八分
生香附三錢 廣皮錢半 鬱金二錢 烏藥二錢
脈弦細而緊。濁陰上攻。胸痛。用辛香流氣法。

淡吳萸三錢 小枳實二錢 木香一錢 川樸二錢
川棟子三錢 廣皮二錢 檳榔錢半 華撥二錢
烏藥二錢 良薑三錢
三帖。

初八日

補火生土。兼泄濁陰。

淡乾薑二錢 半夏三錢 淡吳萸二錢 烏藥二錢

茯苓塊三錢

生苡仁三錢

廣皮錢半

益智仁錢半

四帖。

李十三歲
五月十四日
六脈俱弦。不浮。不沈。不數。舌苔白滑。不食。不飢。不便。不寐。九竅不和。皆屬胃病。臥時自覺氣上阻咽。致令臥不着席。此肝氣之逆也。額角上有蟲斑。神氣若昏。目閉不欲開。視不遠。醫云有蟲。亦復有理。與兩和肝胃。如再不應。再議治蟲。

半夏一兩

旋覆花五錢

秫米一合

二十日

六腑不通。九竅不和。醫者不知六腑為陽。以通為補。每見其二便閉也。則以大黃蘗仁寒藥下之。以後非下不通。屢下屢傷。遂致神氣若昏。目閉不開。脈弦緩而九竅愈不通矣。已成壞症。勉與通陽。

廣皮三錢

川樸三錢

白蔻仁二錢

半夏三錢

大腹皮三錢

雞內金二錢

雲苓皮三錢

益智仁二錢

二十三日

六腑閉塞不通。有若否卦之象。按否之得名。以坤陰長陽消之候。將來必致上下皆坤而後已。坤為腹。故腹大無外。坤為純陰。初爻變震為復。然則

欲復其陽。非性烈如震者不可。豈大黃等陰寒藥所可用哉。

天台烏藥散二錢。加巴豆霜二分。和勻分三分。先服一分。候五時不便。再服第二分。得快便。即止。

二十四日 服一次於五時得快便。宿物下者甚多。目閉已開。神氣亦清。稍食粥飲。知頑笑矣。

二十五日 六腑不通。溫下後大便雖通。而小便仍然未解。心下窒塞。不肌不食。六腑弦遲。急急通陽為要。與開太陽闔陽明法。

川椒炭三錢 澤瀉三錢 公丁香一錢 半夏五錢

廣皮三錢 猪苓三錢 雲苓皮五錢 良薑二錢

安南桂一錢

六月初一日 大便已能自解。胃能進食。是陽關已闔。惟小便不通。是太陽不開。與專開太陽。

桂枝三錢 雲苓皮五錢 猪苓三錢 安邊桂錢半

澤瀉三錢 滑石三錢 蒼朮炭二錢 蠶砂三錢

煮三杯。分三次服。以小便通爲度。若小便已通。而尙渾濁者。再服一帖。以小便清爲度。

初六日

服前方二帖。小便暫通。連日大小便復閉。大便閉已七日。自覺胃中痞塞。臉上蟲斑未退。議用前配成之烏藥散。再服四分。如二便俱通。卽停藥。統俟初八日清晨再商。如大便通一次。而小便不通。或竟不通。明日再服三分。若大便二三次。而小便仍不通者。卽勿服。

初八日

服烏藥散四分。內巴霜四厘。已得快便。今早且能自行小便。六腑俱通矣。只與和胃。今能進食。可以收功。蓋十二經皆取決於膽。皆秉氣於胃也。

半 夏三錢

雲苓塊四錢

益智仁煨一錢

廣皮炭二錢

生苡仁五錢

生薑五錢

慶寶女十六歲

不食十餘日。諸醫不效。面赤脈洪。與五汁飲。降胃清陰法。兼服牛乳。三日而大食矣。

梨汁

藕汁

蔗汁

蘆根汁

荸薺汁

邱
十八歲

溫熱愈後。午後微熱不除。脈弦數。面赤。五汁飲三日。熱退進食。七日全愈。

吳鞠通醫案終

吳鞠通醫案 卷五 脾胃

吳鞠通醫案 卷五 脾胃

後記

《吳鞠通醫案》乃清代著名溫病學家吳塘的臨床治案匯編。吳塘字鞠通，江蘇淮安人，約生於清·乾隆二十三年（公元一七五八年），卒於道光十六年（公元一八三六年）。吳氏十九而孤，家貧，棄舉子業，走京師，究心醫學，在治學上能「抗志以希古人，虛心而師百氏」，上溯《內》、《難》、《傷寒》，下宗葉桂，並貫通宋元諸子學，博採兼摭，頗多卓識。爲人忠厚坦蕩，篤於故舊，而性狷急，不能容物，遇俗醫處方之謬輒疵之，據理直言，不徇人意，人皆憚之。時民多病溫，塘研索其間，建樹頗豐，創三焦辨治說，洵羽翼天士而傳之不朽者。又撰《溫病條辨》、《醫醫病書》等。

本書凡五卷。卷一、二爲溫病，卷三爲雜病，卷四爲雜病與幼科，卷五爲傷寒與雜病。與通行本相較編次互有出入，又缺婦科門證治，當參閱它本，以補不足。

吳氏治溫，矜式葉桂而又發揚廣大之，《溫病條辨》盡述所論，本書一、二卷則盡載其驗，兩書印證，實有利於理論聯係實際。雜病既久，則每主絡病論治，擅用旋覆花湯及化癥回生丹，其例在在可見，此又師從桂意而略事變化焉。塘崇尚陽氣，於《醫醫病書》中嘗發「陰常有餘陽常不足論」，力陳漫事

滋陰之弊，本書治案多見糾其偏而弋獲者，故用藥不避溫燥，如麻、桂、附、巴豆輩皆視其所當而逕投之，毫無所顧忌，可見其學非執守於溫病養陰一隅也。治大病而投重劑又爲本書一大特點，如痰飲用桂枝一兩，痘證用大黃四兩、犀角一兩，痹證用生石膏一斤，肺癰用桔梗三兩、甘草一兩等，可稱擅用重劑治病者，所用石膏量，即使繆希雍、余師愚亦不能望其項背。塘四十年自療暑溫案尤耐人尋味，先服桂枝二兩，盡劑無驗，次日增至八兩，半劑而愈。又如塘女痘證見點，謝寶靈調治無效病篤，塘按其方念倍其量，藥共十餘斤，自早至暮煎成兩碗許，令與乳母分飲，復促吮乳，漿上病差。其膽識如此，輒爲時人不解，故其書流傳無多。昔顧南雅魯贈言吳塘曰：具古今識藝斯進，空世俗見功乃神。此正吳氏學驗之可貴處，對臨床論治重、急證，尤不乏啓迪和借鑒。

此次校勘，參考了上海中醫學院圖書館所藏一九一六年杭州紹興醫藥學報社木活字本，一九二四年及一九三七年上海世界書局鉛印本，一九六〇年北京人民衛生出版社的通行本。

潘華信